

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
7T	GLEJOVÁ CHUDÁ JEDLOVÁ SMRČINA (PODMÁČENÁ) <i>Abieto-Piceetum paludosum oligotrophicum</i>	SM 22 BO 24 EP 3,5 PP 2,5 IH - D 2,75	• poklesliny podsvahových a náhorních plošin, úžlabiny, při potoce a prameništi na kyselém podloží, v horách a vrchovinách, glej histický podzolovaný, podzol histický glejový, méně organozem glejová , hluboká, vlhká až mokrá • PLO: 1-3,7,11-14,16,19,21,23-25, 40 • 1 345,58 ha – 0,05 %	SM 7-9 JD ±2 BO 0-1 (BŘ BŘP JŘ OLŠ) 0± • <i>Sphagnum sp., Polytrichum commune, Bazzania trilobata, Vaccinium myrtillus, Calamagrostis villosa, Molinia sp., Homogyne alpina</i> L9.2 - Rašelinné a podmáčené smrčiny 6A4 - <i>Piceeta abietina sphagnosa superiora</i> LFC04 - <i>Soldanello montanae-Piceetum abietis</i>	
	Je podmíněna v horských nebo inverzních polohách jednak trvale zamokřenou půdou, jednak vlhkým a studeným klimatem (mezoklimatem), silně omezujícím v rozvolněných porostech SM příměs JD. S extrémností podmínek stoupá podíl BŘP a JŘ. Oblastně je přirozená i náhorní BO ekotypu přizpůsobeného těmto podmínkám. V cílové skladbě zaujímá JD jen chráněné polohy, u SM je důležitý vhodný ekotyp.				
	Lesní typy:			Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
	od r. 2019	do r. 2018			
0	antropogenní				
1	modální	- podle oblastí		7T-	modální
2	-	prutnatcová			
3	-				
4	-				
5	-				
6	-				
7	-				
8	-				
9	-				

