

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)		
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ		
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)		
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)		
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)		
8F	SVĚŽÍ KAMENITÁ SMRČINA <i>Piceetum lapidosum mesotrophicum</i>	SM 24-26	• ojedinělý výskyt ve vysokohorském stupni v méně exponovaných polohách, svahy, údolí, rokle, středně bohaté horniny, podzol modální horský místy kryptopodzol rankerový , kamenitá - balvanitá • PLO: 22 • 256,07 ha – 0,01 %	SM 8-9 JD 0± BK 0-1 KL ±1 JŘ ±1		
		EP 5		• <i>Athyrium distentifolium</i> , <i>Athyrium filix-femina</i> , <i>Blechnum spicant</i> , <i>Luzula sylvatica</i> , <i>Dryopteris dilatata</i> , <i>Trientalis europaea</i>		
		PP 4		L9.3 - Horské papratkové smrčiny		
		IH - D		7AB3 - Sorbi-piceeta		
		3,38		LFC02 - <i>Athyrio distentifolii-Piceetum abietis</i>		
	Tvoří přechod mezi ochrannými lesy subalpínské SM (8Z) a „hospodářskými“ SM (8S). Drsné klima a zpomalená humifikace omezují v porostech hluboce zavětveného vysokohorského SM příměs JD, BK (KL) jen na zakrslý podrost, častější je JŘ. V mírně rozvolněných porostech jednoduché struktury má SM ještě relativně dobrý vzrůst. Cílová skladba i struktura se shoduje s přirozenou. Důležitý je vhodný (vysokohorský) ekotyp SM.					
	Lesní typy:			Podsoubory lesních typů (PLT) LČR		
	od r. 2019		do r. 2018			
	0	antropogenní				
	1	modální		kapradinová s papratkou alpskou	8F-	modální
	2	-				
3	-					
4	-					
5	-					
6	-					
7	-					
8	-					
9	-					

