

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
8G	GLEJOVÁ SMRČINA (PODMÁČENÁ) <i>Piceetum paludosum mesotrophicum</i>	SM 22-26	• ojediněle výskyt v horách (Šumava, Krušné hory, Jizerské hory), náhorní plošiny v sousedství rozsáhlých rašelin, glej histický, podzol glejový zrašelinělý , hluboká, vysoká hladina spodní vody • PLO: 1,3,13,21,22 • 7 856,63 ha – 0,29 %	SM 9-10 BŘP ±1 JŘ + JD 0±	
		EP 5		• <i>Calamagrostis villosa</i> , <i>Equisetum sylvaticum</i> , <i>Sphagnum sp.</i> , <i>Homogyne alpina</i> , <i>Athyrium distentifolium</i>	
		PP 3,5		L9.2 - Rašelinné a podmáčené smrčiny	
		IH - D		7A4 - <i>Piceeta sphagnosa</i>	
		2,81		LFC03 - <i>Equiseto sylvatici-Piceetum abietis</i>	
Zaujímá v rámci drsného klimatu vysokohorského stupně a nepříznivého mezoklimatu mrazových plošin a úpadlin relativně nejproduktivnější stanoviště zamokřených půd. Zpomalená humifikace s počínajícím rašeliněním vyhovují jen SM a nejodolnějším dřevinám snázejícím zamokření – BŘP, OLŠ, JŘ. Cílová skladba odpovídá přirozené především ekotypem SM. Listnatá příměs přispívá ke zlepšení porostního klimatu i humifikace.					
Lesní typy:			Podsoubory lesních typů (PLT) LČR		
od r. 2019			do r. 2018		
0	antropogenní				
1	modální		přesličková	8G-	modální
2	-				
3	-		třtinová		
4	-		rašeliníková		
5	-		skeletová		
6	-				
7	skeletnatější				
8	-				
9	-				

