

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (<i>natural species composition</i>)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (<i>KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010</i>)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (<i>BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971</i>)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (<i>VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013</i>)	
8K	Kyselá smrčina <i>Piceetum acidophilum</i>	SM 20-24	• na svazích i náhorních plošinách, nižší stupeň subalpinských smrčin, Krušné hory, Šumava, Krkonoše, na krystaliniku, podzol modální horský, histický a drnový, výjimečně kryptopodzol modální , středně hluboká, s příměsí štěrku a kamene • PLO: 1,13,21,22,27 • 11 532,25 ha – 0,42 %	SM 9-10 JŘ + BK + JD+ KL 0±	
		EP 2,5		• <i>Calamagrostis villosa</i> , <i>Avenella flexuosa</i> , <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Dryopteris dilatata</i> , <i>Luzula sylvatica</i> , <i>Homogyne alpina</i> , <i>Trientalis europaea</i> , <i>Blechnum spicant</i> , <i>Gentiana asclepiadea</i>	
		PP 3		L9.1 - Horské třtinové smrčiny	
		IH - C		7A3 - Sorbi-piceeta	
		2,23		LFC01 - <i>Calamagrostio villosae-Piceetum abietis</i>	
				Přirozená smrčina na chudším podloží v drsném klimatu s krátkým vegetačním obdobím je ve vyšších polohách menšího vzrůstu, skupinovitě rozvolněná s hluboko zavětveným SM a s příměsí JŘ. V příznivějších polohách, zejména při spodní hranici lvs, je SM vzrůstný a v příměsí je i krnící BK a KL a oblastně (Šumava) i JD. Cílová skladba odpovídá přirozené, homogenní SM se slabým podrostem SM a JŘ, na vhodných stanovištích BK.	
				Lesní typy:	
				Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
				od r. 2019 do r. 2018	
0	antropogenní				
1	modální		metlicová	8K-	modální
2	chudší		třtinová		
3	bohatší		s papratkou alpskou		
4	-		rašeliníková		
5	vlhčí		s kapradí širolistou		
6	-		borůvková		
7	skeletnatější		se štavelem		
8	-			8Kv	vysokohorská
9	-		svahová	8Ke	svahová

