

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)																																																													
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ																																																													
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)																																																													
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)																																																													
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)																																																													
8M	CHUDÁ SMRČINA <i>Piceetum oligotrophicum</i>	SM 18	- chudé substráty, nepatrné v horských oblastech (Krušné hory, Jeseníky), modální horský podzol, místy histický, středně hluboká, kamenitá, zrašelinělý humus - PLO: 1,13,22,27 170,85 ha – 0,01 %	SM 9-10 (JD BK) 0± JŘ ±1 BŘ																																																													
		EP 2,5		<i>Vaccinium myrtillus</i>, <i>Vaccinium vitis-idaea</i>, <i>Calamagrostis villosa</i>, <i>Sphagnum</i> sp., <i>Polytrichum formosum</i>, <i>Polytrichum commune</i>, <i>Trientalis europaea</i>, <i>Homogyne alpina</i> L9.1 - Horské třtinové smrčiny 7A3 - Sorbi-piceeta LFC01 - <i>Calamagrostio villosae-Piceetum abietis</i>																																																													
		PP 1,5																																																															
		IH - D																																																															
		2,23																																																															
Drsné klima a velmi kyselá půda se zpomalenou humufikací vymezují prostředí pro nejchudší společenstvo zonálních smrčín. Vedle vzrůstem omezeného silně (hluboko) zavětveného SM se v rozvolněných částech porostu uplatňuje zakrslý JŘ (níže BK, JD). Málo diferencovaná jednovrstevná výstavba přechází se stoupající nadmořskou výškou ve strukturu více diferencovanou, hloučkovitou. V cílové skladbě odpovídá podíl JŘ stupni rozvolnění porostu.																																																																	
<table><tr><th colspan="3">Lesní typy:</th><th colspan="2">Podsoubory lesních typů (PLT) LČR</th></tr><tr><th colspan="2">od r. 2019</th><th>do r. 2018</th><th></th><th></th></tr><tr><td>0</td><td>antropogenní</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>modální</td><td></td><td>8M-</td><td>modální</td></tr><tr><td>2</td><td>-</td><td></td><td>8Mv</td><td>vysokohorská</td></tr><tr><td>3</td><td>-</td><td>borůvková</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>vlhčí</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>-</td><td>svahová</td><td></td><td></td></tr></table>						Lesní typy:			Podsoubory lesních typů (PLT) LČR		od r. 2019		do r. 2018			0	antropogenní				1	modální		8M-	modální	2	-		8Mv	vysokohorská	3	-	borůvková			4	-				5	vlhčí				6	-				7	-				8	-				9	-	svahová		
Lesní typy:			Podsoubory lesních typů (PLT) LČR																																																														
od r. 2019		do r. 2018																																																															
0	antropogenní																																																																
1	modální		8M-	modální																																																													
2	-		8Mv	vysokohorská																																																													
3	-	borůvková																																																															
4	-																																																																
5	vlhčí																																																																
6	-																																																																
7	-																																																																
8	-																																																																
9	-	svahová																																																															

