

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
8N	KYSELÁ KAMENITÁ SMRČINA <i>Piceetum lapidosum acidophilum</i>	SM 20	• výjimečné, kamenitost a terénní exponovanost, modální horský podzol rankerový až podzolový ranker, často kryptopodzol rankerový , středně hluboká, čerstvě vlhká, propustná, kamenitá • PLO: 13,21,22,27 • 2 229,55 ha – 0,08 %	SM 9-10 JD 0± BK 0± KL 0± JŘ ±1	
		EP 5,5		• <i>Dryopteris dilatata, Calamagrostis villosa, Calamagrostis arundinacea, Vaccinium myrtillus, Homogyne alpina, Trientalis europaea, Blechnum spicant, Gentiana asclepiadea</i>	
		PP 3,5		L9.1 - Horské třtinové smrčiny	
		IH - D		7AB3/7A3/7A-AB3 - Sorbi-piceeta	
		2,23		LFC01 - <i>Calamagrostio villosae-Piceetum abietis</i>	
	Drsné klima, krátké veget. období, kyselá půda s hromaděním nadložního humusu vytvářejí ve vysokohorském stupni podmínky pro klimaxovou SM, která přechází bez výrazných rozdílů v porostech i na silně kamenité půdy v exponovaných terénech se společenstvem „kamenité, kyselé SM“. Té odpovídá výlučné zastoupení SM s příměsí JŘ, v příznivějších polohách i KL, BK (JD). Cílová skladba se shoduje s přirozenou i svou strukturou rozvolněných porostů.				
	Lesní typy:			Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
	od r. 2019		do r. 2018		
	0	Antropogenní	s očky sutí	8Ny	skeletovitá
	1	Modální	s kapradí rozloženou (a třtinou chloupkatou)	8N-	modální
	2	Chudší	se třtinou rákosovitou		
	3	Bohatší	borůvková		
	4	-	mechová		
5	Vlhčí	se šťavelem			
6	-		8Nv	vysokohorská	
7	Skeletnatější				
8	-				
9	-				

