

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)		
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ		
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)		
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)		
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)		
80	OGLEJENÁ SVĚŽÍ SMRČINA (JEDLOVÁ) <i>Piceetum variohumidum mesotrophicum</i>	SM 24	• v horských oblastech, na kyselých horninách, plošiny a báze svahů (Šumava), kryptopodzol oglejený až glejový , hluboká, čerstvě vlhká, střídavě až mokrá, písčitohlinitá, někdy skeletovitá • PLO: 13 • 88,15 ha – 0,00 %	SM 8-10 JD ±1 JŘ 0-1 (BK KL OLŠ) 0±		
		EP –4		• <i>Athyrium distentifolium</i> , <i>Calamagrostis villosa</i> , <i>Oxalis acetosella</i> , <i>Homogyne alpina</i> , <i>Luzula sylvatica</i>		
		PP –4		L9.2 - Rašelinné a podmáčené smrčiny		
		IH - D		7A4 - <i>Piceeta sphagnosa</i>		
		3,42		LFC03 - <i>Equiseto sylvatici</i> - <i>Piceetum abietis</i>		
	Vyšší stupeň jdSM je málo vyhraněna vzhledem k omezenému rozlišení oglejené edafická kategorie v humidním klimatu 8.lvs – Šumava.					
	Lesní typy:			Podsoubory lesních typů (PLT) LČR		
	od r. 2019		do r. 2018			
	0	antropogenní				
	1	modální	šťavelová	80-	Modální	
	2	-				
	3	-				
	4	-				
	5	-				
	6	-				
	7	-				
	8	-				
	9	-				

