

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
8P	OGLEJENÁ KYSELÁ SMRČINA <i>Piceetum variohumidum acidophilum</i>	SM 22	• horské oblasti (Krkonosé), hřebenové plošiny, mírné svahy, podzol oglejený zrašelinělý , hlinitá až jílovitohlinitá, místy kamenitá • PLO: 13, 22 • 1 212,33 ha – 0,04 %	SM 8-10 JŘ 0-1 (JD BŘP) 0-1	
		EP –4		• <i>Calamagrostis villosa</i> , <i>Homogyne alpina</i> , <i>Trientalis europaea</i> , <i>Sphagnum sp.</i> , <i>Streptopus amplexifolius</i>	
		PP –4		L9.2 - Rašelinné a podmáčené smrčiny	
		IH - D		7A4 - <i>Piceeta sphagnosa</i>	
		2,81		LFC04 - <i>Soldanello montanae-Piceetum abietis</i>	
				Vyšší stupeň kyselý (jd)SM je málo vyhraněn vzhledem k omezenému rozlišení oglejené edafické kategorie (periodického zamokřování) v humidním klimatu 8.lvs. Varianta klimaxové SM na oglejených půdách.	
				Lesní typy:	
				Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
				od r. 2019 do r. 2018	
0	antropogenní				
1	modální		třtinová	8P-	modální
2	-				
3	-				
4	-				
5	-				
6	-				
7	-				
8	-				
9	-				

