

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
8R	VRCHOVIŠTNÍ SMRČINA <i>Piceetum turfosum montanum</i>	SM 2-14	• ve vyšších horských polohách (Šumava, Jeseníky, Jizerské hory), plošiny, poklesliny, mírné svahy, s podložím kyselého krystalinika, organozem fibrická či glejová oligotrofní, podzol histický glejový, výjimečně glej histický , vrchoviště nebo mokřiny • PLO: 1,3,11,13,14,21,22,25,27 • 4 049,31 ha – 0,15 %	SM 9-10 BŘP ±1 JŘ + KOS 0±	
		EP 6		• <i>Sphagnum sp.</i> , <i>Eriophorum vaginatum</i> , <i>Vaccinium uliginosum</i> , <i>Oxycoccus quadripetalus</i> , <i>Polytrichum strictum</i> , <i>Polytrichum commune</i> , <i>Bazzania trilobata</i> , <i>Vaccinium myrtillus</i>	
		PP 1		L9.2 - Rašelinné a podmáčené smrčiny	
		IH - E		6-7A6 - <i>Piceeta turfosa</i>	
		2,23		LFD04 - <i>Vaccinio uliginosi-Piceetum abietis</i>	
	Je v horách na špatně rozložených vrchovištních rašelinách podmíněna i drsným (mrazovým) mezoklimatem těchto poloh. Značně mezernaté porosty zakrslého SM s příměsí BŘP, JŘ příp. i KOS se půdou i fytocenózou (s četnými vrchovištními druhy) shodují s klečovými společenstvy vrchovišť (9R), k nimž tvoří přirozený přechod. Přípustná skladba (cílová) se od přirozené neliší. Jedná se zpravidla o bezzásahové stanoviště.				
	Lesní typy:			Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
	od r. 2019	do r. 2018			
0	antropogenní				
1	modální	suchopýrová		8R-	modální
2	-	třtinová (s borůvkou)		8Rz	extrémní
3	-	borůvková		8Ri	iniciální
4	sušší	šťavelová			
5	-				
6	-				
7	-				
8	-				
9	-				

