

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVISŤE (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
8S	SVĚŽÍ SMRČINA <i>Piceetum oligomesotrophicum</i>	SM 22-26	- v pásmu smrčin podmíněné chráněnou polohou, případně bohatší horniny, (Krušné hory, Krkonoše, Jeseníky, Šumava), - podzol modální horský, místy histický, kryptopodzol modální, příznivější fyzikální vlastnosti půdy - PLO: 13,21,22,27 503,71 ha – 0,02 %	SM 9-10 BK ±1 KL 0± JŘ±1 JD 0±	
		EP 2,5		<i>Athyrium distentifolium</i>, <i>Oxalis acetosella</i>, <i>Luzula sylvatica</i>, <i>Calamagrostis villosa</i>, <i>Homogyne alpina</i>, <i>Dryopteris dilatata</i>, <i>Avenella flexuosa</i>	
		PP 3		L9.1/L9.3 - Horské třtinové smrčiny/Horské papratkové smrčiny	
		IH - C		7AB3/7BC3 - Sorbi-piceeta/Aceri-piceeta	
		2,81		LFC01/LFC02 - <i>Calamagrostio villosae-Piceetum abietis</i> / <i>Athyrio distentifolii-Piceetum abietis</i>	
				Zaujímá v drsném humidním klimatu vysokohorských poloh (vysoká vzdušná i půdní vlhkost, nízká teplota a tím zpomalená humifikace), relativně nepříznivější stanoviště jak půdou, tak i neexponovanou polohou. Stejnorodé smrčiny se slabou příměsí JD a zakrslého BK, popř. KL tvoří spolu s JŘ rozvolněné porosty jednoduché výstavby se SM podprůměrného vzrůstu, hluboce zavětvené. Cílová skladba a výstavba odpovídá přirozené. Důležitý je ekotyp vysokohorského SM.	
				Lesní typy:	
				Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
				od r. 2019 do r. 2018	
				0 antropogenní	
1	modální		šťavelová (se třtinou chloupkatou)	8S-	modální
2	-		s bikou lesní		
3	-				
4	-				
5	-				
6	-				
7	-				
8	-			8Sv	vysokohorská
9	-		svahová		

