

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
8T	GLEJOVÁ CHUDÁ ZAKRSLÁ SMRČINA (PODMÁČENÁ) <i>Piceetum paludosum oligotrophicum humile</i>	SM 16	• plochy na plošinách, v pokleslinách, sedlech, na prameništích svazích a v okrajích rašelin horských poloh, podzol histický glejový, histický glej, glejová organozem , zrašelinělá, minerálně chudá, se stagnující spodní vodou • PLO: 1,3,13,21,22,25 • 897,31 ha – 0,03 %	SM 8-10 KOS 0± BŘP ±1 JŘ ±1 (BL 0±)	
		EP 5		• <i>Sphagnum sp., Molinia sp., Polytrichum commune, Bazzania trilobata, Trientalis europaea, Blechnum spicant, Homogyne alpina, Calamagrostis villosa, Vaccinium vitis-idaea, Vaccinium uliginosum</i>	
		PP 1		L9.2 - Rašelinné a podmáčené smrčiny	
		IH - E		7A4 - Piceeta sphagnosa	
		2,23		LFC04 - <i>Soldanello montanae-Piceetum abietis</i>	
V podmáčené zakrslé SM jsou drsné podmínky vrcholového vysokohorského klimatu vystupňované mezoklimatem inverzních poloh a silně kyselou, málo propustnou, velmi studenou, zamokřenou půdou, většinou zrašelinělou. V těchto extrémních podmínkách převažuje v silně rozvolněných porostech zakrslý SM s příměsí BŘP a JŘ, na okraji vrchovišť s KOS. Extrémnost podmínek i vzrůst dřevin odpovídá ochrannému lesu okrajů rašelin.					
Lesní typy:			Podsoubory lesních typů (PLT) LČR		
od r. 2019			do r. 2018		
0	antropogenní				
1	modální		bezkolencová (rašeliníková)	8T-	modální
2	-		prutnatcová		
3	-		– podle oblastí		
4	-		klečová	8Tz	extrémní
5	vlhčí				
6	-				
7	-				
8	-				
9	-				

