

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVISŤE (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
8V	VLHKÁ KLENOVÁ SMRČINA (PODMÁČENÁ) <i>Acereto-Piceetum humidum</i>	SM 24-28	• v pásmu přirozených smrčin, svahy, báze svahů, potoční úžlabiny a terasy, kryptopodzol oglejený, glejový, podzol glejový, glej kambický zrašelinělý , středně hluboká, kamenitá, zpomalená humifikace • PLO: 1,13,21,22,27 • 840,63 ha – 0,03 %	SM 9-10 KL ±1 JD 0-1 BK 0± (BŘP JŘ) 0± OLŠ 0±	
		EP 6		• <i>Athyrium distentifolium</i> , <i>Adenostyles alliariae</i> , <i>Cicerbita alpina</i> , <i>Delphinium elatum</i> , <i>Doronicum austriacum</i> , <i>Veratrum lobelianum</i> , <i>Rumex alpestris</i>	
		PP 3		L9.3/L5.2 - Horské papratkové smrčiny/Horské klenové bučiny	
		IH - E		7BC3-4(5)/7BC-C3-4(5)/7BC-C5 - <i>Aceri-piceeta</i>	
		3,36		LFC02/LBC04 - <i>Athyrio distentifolii-Piceetum abietis</i> / <i>Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae</i>	
				Zaujímá v drsném klimatu vysokohorských poloh na půdách ovlivněných vodou poměrně příznivější stanoviště (s pohyblivou vodou), na nichž má toto společenstvo mírně acerózní charakter. V porostech dominantního SM, podle půdních podmínek značně rozdílného vzrůstu, tvoří příměs krnicí KL a pionýrská OLŠ (BŘP, JŘ), při spodní hranici JD, výjimečně zakrslý BK. Cílová skladba odpovídá přirozené. Důležitý je vhodný klimatyp (ekotyp) SM.	
				Lesní typy:	
				Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
				od r. 2019 do r. 2018	
				0 antropogenní	
1	modální		havézová	8V-	modální
2	-		- podle oblastí		
3	bohatší		- podle oblastí		
4	-		úžlabní		
5	-			8Vv	vysokohorská
6	-				
7	skeletnatější				
8	-				
9	specifická - podmáčená			8Vg	podmáčená

