

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
8Y	SKELETOVÁ SMRČINA <i>Piceetum saxatile</i>	SM 20	• na balvanitých a skalnatých svazích sestupuje do 850 m n.m.; litozem, regozem psefitická, ranker litický podzolový, podzol litický , balvanité suti, někdy podmáčené • PLO: 13,21,22,27 • 592,93 ha – 0,02 %	SM 7-10 JD 0± BK 0± BŘ ±1 JŘ ±1 BŘP 0±	
		EP 6		• <i>Homogyne alpina</i> , <i>Blechnum spicant</i> , <i>Calamagrostis villosa</i> , <i>Calamagrostis arundinacea</i> , <i>Dryopteris dilatata</i> , <i>Vaccinium myrtillus</i>	
		PP 1,5		L9.1 - Horské třtinové smrčiny	
		IH - E		7A3/7AB3 - Sorbi-piceeta	
		2,23		LFC01 - <i>Calamagrostio villosae-Piceetum abietis</i>	
				Ve vysokohorských polohách pod hranicí stromové vegetace má v drsném klimatu, na kyselých balvanitých půdách s hromaděním nadložního humusu, omezen podíl vtroušených dřevin jen na BŘ a JŘ, avšak některé půdní vlastnosti (hloubka skeletové půdy, kondenzační vláha) umožňují místy příznivější růst SM (oproti kat. „Z“), hluboce zavětveného v hloučkovitém zápoji. Přípustná skladba odpovídá přirozené i strukturou porostu a rozpětím bonit.	
				Lesní typy:	
				Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
				od r. 2019 do r. 2018	
				0 antropogenní sběrný typ (na balvaniskách a skaliskách)	
1	modální		- podle oblastí	8Y-	modální
2	-			8Yv	vysokohorská
3	bohatší				
4	-				
5	-				
6	-				
7	-				
8	-				
9	-				

