

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
9K	KLEČOVÁ SMRČINA <i>Mugheto-Piceetum acidophilum</i>	SM 1-10	• na přechodu mezi stupněm smrkovým a klečovým, na horní hranici lesa, Krkonoše, hřbety, svahy a plošiny s podložím krystalinika, ranker podzolový, podzol modální horský drnový až rankerový , hlinitopísčité s podílem štěrku a kamene, mocná vrstva mörü • PLO: 22,27 • 860,08 ha – 0,03 %	SM 5-8 KOS 2-5 JŘ ±1 • <i>Nardus stricta, Calamagrostis villosa, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, Avenella flexuosa, Sphagnum sp., Homogyne alpina, Trientalis europaea</i> L9.1 - Horské třtinové smrčiny 8A-AB3/8A-AB2x - Pineta mugo/Sorbi-piceeta humilia LFC01 - <i>Calamagrostio villosae-Piceetum abietis</i>	
		EP 6			
		PP 1			
		IH - E			
		1,92			
Společenstvo klečové smrčiny je vyšším stupněm subalpinských smrčín v drsných klimatických podmínkách, charakteristické různě vzdálenými skupinami a hloučky zcela zavětvených SM, mezi něž sestupuje kosodřevina a stálou příměs tvoří zakrslý JŘ. S nadmořskou výškou přechází i SM do zakrslých forem s deformovanými korunami. Cílové složení porostů odpovídá přirozené skladbě.					
Lesní typy:					
od r. 2019			do r. 2018		
0	antropogenní		na hřbetech a svazích bezklečová (PLO 27)		
1	modální		skeletová		
2	modální - jesenická		borůvková se třtinou		
3	skeletnatější - krkonošská				
4	-				
5	-				
6	-				
7	-				
8	-				
9	-				

