

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
9R	VRCHOVIŠTĚ (VRCHOVIŠTNÍ KLEČ – KLEČOVÉ VRCHOVIŠTĚ) <i>Mughetum turfosum</i>	SM 6	• klečová vrchovištní rašeliniště (Krkonoše, Šumava, Krušné hory, Jeseníky, Jizerské hory), plošiny, poklesliny, mírné svahy, s podložím kyselého krystalinika, organozem fibrická oligotrofní, podzol histický glejový , vrchoviště nebo mokřiny • PLO: 1,3,13,14,21,22,27 • 2 331,38 ha – 0,09 %	KOS 6-10 SM ±1 BŘP ±2 JŘ + (BL 3-5) • <i>Eriophorum vaginatum</i> , <i>Vaccinium uliginosum</i> , <i>Oxycoccus quadripetalus</i> , <i>Andromeda polifolia</i> , <i>Empetrum nigrum</i> , <i>Empetrum hermaphroditum</i> , <i>Vaccinium myrtillus a vitis-idaea</i> , <i>Calluna vulgaris</i> , <i>Polytrichum strictum</i> , <i>Carex rostrata</i> , <i>Carex fusca</i> , <i>Sphagnum sp.</i> , <i>Carex canescens</i> , <i>Calamagrostis villosa</i> , <i>Trichophorum alpinum</i> , <i>Betula nana</i> R3.2/R3.3/R2.3/R3.1/L10.4 - Vrchoviště s klečí/Vrchovištní šlenky/Přechodová rašeliniště/Otevřená vrchoviště/Blatkové bory 8A6/6-7A6 - Pineta montanae turfosa superiora/Pineta montanae turfosa inferiora RCA03/RBE/RBD/RCA02, RCB, RCC/RCA05/RCA01 - <i>Vaccinio uliginosi</i> -Pinetum mugo/ <i>Sphagnion cuspidati</i> / <i>Sphagno</i> - <i>Caricion canescentis</i> / <i>Andromedo polifoliae</i> - <i>Sphagnetum magellanic</i> , <i>Oxycocco palustris</i> - <i>Ericion tetralicis</i> , <i>Oxycocco microcarpi</i> - <i>Empetrion hermaphroditi</i> / <i>Ledo palustris</i> -Pinetum uncinatae/ <i>Eriophoro vaginati</i> - <i>Sphagnetum recurvi</i>	
		EP 6			
		PP (1)			
		IH - E			
		1,25			
Je společenstvem extrémních půdních a klimatických (vrcholových alpinských) podmínek v plochých terénech s různě mocnou vrstvou mokré vrchovištní rašeliny, na povrchu oživené nebo odumřelé (sušší typy). Ráz určuje křovitá forma blatky nebo kosodřevina, příp. výskyt rašelinných jezírek (šumavské „slatě“). Ve fytocenóze převažují keříčky brusnicovitých, časté jsou vrchovištní druhy. Typickým keříkem je <i>Betula nana</i> , či <i>Oxycoccus sp. a Empetrion sp.</i>					
Lesní typy:			Podsoubory lesních typů (PLT) LČR		
od r. 2019			do r. 2018		
0	antropogenní	přechodová (PLO 22)			
1	modální	- podle oblastí			9R- modální
2	iniciální přírodní	- podle oblastí			
3	bohatší	mechová (PLO 22)			
4	sušší				
5	extrazonální modální				
6	extrazonální s BO rašelinnou				
7	extrazonální bez kleče				9Ri iniciální
8	-				9Rv vysokohorská
9	-				

