

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (<i>natural species composition</i>)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
9Z	KLEČ <i>Mughetum (humile)</i>	SM 8	- nad hranicí stromové vegetace, mírné a příkré svahy, hřebeny, Krkonoše, (Jeseníky bez kleče), podzol modální horský drnový, někdy oglejený, rankerový až litický, místy ranker litický podzolový, litozem; kamenitý, mělký - PLO: 22,27 • 3 027,28 ha – 0,11 %	KOS ±10 SM ±3 JŘ ±1 BŘP VR <i>Calamagrostis villosa, Nardus stricta, Adenostyles alliariae, Rumex arifolius, Gentiana asclepiadea, Homogyne alpina, Polygonum bistorta, Soldanella montana, Vaccinium myrtillus</i> A7/A8.2/ A8.1/A4.2/A4.3/ A4.1/T2.1/A1.2 — Kosodřevina/Vysoké subalpinské listnaté křoviny/Subalpinské křoviny s vrbou laponskou/Subalpinské vysokobylinné nivy/Subalpinské kapradinové nivy/Subalpinské vysokostébelné trávníky/Subalpinské smilkové trávníky/Zapojené alpské trávníky 8A-AB3/8AB-B3-4/8BC-C3-4/8A-AB2v — Pineta mugo/Salici-betuleta carpaticae/Ribi-pineta mugo/Sorbi-piceeta humilia KCA01a/ADC01/ADD02/KCA01c; KCA02/KCA01b/ADA/ADB/TEA - <i>Dryopterido dilatatae-Pinetum mugo</i> var. <i>Vaccinium vitis-idaea/Salici silesiacae-Betuletum carpaticae/Salicetum lapponum/Dryopterido dilatatae-Pinetum mugo</i> var. <i>Athyrium distentifolium/Adenostylo alliariae-Pinetum mugo/Dryopterido dilatatae-Pinetum mugo</i> var. <i>Homogyne alpina/Calamagrostion villosae/Calamagrostion arundinaceae/Nardion strictae</i>	
		EP 6			
		PP 0			
		IH - E			
		1,25			
				Klimaxové společenstvo kleče – kosodřeviny tvoří nad horní hranicí lesa samostatný lvs označovaný subalpinský nebo (včetně nelesních společenstev) jako alpský. Krátké vegetační období, extrémnost klimatu i půdy vylučují stromový růst dřevin. Vedle ± nesouvislých skupin KOS se udržuje jen JŘ, VR (slezská) a jednotlivě (na spodní hranici skupinovitě) zakrslý SM. Fytocenózy se neliší od 8. lvs (obtížná rekonstrukce přirozené KOS). Cílem je udržení a ochrana ekosystému.	
		Lesní typy:		Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
		od r. 2019	do r. 2018		
0	antropogenní		antropogenní (PLO 22)	9Zk	antropogenní
1	modální		borůvková (skeletová) (pouze PLO 22)	9Z-	modální
2	specifická - laviny		březovrbová (pouze PLO 22)		
3	specifická vřhčí - kary		Salicetum lapponii (pouze PLO 22)		
4	vlhčí bohatší		havézová (pouze PLO 22)	9Zg	vlhčí
5	vlhčí bohatší - jesenická		kapradinová (pouze PLO 22)		
6	specifická – travinná - chinofilní		se třtinou chloupkatou (pouze PLO 22)		
7	sušší		se třtinou rákosovitou (pouze PLO 22)		
8	specifická travinná		smilková-ostřicová (pouze PLO 22)	9Zi	iniciální - traviny
9	specifická travinná - jesenická		smilková (pouze PLO 22)	9Zy	skeletnatá

