

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS N. L.



OBLASTNÍ PLÁNY ROZVOJE LESŮ

PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI

1 - 41

Základní hospodářská doporučení podle HS

TABULKOVÉ PŘEHLEDY

PLO 01 Krušné hory

Přehled základních hospodářských doporučení zastoupených HS

HS	POROSTNÍ TYP (současné porosty)	ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ					CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA - alternativy /desítky %/	zákl. dřeviny (Přil. č.4 k vyhl. č.83/96)	meliorač. a zpevňující % MZD	sníž. % MZD	regionálně nepůvodní dřeviny %
		1	2	3	4	5					
19 Lužní stanoviště: 2L, 3U (úžlabí, potoční nivy, naplavené půdy)								186 ha			
195	dubové	N,P	150	30	131	2+6	2L: DB3-7,JS1-4,JV,KL1-3,OL,LP,SM+-2 3U: JS2-5,JV,KL1-4,DB,SM1-3,LP,BK,OL+-2	JS DB (JV, SM)	15% - BK,DB,LP,JV, OL,JD,JL	15%	
196	javorojasanové	P,N	100	30	81	2+5					
197	olšové s js	N,P	90	20	81	2+6					
191	smrkové	pN	100	20	91	2+6					
21 Exponovaná stanoviště nižších poloh : 2N, 2C, 2A , 2K9, 3M9 (kamenité svahy, hřbitky, mělčí ohrožená půda)								198 ha			
211	smrkové	N	100	30	81	2+5	2N,2K9,3M9 : BO4-7,DB1-3,BK+-3,LP, HB, BŘ/+ -1,(MD)	BO	30 % : BK,DB,LP,HB, BR	30%	MD 3% BOČ 5%
213	borové	N	120	30	101	2+5					
215	dubové (BK, LP)	N,P	150	30	131	2+6	2A : DB4-7,/BK,JV,LP/1-3,BO--7,HB,JS,JL dubové porosty obnovovat opět → DB	DB (BK)	30 % : BK,LP,HB,DB		
217	březové	N	60	20	51	2+5					
23 Kyselá stanoviště nižších poloh : 2K, 2S6, 3M,OK (střední zvlněné svahy, oligotrofní kambizemě)								520 ha			
231	smrkové	nH	100	20	91	2+5	2K,2S : BO—7,DB1-7,BK+-2,/BŘ,LP/+ -1, (MD,DG,BOČ)	BO	25 % : BK,DB,LP,HB, BŘ (0 K : 5 %)	25%	MD 4%
233	borové	H,P	120	20	111	2+5					
235	dubové (LP,BK)	P,N	150	30	131	2+5	OK:BO5-9,BK(DB)+-3,BŘ+-1,(DBČ) DB, BK porosty obnovovat opět → DB, BK	DB (BK)	25 % : BK,LP,HB,DB	5 %	DG 2% BOČ 5% DBČ+
217	březové	nH	60	20	51	2+5					
25 Živná stanoviště nižších poloh : 2B, 2D, 2S4 (střední zvlněné svahy, mezotrofní až eutrofní kambizemě)								83 ha			
251	smrkové	nH	100	20	91	2+6	2B,2D,2S4 : DB5-8,BK+-2,LP+-2,HB+-1, JV,JS,JL, TR,BŘK,MD-1	DB	20 % : JV,JS,JL,TR, BK,DB,LP,HB, BŘK	20%	MD 10%
253	borové	pH	120	20	111	2+6					
255	dubové (LP,BK)	nP,N	150	30	131	2+6					
257	březové	pH	60	20	51	2+6					
27 Oglejená chudá stanoviště nižších a středních poloh: 0P,0Q,4Q,5Q (plošiny, poklesliny – pseudoglej)								199 ha			
273	borové	N(H,P)	120	20	111	2+5	0P,0Q: BO4-8,DB2-7,BŘ,SM+-2 4Q,5Q: BO4-8,DB1-6,SM+-3,BR+-2,BK,OS,JD	BO DB (SM)	20% - DB,BK, JD BŘ,OS 0P,0Q : 5 %	15% 5%	
271	smrkové	H(N)	110	20	101	2+5					
277	březové	H(N)	60	20	51	2+5					
29 Olšová stanoviště na podmáčených půdách : 1G, 3L • 5L • 1T (prameniště, potočiny, močály)								671 ha			
296	javoro-jasanové a tvrdé listnáče	pN	100	20	91	2+5	5L : OL5-8,SM+-4,BŘ+-1,JS,KL 1T: OL6-9,SM+-4,BŘ+-3,JS1-4	OL,SM OL(SM) OL OL,JS	1G - 90 % : OL,VR 3L,5L,1T - 70 % : OL,JV	70%	
297	olšové (s jasanem)	pN	90	20	81	2+5					
31 Vysychavá a sušší acerózní stanoviště středních poloh : 3C, 5C (slunné kamenité svahy, hřbitky, mělčí ohrožená půda)								123 ha			
311	smrkové	N	100	30	81	2+6	3C : BK5-8,DB2,,/LP,JV,HB,TR/+ -1,MD+-2, BO2-6 5C : BK7-10,/DB,LP,JV/+ -1,MD+-2,BO2-7	BK BO DB	30 % : BK,DB,LP,JV BŘK,TR,HB,	25%	MD 20%
313	borové	N (P)	120	30	101	2+6					
316	bukové (DB, tvrdé listnáče)	P	150	40	131	2+6					
317	březové	N	60	20	51	2+6					
39 Podmáčená chudá stanoviště : 0T,0G,5T,5R (poklesliny, úžlabí, rašeliny, gleje)								22 ha			
391	smrkové	P,N	120	30	101	2+7	0T,0G: BO5-9,BŘ1-3,SM+-3,DB,OL 5T: BO4-8,DB2-7,SM+-3,BŘ+-2,OL 5R: BO(SM)2-9,BŘ+-2,OL	BO SM (DB) BŘ	5% BŘ,DB 10% DB,JD,BŘ 5% BŘ,OS	5%	
393	borové	N,P	130	30	111	2+6					
397	březové	N(H)	70	20	61	2+6					
41 Exponovaná stanoviště středních poloh : 3N, 3K9, 3S9, 3F, 3A,3B6								945 ha			

(kamenité svahy, oligotrofní až mezotrofní kambizemě rankerové)											
411	smrkové (modřínové)	pN	100	30	81	2+5	3N,3K9,3S9 : SM(BO)--7,BK2-9, BOČ+	SM	30 % : BK,DB,LP,	20%	MD 10%
413	borové	(n) N	120	30	101	2+5	/DB,LP,JD/+2,MD+-1	BK	JD,JV		BOČ 1%
416	bukové (DB, tvrdé listnáče)	P	150	40	131	2+6	3F,3A,3B6 : SM--7,BK2-8,/DB,LP,JV/1-2,MD+	BO			
417	březové	N	60	20	51	2+5	BK porosty obnovovat opět → BK				
43 Kyselá stanoviště středních poloh : 3K (mimo 3K9), 5M,3S8 (plošiny, mírné až střední svahy • oligotrofní kambizemě) 8241 ha											
431	smrkové (modřínové)	N,nH	110	30	91	2+5	3K,5M,3S8 : SM(BO)--7,BK2-9,/LP,HB,DB, JD/+1, MD+-1,BOČ,VJ	SM	25 % : BK,JD,LP,DB, HB	15%	MD 15%
433	borové	nH,P	120	20	111	2+5		BO			VJ 2%
436	bukové (DB, tvrdé listnáče)	P,N	150	40	131	2+6	BK porosty obnovovat opět → BK	BK			BOČ 5%
437	březové (SMX)	N,nH	60	20	51	2+5					
45 Živná stanoviště středních poloh : 3S (mimo 3S9), 3B, 3D (plošiny, mírné až střední svahy • oligo-mezotrofní až mezotrofní kambizemě) 190 ha											
451	smrkové (modřínové)	N,nH	100	30	81	2+5	SM--7,BK2-9,/LP,HB,,JD/+2,MD,DG+-1,JDO,	SM	25 % : BK,DB,JD,LP,	20%	MD 10%
453	borové	nH	110	20	101	2+5	DB2-7				
456	bukové (DB, tvrdé listnáče)	P,N	150	40	131	2+6		BK	JV,JS,JL,HB,		DG 10%
457	březové (SMX)	N,nH	60	20	51	2+5	BK porosty obnovovat opět → BK	DB	TR,JDO		JDO 5%
47 Oglejená stanoviště středních poloh : 3V, 3O • 4O • 4P (poklesliny, úžlabiny) 58 ha											
471	Smrkové	pN,P	100	30	81	2+5	SM 7,/BK,JD,LP/2-3,/JV,JS,JL/+1,MD+-1, JDO+, DB, BO2-7	SM	25 % : BK,JD,DB,LP, JV,JS,JL,JDO	15%	MD 10%
473	borové	N,P	110	30	91	2+5	Dubové (kvalitní BO) porosty obnovovat opět → DB (BO)	BO			
475	dubové	P,N,H	160	30	141	2+6		DB			
477	březové (OL, SMX)	pN	60	20	51	2+5	BK porosty obnovovat opět → BK	BK			JDO 5%
51 Exponovaná stanoviště vyšších poloh : 5K9, 5N, 6K9, 6N • 5S9, 5F, 5A, 6S9, 6F, 6A • 5M9,6M9 • 5B6 (kamenité svahy, oligotrofní až mezotrofní kambizemě rankerové, erodované) 11239 ha											
511	smrkové v pásnu B,C,D MD pod „zelenou čarou“	N(P)	110	30	91	2+5	SM--7,BK2-9,/JD,JV,/+1,MD+-1,BO-5 5A,6A,5B6 : SM--6,BK2-8,JV1-4, /LP,JD,JL,JS/+2	SM	30 % : BK,JD,JV,LP, DG	15%	MD 15% (SMX, BOX, MD) 70%
	6LVS	N(P)	120	30	101	2+5	pásma A : MD alternativa, 5A,6A,5B6 →BK,JV,JS	BK			
513	borové	N(P)	120	30	101	2+5	Kvalitní BO porosty obnovovat opět →BO	BO			
951 1	smrkové v pásnu A	N	100	30	81	2+6					
516	bukové	nP	150	40	131	2+6	BK porosty obnovovat opět → BK				
517	náhradní porosty (BŘ, JR, SMX, BOX a MD nad „zelenou čarou“)	N,(P)	20-70 40	20	31	2+5	mimo 5A,6A, se připouští MD alternativa : MD7,BK2-3,/LP,JV/+1				
53 Kyselá stanoviště vyšších poloh : 5K (mimo 5K9), 6M, 6K (mimo 6K9) • 5I (plošiny a mírné až střední svahy • oligotrofní kambizemě a kryptopodzoly) 32735 ha											
531	smrkové v pásnu B, C, D MD pod „zelenou čarou“	P(nH ,N)	110	30	91	2+5	5.lvs : SM6-7,BK2-8,MD+-2,DG+,JD-1,BO+-6, KL,LP,BŘ + 2 6.lvs : SM6-7,BK2-7,JD,BO+-4,KL,MD,DG	SM	25 % : BK,JD,LP,DG	15%	MD 20% VJ 5%
	6LVS	P(N,H)	120	30	101	2+6	BK alt.: BK7-10,/SM,MD/+3 • pod „zelenou č.“ se připouští MD alt.: MD7,BK3,SM	BK			DG 5% (SMX,
953 1	smrkové v pásnu A	(p)H	100	30	81	2+6					
536	bukové	P,N	150	40	131	2+6	Kvalitní BO porosty obnovovat opět → BO (130)	BO			BOX,MD)
533	borové	P,N,H	120	30	101	2+5					
537	náhradní porosty (BŘ, JR, SMX, BOX, MD nad „zelenou čarou“)	N,H	20-70 40	20	31	2+5	pásma A nad „zelenou č.“: MD,BŘ,SMX,BOX BK porosty obnovovat opět → BK	(70%)			70%
55 Živná stanoviště vyšších poloh : 5S (mimo 5S9), 5B, (mimo 5B6)5D, 6S (mimo 6S9), 6B,6D,5H (plošiny a mírné až střední svahy • oligo-mezotrofní až mezotrofní kambizemě a kryptopodzoly) 11 265 ha											
551	smrkové v pásnu B, C, D MD pod „zelenou čarou“	nH N(P)	110	30	91	2+6	5.lvs : SM6-7,BK3-8,JD-1,JV-1,(MD,DG+-1), JDO 6.lvs : SM6-7,BK2-8,JV-1, JD,MD,DG	SM	25 % : BK,JD,JV,JL, LP,JS,JDO	20%	MD 10% DG 10%
	5LVS	H,N(P)	100	30	81	2+6	BK alt.: BK7-10,/SM,MD/+3 • pod „zelenou č.“ se připouští MD alt.: MD7,BK3,JV,SM	BK			JDO 2% (SMX,
955 1	smrkové v pásnu A	(p)H	100	30	81	2+7					
556	bukové	P,N	150	40	131	2+6					BOX,MD)
557	náhradní porosty (BŘ, JR, SMX, BOX, MD nad „zelenou čarou“)	H,N	20-70 40	20	31	2+5	pásma A nad „zelenou č.“: MD,BŘ,SMX,BOX BK porosty obnovovat opět → BK	(70%)			70%

57 Oglejená stanoviště vyšších poloh : 5V, 6V • 50,60 • 5P, 6P, 6Q • 5U (konkávní svahy, úžlabiny, poklesliny, zvlněné plošiny, mírné svahy, zářezy)											4457 ha		
571	smrkové v pásnu B, C, D MD pod „zelenou čarou“ Kategorie P,Q	(p)N P	110	30	91	2+6	5V,6V : SM5-7,BK2-7,JD+-1,JV+-1,MD,JDO 50,60 : SM5-7,BK2-8,JD+-1,MD,JDO 5P,6P : SM6-7,BK1-2,JD-1,/BŘP,OS/+2, BO+-5, MD+-1	SM BK	25 % 5V,6V : BK,JD,JDO JV,JS,JL	15%	MD 10% JDO 5%		
573	borové	N,P(H)	120	30	101	2+6	Kvalitní BO porosty obnovovat opět → BO	BO	50,60,5P,6P,6Q : BK,JD,JDO,BŘ,OS 5U: BK,JD,KL,JL,LP		SMX BOX MD 70%		
9571	smrkové v pásnu A	N	100	30	81	2+6							
576	bukové	P,N	150	40	131	2+6	pásno A : BŘP,OS,SMX,BOX,blatka (70%)						
577	náhradní porosty (BŘ, JR, SMX, BOX, MD nad „zelenou čarou“)	H,N	20-70 40	20	31	2+5	6Q: BO(SM)5-8,BŘ+-2,JD,BK+ 5U: SM1-6,BK,JV,JS1-4,JD,LP,OL BK porosty obnovovat opět → BK						
59 Podmáčená stanoviště středních a vyšších poloh : 5G, 4G • 5V9, 6V9 • 4R, 6R (6G) (gleje zpravidla menšího rozsahu, ± ve svahu, prameniště, rašeliny přechodné, poklesliny)											215 ha		
591	smrkové v pásnu B, C, D MD pod „zelenou čarou“	P(N)	110	30	91	2+6	SM7-10,JD-1,BK+-1,OLL+-2,BŘ+-1,DB+-8	SM	15 % 5G : BK,JD, OLL 5% : 4R,6R : JD,OL, BŘ	10%	BOX		
9591	smrkové v pásnu A	(p)N	100	30	81	2+7	pásno A : /BŘP,BOX,blatka,OLL/7-10,SM--3 DB porosty obnovovat opět → DB	DB	20%-4G,5V9,6V9: DB,BK,JD,JV,LP	5%	SMX		
595	dubové	N(P,H)	150	20	141	2+6							
597	náhradní porosty (BŘ, JR, SMX, BOX, MD nad „zelenou čarou“)	N,H	20-70 40	20	31	2+6							
71 Exponovaná stanoviště horských poloh : 7N,7K9,7M9 • 7S9,7F (příkré kamenité svahy, kryptopodzoly rankerové až podzoly i rankery)											1065 ha		
711	smrkové v pásnu B, C, D	N,P	130	40	111	2+6	SM7-9,BK1-3,/JŘ,BŘ/+1, MD+-1,BO,KL,JD	SM	15 % : BK,JV,JŘ,(JD)	10%	MD 10%		
971 1	smrkové v pásnu A	N	100	30	81	2+7	pásno A : /JŘ,BŘ,MD,SMX/7-10,/SM,BK/-3	(BK)			SMX		
971 7	náhradní porosty (BŘ, JR, SMX, BOX, MD nad „zelenou čarou“)	N,H	20-70 40	20	31	2+7	BK porosty obnovovat opět → BK				BOX 70%		
73 Kyselá stanoviště horských poloh : 7M, 7K (mimo 7K9) • (8M,8K) (roviny a mírné svahy náhorní plošiny K.h. • kryptopodzoly a humusové podzoly)											24245 ha		
731	smrkové v pásnu B, C, D	N,H,P	130	30	111	2+7	SM7-9,BK1-3,JŘ+-1,BŘ,BO,JD,MD+-1	SM	7lvs-15 % : BK,JŘ,(JD)	5%	MD 10%		
973 1	smrkové v pásnu A	N,H	100	30	81	2+7	pásno A : /BŘ,JŘ,MD,SMX,BOX/7-10,SM--3		(8lvs+ : JŘ,BK)	+	BOX 70%		
973 7	náhradní porosty (BŘ, JR, SMX, BOX, MD nad „zelenou čarou“)	N,H	20-70 40	20	31	2+7	(8LVS: SM8-10,JŘ+-2,BK,BŘ)						
75 Živná stanoviště horských poloh : 7S (mimo 7S9) (roviny a mírné svahy náhorní plošiny K.h. • kryptopodzoly)											781 ha		
751	smrkové v pásnu B, C, D	P,N,H	120	30	101	2+6	SM7-9,BK1-3,JŘ+-1,BŘ,JD,MD+-1,KL	SM	15 % : BK,JŘ,(JD)	10%	MD 15%		
975 1	smrkové v pásnu A	N,H	100	30	81	2+7	pásno A : /BŘ,JŘ,MD,SMX,BOX/7-10,SM--3	(BK)			SMX		
975 7	náhradní porosty (BŘ, JR, SMX, BOX, MD nad „zelenou čarou“)	N,H	20-70 40	20	31	2+7					BOX 70%		
77 Oglejená stanoviště horských poloh : 7V, 7O, 7P • 8V • 7Q (poklesliny a konkávní svahy náhorní plošiny K.h. - periodické /jarní/ zamokření)											1783 ha		
771	smrkové v pásnu B, C, D	N,P	120	30	101	2+6	SM7-10,BK+-2,/JŘ,BŘ,JD/+1, BO+-4	SM	10 % : BK,JV,JŘ,BŘ, (JD)	10%			
977 1	smrkové v pásnu A	N	100	30	81	2+7	Kvalitní BO porosty obnovovat opět →BO	BO	5% - sít 8V /BK,JV, JŘ,BŘ/	5%			
977 7	náhradní porosty (BŘ, JR, SMX, BOX, MD nad „zelenou čarou“)	N,H	20-70 40	20	31	2+7							
79 Podmáčená stanoviště horských poloh : 7G, 8Q, 8G • 7R • (6G) • 7T, 8T (trvale zamokřená stanoviště - gleje, glejové podzoly, rašelina - na náhorní plošině K.h.)											13006 ha		
791	smrkové v pásnu B, C,D	P,N	120	40	101	2+7	SM8-10,/BŘ,JŘ/+2,JD,BO,OL	SM	5 % : BŘ,JŘ,(JD)	5%			
979 1	smrkové v pásnu A	N	100	30	81	2+8	8T: SM7-10,BL+-3,BŘ	BL					
979 7	náhradní porosty (BŘ, JR, SMX, BOX, MD nad „zelenou čarou“)	N,H	20-70 40	20	31	2+7							
01b Mimořádně nepříznivá stanoviště – reliktní bor (OZ) (skalní výstupy, kamenná moře)											41 ha		
1013	borové	V	150	f - ∞	-	2+7	BO7-10,BŘ+-3,BK,DB,SM+-1	BO	5%: BŘ,DB,BK	5%			
1017	březové	N,P	90	40	71	2+8		(BŘ)					
01e Mimořádně nepříznivá stanoviště - zakrslá buková doubrava (2Z),1Z – zakrslá doubrava (± slunné kamenité a skalnaté svahy, hříbtky)											140 ha		
3011	smrkové (místy s příměsí DB)	(N),P	(100)	(40)	(81)	2+7	BO+-3,DB5-10,BK+-3,/LP,HB,BŘ/+1	DB	2Z- 60 % : BK,DB,LP,BŘ,HB	60%			
3013	borové (s DB, MD, SM, BŘ)	V	150-f	∞	-	2+7		BO					

3015	dubové	V	150-f	∞	-	2+8		BŘ	1Z - 70%:	70%	
3017	březové	N,P	80	40	61	2+8	DB porosty obnovovat opět → DB		DB,BK,LP,BŘ,HB		

01f,	Mimořádně nepříznivá stanoviště - zakrslá dubová bučina a skeletová dubová bučina (3Z, 3Y)										181 ha
01g	(kamenité a skalnaté svahy, hřbítky)										857 ha
4011	smrkové, (MD) - 3Z,3Y - 5Z,5Y,6Z,6Y	pN V	(100) 150-f	(40) ∞	(81)	2+8	3Z,3Y : BO+7,DB+4,BK3-7,BŘ+1,JD,SM	BK,BO DB	30 % : BK,DB,JD,BŘ	30%	
4013	borové	V	150-f	∞	-	2+7	5Z,5Y : SM+7,BK3-10,BO+4,JD,BŘ	BK,SM BO	BK,JV,JD,BŘ		
4016	bukové (s dubem aj.)	V	150-f	∞	-	2+8	6Z,6Y : SM3-7,BK3-10,JD,BŘ,JŘ,BO+2	BK,SM BO	BK,JV,JD,JŘ		
4017	náhradní porosty (BŘ, JR, SMX, BOX)	pN	80	40	61	2+8	pásma A : BŘ10,JŘ,BK (ev.BK10) BK porosty obnovovat opět → BK	BO			
01h	Mimořádně nepříznivá stanoviště - zakrslá buková smrčina (7Z) a skeletová buková smrčina (7Y)										321 ha
5011	smrkové	V	150-f	∞	-	2+9	SM7-9,BK1-3,BŘ,JŘ,JV,JD,BO	SM	10 % : BK,JŘ,BŘ,JD	10%	
5016	bukové (s BŘ)	V	150-f	∞	-	2+12	pásma A : (BŘ,JŘ)7-10,(SM,BK)+3				
5017	náhradní porosty (BŘ, JR, SMX, BOX)	pN	80	40	61	2+8					
01j,	Mimořádně nepříznivá stanoviště - suťová javorina (5J) a										12 ha
01k	(suť, balvanité půdy)										91 ha
7011	smrkové	V,P, N	150-f	∞	-	2+7	3J : BK2-7,DB+2,JV2-4,LP1-3,/JS,HB,JL/+1	BK,JV	5J:60 % : BK,JV,JD,	60%	
7016	bukové (+ tvrdé listnáče)	V	150-f	∞	-	2+8	5J : BK2-6,SM+5,JV2-4,/JS,JL,LP,JD/+1		JL,LP,JS		
7017	březové	pN	80	40	61	2+8			3J:90% - BK,DB,JV, LP	90%	
01o	Mimořádně nepříznivá stanoviště - vrchovištní smrčina (8R)										1486 ha
01p	(vrchoviště)										963 ha
9011	smrkové	V	150-f	∞	-	2+10	8R : SM9-10,/BŘP,kleč/+1		+ - 5 % : kleč,BŘP,JŘ	+ -	
9013	klečové	V	200-f	∞	-	2+12	pásma A : kleč10,BŘP			- 5%	
9017	náhradní porosty (BŘ, JR, SMX, BOX)	N	80	40	61	2+12	9R : kleč10,BŘP,SM		: BŘP,JŘ		
02a	Vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace - klenová smrčina (8A)										186 ha
	(Kamenité hřbety, vrcholy - čedič)										
021	smrkové	V	150-f	∞	-	2+8	SM8-10,BK,KL,JŘ,BŘ+2	SM	+ : BK,KL,JŘ,BŘ	+	
02	Vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace - jeřábová smrčina (8Z)										436 ha
c,b	(Δ Klínovec)										803 ha
	- chudá smrčina (8M,8K)										
021	smrkové	V	150-f	∞	-	2+8	SM7-10,JŘ+3,kleč+2,BŘP	SM	+ : BK,JŘ,BŘ	+	
027	náhradní porosty (BŘ, JR, SMX, BOX, MD)	N	80	40	61	2+8	pásma A : /JŘ,BŘP,kleč/7-10,SM+3				

PLO 02 Podkrušnohorské pánve

Přehled základních hospodářských doporučení zastoupených HS

(ha)

HS	POROSTNÍ TYP (současné porosty)	ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ					CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA - alternativy /desítky %/	zákl. meliorač. a zpevňující dřeviny (Přil. č.4 k vyhl. č.83/96)	sníž. % MZD	regionálně nepůvodní dřeviny %	
		1	2	3	4	5					
13 Přírozená borová stanoviště : 1M, 0M, 0K (paleogenní píský u Podbořan, fluvialní písčité šterky říčních teras - plochy mírně zvlněný relief, neogenní píský v západní části – i kaolin.) 550 ha											
131	smrkové	H	100	20	91	2+5	1M : BO7-8.5,DB(+2),DBČ--0.5,/LP,HB,BŘ/-1,	BO	15 % (5%): DB,BŘ,LP,HB,BK DBČ	15% 5%	MD 4% DBČ 5%
133	borové	H,P	120	20	111	2+5	MD 0-0.4				
137	březové	H	70	20	61	2+5	0M,0K: BO6-8,DB,BŘ+-4, JS,DB+-2,TP,VR				
19 Lužní stanoviště : 1L,2L, 3U,1U (niva Ohře a menších přítoků; menší spádově nevyrovnané potoky /3U/, zaplavované nivy (1U)) 204ha											
195	dubové (listnaté kvalitní*)	nH	150	20	141	2+6	1L,2L : DB5-6,JS2-3,LP1-2,JV+-1,JL,HB,BB, BŘK,OL,TP, (SM)	DB JS,DB OL	15 % : LP,JV,JL,HB, DB,BB,BŘK 15 % : BK,JV,JL,LP, OL,DB	15%	
197	listnaté nekvalitní (BŘ,OL,TP,...)**	H,P	70	20	61	2+6	3U : JS2-4,JV1-2,DB1-4,BK+-2,JL+-1,LP+-1, OL1-2,SM 0-3 1U: OL6-9,BŘ+-4, JS,DB+-2,TP,VR				
Poznámka HS 19 : *) jasanové porosty a směsi OL,JS (slt 3U) : obmýti 90 let • **) topolové plantáže (slt 1L, 2L) : obmýti 40 let, obnovní doba 10 let											
21 Exponovaná stanoviště nižších poloh : 1C,1A • 2C, 2A (exponované svahy, hřbítky, mělkí ohrožená půda) 374 ha											
213	borové (modřínové)	N,P	120	30	101	2+5	1C,2C : BO--7,DB1-7,LP+-2,/BK,HB/+1,JS,JV	BO, DB	30 % : BK,DB,LP,HB, BŘ 30 % : BK,LP,JV,HB, JS,DB,BŘK,BB	30%	MD 5%
215	dubové *)	N,P	150	30	131	2+6					
217	březové (akátové, jasanové)	N	70	20	61	2+5	1A,2A : DB4-7,/BK,JV,LP1-3,BO--7,HB,JS,JL				
Poznámka HS 21 : *) dubové porosty obnovovat opět → DB											
23 Kyselá stanoviště nižších poloh : 1K, 1I, 1S • 2K, 2I, 2S6, 3M,3M7 (plošiny až střední zvlněné svahy, oligotrofní kambizemě, luvizemě, výsypky – antrozemě, podzoly) 2611 ha											
231	smrkové	H(N)	100	20	91	2+5		BO DB	25 % : BK,DB,LP,HB, BŘ,DG 25 % : BK,LP,HB,DB	25%	MD 5% DBČ 1% VJ 1%
233	borové	H,P	120	30	101	2+5	1K,1I,1S : BO --7,DB2-8,/LP,HB/+2,BŘ-1,MD				
235	dubové (LP,BK)*	P,N	130	30	111	2+5	2K,2I,2S : BO--7,DB1-7,BK+-2,/LP,HB/+1,MD				
237	březové (AK,JS,)	nH	70	20	61	2+5	3M: BO6-8,DB2-7,BK,BŘ+-2,LP,MD				
238	topolové	H	50	20	41	2+5					
Poznámka HS 23 : *) dubové porosty obnovovat opět → DB											
25 Živná stanoviště nižších poloh : 1B, 1D, 1V, 1O • 2S4, 2B, 2H, 2D, 2V • 2S0 (střední zvlněné svahy • mezotrofní až eutrofní kambizemě, hnědozemě, pelozemě a pelické pararendziny) 2041 ha											
253	borové(BOČ, MD)	nH	110	30	91	2+6	2S4,1B,2B,2H : DB5-8,BK-2,LP-2,HB-1,JV,JS, JL,TŘ,BRK,MD+	DB	20 % : BK,DB,LP,HB, JV,JS,JL,TŘ, BŘK	20%	MD 5% DG 10%
255	dubové (LP,BK)	nP,N	150	30	131	2+6					
257	březové (AK, OL)	nH	70	20	61	2+6	1D,2D : DB5-7,BK+-2,LP1-2,JV1,JS1,MD+				
258	topolové	H	50	20	41	2+6	1V,2V,1O : DB5-7,BK-2,JS1-2,LP1-2,JV+- 1,JL, OL,HB				
27 Oglejená chudá stanoviště nižších a středních poloh : 1P, 1Q, 0O, 0P, 0Q, 1Q, 4Q (oglejené, většinou antropogenní půdy výsypek a zemníků, poklesliny, mokravé svahy, pseudogleje, podzolové, kaolinické, plošiny) 912 ha ha											
271	smrkové	H(N)	100	20	91	2+6	1QO : BO7-8,DB2,BŘ+-1,OS,(JD,BK)	BO DB	20 % : DB,BŘ,OS, (JD,BK) 0P,0Q: 5%	20% 5%	MD 4%
273	borové	N	120	30	101	2+6	1PQ : DB3-6,BŘ3-4,OS1-3				
277	březové (OL,JS,AK...)	N	70	20	61	2+5	0O,0P: BO4-8,DB(SM)2-6,LP,JD+-1 0Q,1Q: BO6-9,BŘ+-3,DB+-,JD,LP,SM 4Q: BO4-8,DB(SM)2-4,BŘ+-2,OL				
29 Olšová stanoviště na podmačených půdách : 1T, 1G, 3L, 5L (prameniště, potočiny) 389 ha											
297	olšové (+ JS), březové	pN	90	20	81	2+6	1T : OL5-7,BŘ2-3,OS+-2,DB-2, SM+-3	OL OL,JS OL,SM	1T – 70% : DB,BŘ,OL 1G – 70 % : OL,VR 3L- 70 % : OL,JV,OLŠ 5L-70%: OL,KL	70%	-
298	topolové	N	50	20	41	2+5	1G : OL7-10,VR+-2,JS,BŘ,DB,SM+ 3L : OL6,JS4,JV,SM,BŘ,VR,DB 5L: OL4-7,SM1-3,KL+-1,BŘ,JS,OLŠ				
39 Podmačená chudá stanoviště: 0G, 0T, 2T, 5T, 3R, 5R (terenní poklesliny, plošiny, močály, rašeliniště – podzolový, kaolinický, rašelinný glej) 68 ha											
391	smrkové	N(P)	110	30	91	2+7	0T,0G: BO5-9,SM1-4,BŘ+-3,DB,OL,OS+	BO	5 % : DB,JD,BŘ, OS	5%	

393	borové	N(P)	120	30	101	2+7	2T,5T: BO3-7,SM1-5,BŘ+3,DB+4,OL+1,JD,OS+	BŘ, SM (DB)	2T,5T 10%- BŘ,OS	10%	
397	březové (ol)	N(H)	80	20	71	2+8	3R,5R: BO(SM)2-8,BŘ+3,OL,OS+				
41	Exponovaná stanoviště středních poloh : 3N • (3C), 3A, 4A, 4C, 5C, 3F, 4F, 3M9, 5M9, 3K9, 3S9, 3N7 (kamenité svahy, oligotrofní kambizemě rankerové, prudké svahy, úpatí, výsypky – antrozemě)								463 ha		
411	smrkové (modřínové)	PN	100	30	81	2+6	3N : SM(BO)--7,BK2-9, /DB,LP,JD/+2,MD—1	SM	30 % : BK,DB,LP,JD,	20%	MD 10%
413	borové	N(P)	120	30	101	2+5	3C,4C,5C: BK3-8,BO2-6,DB+3,LP,JV+	BO	DG		
416	bukové (DB, tvrdé list.)	P	150	40	131	2+6	3F,4F,3S9: SM+-7,BK2-6,JV+-2,DB,LP+-1,JD,	BK	30 % : BK,DB,LP,JD		DG 5%
417	březové	N	70	20	61	2+5	DG,MD 3M9,3K9,5M9: BO(SM)2-7,BK2-6,DB,LP+-2, MD, BŘ,JV+ 3A,4A : SM--7,BK2-8,/DB,LP,JV/1-2,MD--1 BK porosty obnovovat opět → BK				
43	Kyselá stanoviště středních poloh : 3K, 3S8,3S5,3S0,3I,5M,5K6 (plošiny, mírné až střední svahy • oligotrofní kambizemě, luvizemě, výsypky – antrozemě, sušší, chudší)								2028 ha		
431	smrkové (modřínové)	P,N, nH	110	30	91	2+5	SM(BO)—7,BK2-9,/LP,HB,DB,JD/+1,MD—1, BŘ,JV	SM	25 % : BK,JD,LP,DB, HB, DG	10%	MD 10%
433	borové	P,nH	110	30	91	2+5					
436	bukové (DB, tvrdé list.)	P,(N)	150	40	131	2+5		BO	25 % : BK,JD,LP,DB, HB		VJ 1%
437	březové	N,nH	70	20	61	2+5	BK porosty obnovovat opět → BK	BK			
45	Živná stanoviště středních poloh : 3S (mimo 3S8), 3B,3H, 4S,4B (plošiny, mírné až střední svahy • oligo-mezotrofní až mezotrofní kambizemě, luvizemě)								72 ha		
451	smrkové (modřínové)	N,nH	100	30	81	2+7	SM--7,BK2-9,/LP,HB,DB,JD/+2,MD+,JDO,	SM	25 % : BK,DB,JD,LP,	10%	MD 5%
456	bukové (DB, tvrdé list.)	P,(N)	150	40	131	2+6	DG • 3S0 : DB3-5,BK2-3,LP+-1,MD+,BŘ2-3	BK	JV,JS,JL,HB,		DG 10%
457	březové	N,nH	70	20	61	2+5	BK porosty obnovovat opět → BK		TŘ,JDO		JDO 3%
47	Oglejená stanoviště středních poloh : 3V, 3O, 4O, 2O, 4V, 4V8, 2P, 3P9, 3O9 (poklesliny, úžlabiny, mírné svahy, zářezy, výsypky – kambizemě oglejené, pseudogleje, antrozemě)								480 ha		
471	smrkové	N,(P)	110	30	91	2+6	SM 6-7, /BK,DB,JD,LP/2-3, /JV,JS,JL,JDO/+1, BO+-5,BŘ,OS,OL	SM BO	25 % : BK,JD,DB,LP,	10%	DG + JDO 10%
473	borové	N,P	110	30	91	2+6	2O,2P: BO2-6,DB2-7,LP,JV,JD+-2,	DB			MD 2%
477	březové (OL)	(p)N	70	20	61	2+6	BK,JS,OL,HB,BŘ+ (BK porosty obnovovat opět → BK)	BK	JV,JS,JL,JDO		
51	Exponovaná stanoviště vyšších poloh: 5K9, 5a, 5S9, 5F, 5A (prudké svahy, zářezy, úpatí svahů v západní části oblasti – kambizemě oligo-až mezotrofní, rankerové)								273 ha		
511	smrkové	N,P	120	30	101	2+6	5K9,5a: SM6-8,BK2-6,BO+-3,KL-1 5S9,5F,5A: SM3-7,BK5-8,KL1-3,JD,LP,JS	SM BK (BO)	30 % : BK,KL,JD,LP,JL	20%	
53	Kyselá stanoviště vyšších poloh: 5K, 5I, 5S6 (plošiny, svahy v západní části – kambizemě oligo-až mezotrofní, luvické až luvizemě)								24 ha		
531	smrkové	P,N	110	40	91	2+5	SM 5-7,BK2-7,BO+-2,JD,KL,BŘ,LP	SM BK	25 % : BK,JD,KL,LP	15%	
55	Živná stanoviště vyšších poloh: 5S, 5H (plošiny, svahy, úpatí v západní části – kambizemě mezotrofní, luvické až luvizemě)								17 ha		
551	smrkové	N,P (H)	100	30	81	2+6	SM 5-8,BK2-8,KL,JD ,LP,JS,JL	SM BK	25 % : BK,JD,KL,LP,	20%	
57	Oglejená stanoviště vyšších poloh : 5V, 5O, 4P, 5P, 6P, 5Q, 6Q, 5U, 5D5, 4P9 (plošiny, poklesliny, mírné svahy, zářezy – kambizemě oglejené až pseudogleje, antrozemě na výsypkách)								1016 ha		
571	smrkové	N,P	110	30	91	2+6	5V,5O,5D: SM5-7,BK2-5,JD,KL,JS+-2,OL	SM	25 % : BK,JD,KL,LP	20%	JDO 7%
573	borové	N,P (H)	110	20	101	2+6	4,5,6P: SM6-8,BO+-3,BK,JD+-2,BŘ,OS	BO	5U: 30% BK,JD,KL, JL,LP		
577	březové (OL)	(p)N	70	20	61	2+6	5,6Q: BO(SM)4-7,BŘ+-2,BK+-1,OL,OS,JD 5U:SM2-6,BK,KL,JS1-4,JD,LP,OL,JL+	BK			MD 7%
59	Podmáčená stanoviště středních a vyšších poloh: 3V9,4V9,5V9,2G,4G,5G,6G,4R,6R,7T,4G8 (plošiny, poklesliny, močály, rašeliniště, prameniště – gleje humosní, podzolové, rašelinné, výsypky - antrozemě)								238 ha		
591	smrkové	P,N	110	30	91	2+8	3,4,5V9: SM5-8,BK(DB)+2,KL,JS+-1,OL 2,4G: SM5-7,DB2-7,OL,JD+-1,LP,OS 5,6Q: SM6-8,BO+-2,OL,JD+-1,OS,BŘ,KL,BK 4,6R: SM8-10,OL+-1,BO,BŘ,JD 7T: SM8-10,BO1-3,BŘ+-1,OL,JŘ	SM (DB)	20 % : BK,DB,JD,OL,KL 5,6G: 15% OL,BK,JD 4,6R,7T: 5% BŘ,JŘ	15% 10% 5%	
01b	Mimořádné nepříznivé stanoviště – reliktní bor (OZ) (sklaní výchozy, vrcholy, svahy,kyselé horniny – litozem silikátová až ranker litický)								19 ha		
1013	borové	V	150-f		-	2+8	BO7-10,BŘ+-3,BK(DB)+-1,SM,JŘ	BO BŘ	5 % : BŘ,BK,DB	5%	

01d Mimořádně nepříznivá stanoviště - dřínová doubrava (1X) (± slunné krátké, konvexní svahy; efusiva)											5 ha		
2013	borové (BOČ)	V	150-f	∞	-	2+7	DB(DBP)9,(HB,LP,JV,JS,JL,BB,BŘK,MK)1	DB	90 % : DB,DBP, HB, LP,JV,JS,JL,BB,muk, břek	90%			
2015	dubové	V	150-f	∞	-	2+7							
2017	březové (AK, JS)	N	80	40	61	2+7							
01e Mimořádně nepříznivá stanoviště - zakrslá doubrava (1Z), zakrslá buková doubrava (2Z) (± příkré, slunné svahy, exponované hřebítky)											24 ha		
3013	borové (MD)	V	150-f	∞	-	2+6	1Z : DB6-9,BO--3, /LP,HB,BŘ/+1	DB	70 % : DB,LP,HB,BŘ, břek,muk 60 % : BK,DB,LP,HB, BŘ	70%			
3015	dubové	V	150-f	∞	-	2+6	2Z : DB4-9,BK+-2,BO--4,(BŘ,HB,LP)1						
3017	březové (AK, JS)	N	80	40	61	2+6	DB porosty obnovovat opět → DB						
01f Mimořádně nepříznivá stanoviště - zakrslá dubová bučina (3Z), skeletová dubová bučina (3Y) (kamenité a skalnaté svahy, křemencové plotny)											29 ha		
4011	smrkové, (MD)	PN, (P)	100-f	40-∞	81	2+7	3Z,3Y :BO+-7,DB+-4,BK3-7,BŘ+-1,JD	BK,BO	30 % : BK,DB,JD,BŘ	30%			
4016	bukové (s dubem aj.)	V	150-f	∞	-	2+6							
4017	březové	pN	80	40	61	2+6						BK porosty obnovovat opět → BK	
01g Mimořádně nepříznivá stanoviště - zakrslá jedlová bučina (5Z) (vrcholy, hřebety, svahy v západní části – mělké, suché, rankery až litozem)											1 ha		
5011	smrkové	V,P	150-f	40+	-	2+7	SM(BO)2-6,BK4-7,,BŘ+-2,JŘ,KL	SM BO BK	30 % : BK,BŘ,JD,	20%			
01m Mimořádně nepříznivá stanoviště – rašelinný bor (0R) (plošiny, poklesliny, rašeliniště – organozem oligotrofní, minerální prameny)											115 ha		
9013	borové	V,P	130-f	∞	-	2+9	BO7-10,BŘ+-3,SM-2,JŘ,OS	BO BŘ	5 % : BŘ	5%			

PLO 03 Karlovarská vrchovina

Přehled základních hospodářských doporučení zastoupených HS

(ha)

HS	POROSTNÍ TYP (současné porosty)	ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ					CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA - alternativy /desítky %/	zákl. dřeviny (Příl. Č.4 k vyhl. Č.83/96)	zákl. meliorač. a zpevňující	sníž. % MZD	Regionálně nepůvodní dřeviny %
		1	2	3	4	5					
13 Přirozená borová stanoviště : 0M1,0M2,0M3,0K,0N,0C2 (písčité sedimenty a zvětraliny i hadce vyšších poloh)							732 ha 1,46%				
133	Borové (běžné)	H,N,P	120	20	111	2+6	BO8,BŘ(SM,BK)2,DB,DBČ,JŘ Alter: BO6,SM3,BŘ1	BO SM BŘ	5%(0N10%) BŘ,BK,JD JŘ(DBČ,DB)	5%	DBČ do 3%;MD do 4% BOČ+
131	Smrkové (nevhodné)	H	100	20	91	2+5					
137	Březové	H	70	20	61	2+5					
13	BO se SM kvalitní	P,N(H)	130	30	111	2+6					
19 Lužní stanoviště : 1L,1U,2L (fluvizem +- oglejená na aluviích větších vodotečí – místy zaplavovaná)							70 ha 0,14%				
195	Dubové	N,P,H	160	30	141	2+8	DB6,JS3,LP(JV,KL,OL,JL)1 Alter: TP10(1U) Porosty tvrdých listnáčů obnovovat opět na DB,JV,JS	DB JS OL (BŘ, SM)	15% -DB,LP,JV,KL JL 1U:+VR,OL	15%	
196	Javorojasanové	P,N	100	30	81	2+6					
197	Olšové s JS	N,P	90	20	81	2+7					
191	Smrkové	N,H	100	20	91	2+6					
23 Kyselá stanoviště nižších poloh : 3M,3I,3K7,2C (mělké,chudé, kyselé, vysychavé půdy na krystaliniku a překryvech sedimentů)							151 ha 0,30%				
233	Borové	P,H,N	120	20	111	2+5	BO7,DB2,BK(LP,BŘ)1 Alter: DB(BK)7,BO2,BŘ(LP)1 DB a BK porosty obnovovat opět na DB(BK)	BO DB BK	25 % : BK,DB,LP, BŘ,JD	20%	MD 4% BOČ 3% DBČ 1%
231	Smrkové	H	100	20	91	2+5					
237	Březové	H	70	20	61	2+5					
235	Dubové (tvrdé list.)	P,N	140	30	121	2+6					
27 Oglejená chudá stanoviště nižších a středních poloh : 0P,0Q (pseudogleje až oglejené podzoly na písčitých substrátech)							96 ha 0,19%				
273	Borové (smíšené)	N(H,P)	120	20	111	2+5	BO5-8,SM+-3,BŘ1-2,DB+-2,JD, OS,JŘ,BK,MD,JDO	BO SM BŘ	20 % : DB,BK,JD,BŘ,OS	15%	MD 1% JDO 1%
271	Smrkové	H(N)	110	20	101	2+5					
277	Březové	H(N)	70	20	61	2+5					
29 Olšová stanoviště na podmačených půdách : 1T,1T2,1G, 3L, 5L (prameniště, potoky,+- oglejené fluvizemě na aluviích menších toků, močály)							900 ha 1,80%				
297	Olšové (s JS)	P,N	90	20	81	2+6	OL7,JS(SM)3,BŘ,KL,OS,VR 1G: OL10,VR,JS,DB 1T: OL7,BŘ3,SM,DB,BO,OS	OL BŘ (SM)	3L,5L:70% OL,JV,KL 1G:90%OL,VR 1T:75% OL,BŘ,DB	70% 90% 75%	
	Březové	N,H	70	20	61	2+6					
299	Pařeziny (břehové)	V(N)	40	20	31	2+7					
31 Vysychavá a sušší acerosní a basická stanoviště středních poloh: 3C,4C,5C,3A3 (hřbety, vrcholy, terénní zlomy, slunné expozice, +- kamenité, mělké kambizemě)							203 ha 0,41%				
313	Borové	N(P)	120	30	101	2+6	BK7,DB2,LP1,BO,JV,KL,JS,MD Alter: BO6,BK3,DB(LP)1,JV Porosty BK(DB) obnovovat opět na BK(DB)	BK BO SM BŘ	3,4,5C: 30% DB,BK,LP,JD,HB, JV,KL,TR,BŘK 3A:80%+-JS,JL	30% 70%	MD 7% BOČ 3%
311	Smrkové (nevhodné)	H(N)	100	20	91	2+6					
317	Březové	H(N)	60	20	51	2+6					
316	Bukové (tvrdé list.)	P(N)	140	40	120	2+6					
41 Exponovaná stanoviště středních poloh: 3K9,3M9,3N,3S9,3F,3A1,4N,4S9,4B4,4A (prudké +- kamenité svahy, vrcholy a hřbety – ranker až rankerová kambizem +- mělká)							372 ha 0,74%				
411	Smrkové	P,N	100	30	81	2+6	3M,K,N,4N:SM(BO)7,BK2,DB(LP)1 3S,F,4S,B:SM7,BK3,DB,LP,JV 3A,4A:SM5,BK3,LP(JV,DB)2 Alter:BK(DB)8,LP(JV,JD,SM)2 BK(DB) porosty obnovovat na BK(DB)	SM BO BK BŘ DB	30%-BK,DB,LP,JD Kat.S,F,B,A +JV,KL,JS,JL,DG, HB	20%	MD 5% DG 3% BOČ 1%
413	Borové	N,P	120	30	101	2+5					
416	Bukové (tvrdé list.)	P,N	140	40	121	2+6					
417	Březové	N	70	20	61	2+5					
43 Kyselá stanoviště středních poloh: 3K,3S8,4K,5M,5K6,5I (hřbety, mírné svahy na krystaliniku – oligotrofní kambizem až podzol, luvizem)							2471 ha 4,94%				
431	Smrkové	P,N(H)	110	30	91	2+5	BO(SM)7,BK(DB)2,LP(MD,JD)1 BŘ,DG,VJ,HB Alter: BK7,SM(BO,DB)3,LP,MD Bukové porosty obnovovat opět na BK	SM BO BŘ (BK)	25% - BK,LP JD,DB,HB,DG	20%	MD 10% DG 4% VJ 1% BOČ 1%
433	Borové	H,P(N)	120	20	111	2+5					
436	Bukové (tvrdé list.)	P,N	140	40	121	2+6					
437	Březové	N,H	70	20	61	2+5					
45 Živná stanoviště středních poloh: 3S,4S,4B,4D (spodní části svahů +- stinných – čediče, ruly, amfibolit, žuly – mesotrofní kambizem)							109 ha 0,22%				
451	Smrkové	N,P(H)	100	30	81	2+6	SM7,BK(DB)2,LP(JD,JV,JS,MD)1 Alter: BK(DB)8,SM(JV,JS,LP,JD)2 Buk. a dub. por. obnovovat opět na BK(DB)	SM BK DB	25% - BK, DB,LP,JD, JV,KL,JS,JL,HB TR,JDO	15%	MD 6% DG 10% JDO 2%
456	Bukové (tvrdé list.)	P,N	140	40	121	2+6					
457	Březové	H,N	60	20	51	2+6					

47	Oglejená stanoviště středních poloh: 3V,3O,4V,4O,4P (ploché poklesliny, úžlabí, zářezy – ruly, žuly, čediče, aluvia – pseudogleje až oglejené kambizemě)										66 ha 0,13%
471	Smrkové	N,P	100	30	81	2+6	SM7,BK(DB)2,LP(JD,JV,JS)1	SM (DB) (OL) (BŘ)	25% - DB,BK,JD,LP JV,KL,JS,JL JDO,HB Kat.P +OS,BŘ	15%	MD 2% DG 3% JDO 5%
473	Borové	N,P	110	30	91	2+5	Alter: BK6,DB2,JD(LP,JV,JS)1				
475	Dubové (tvrdé list.)	P,N(H)	150	30	131	2+6	DB8,LP(BK,JV,JS,JD,SM)2				
477	Březové (olšové)	N	70	20	61	2+7	Buk. a dub. por. obnovovat opět na BK(DB)				
51	Exponovaná stanoviště vyšších poloh: 5M9,5K9,5N,5S9,5F,5B6,5D9,5A,6M9,6K9,6N,6S9,6F,6A (prudké +- kamenité svahy, event.vrcholy ohrožené erozí, ruly, žuly, svory, amfibolity, kvarcit aj. – různé expozice, oligo- až mesotrofní kambizem rankerová)										5787 ha 11,57%
511	Smrkové 6lvs	N,P N,P	110 120	30 30	91 101	2+5 2+6	SM7,BK2,KL(JD,BŘ)1,MD	SM BO BK BŘ	30% - BK,JD,KL(JV) LP,DG (živnější i JS,JL)	15%	MD 8% DG 2%
513	Borové	N(P)	120	30	101	2+5	Alter: BK7,SM3,KL,JD,BŘ,LP				
516	Bukové (tvrdé list.)	P,N	150	40	131	2+6	BO6,BK3,BŘ(SM,JD)1				
517	Březové	N	70	20	61	2+5	Bukové porosty obnovovat opět na BK				
53	Kyselá stanoviště vyšších poloh: 5K,5S6,5S8,6M,6K,6I,6S4 (plošiny, hřbety, mírné svahy +- horní části – žuly, svory, ruly, kvarcity – oligotrofní kambizemě +- podzolované a kryptopodzoly)										16285 ha 32,56%
531	Smrkové 6lvs	P,N(H) P,N(H)	110 120	40 30	91 101	2+5 2+6	SM7,BK3,JD,BO,MD,BŘ,KL	SM BO BK BŘ	25% - BK,JD,LP,DG	20%	MD 12% DG 3%
533	Borové	N,H(P)	120	30	101	2+5	Alter: BK8,SM2,KL,JD,MD,				
536	Bukové (tvrdé list.)	P,N	140	40	121	2+6	BO6,BK3,SM1,KL,JD,BŘ				
537	Březové	N,H	70	20	61	2+5	Bukové porosty obnovovat opět na BK				
55	Živná stanoviště vyšších poloh: 5S,5B,5H,5D,6S,6B,6D (spodní části svahů, deluvia, plošiny, - ruly, žuly, amfibolity, čediče – meso- až eutrofní kambizem či kryptopodzol s tendencí k uléhání či oglejení)										7059 ha 14,12%
551	Smrkové 6lvs	N,H,P N,P,H	100 110	30 30	81 91	2+6 2+6	SM7,BK2,KL(JD)1,JS,DG	SM BK BŘ	25% - BK,JD,KL JS,JS,LP JL,JDO,TŘ	15%	MD 6% DG 10% JDO 2%
556	Bukové (tvrdé list.)	P,N	130	40	111	2+7	Alter: BK8,SM(JD)2,DG				
557	Březové	N,H	70	20	61	2+6	Bukové porosty obnovovat opět na BK				
57	Oglejená stanoviště vyšších poloh: 5D5,5U,5V,5O,5P,6V,6O,6P,6Q (zvlněné plošiny, poklesliny, úžlabí, zářezy, mírné svahy – ruly, svory, žuly, amfibolity, čediče – oglejené kambizemě podzolované až obohacované i pseudogleje)										7851 ha 15,70%
571	Smrkové Chudší (P,Q), 6lvs	N,P(H) N,P(H)	100 120	30 30	81 101	2+7 2+6	SM(BO)7,BK(JD,BŘ)2, KL(JS,OL,OS,LP,JDO)1	SM BO BŘ OL	25% - BK,JD – bohatší (O,V,U,D) i KL,JV,JS,JL,LP, JDO,JS; chudší: (P,Q) – BŘ,OS	15%	MD 4% JDO 4% DG 3%
573	Borové	N,P,H	120	30	101	2+6	Kvalitní borové a bukové porosty obnovovat				
577	Březové (olšové apod.)	N,H	80	30	61	2+7	opět na BO,BK; alter: BK5,SM(JD)3, KL(JS)2, BO				
59	Podmáčená stanoviště středních a vyšších poloh: 0G,1T9,2T,2G,3V9,4V9,5V9,6V9,4G,5G,6G9 (zvlněné plošiny, poklesliny, prameniště, mírné svahy – žuly, ruly, svory, amfibolit, hadec, čedič, gleje, humosní až rašelinné, zbahnělé i podzolované)										462 ha 0,92%
591	Smrkové	P(N)	100	40	81	2+7	SM8,OL2,JD,BŘ,DB,BO		OG-5%,2T-10% 5G,6G – 15% 1T9-65%, ostatní 20%- OL,BŘ,DB,JD(BK), KL,OS,LP	10%	JDO+
593	Borové	P,N	120	30	101	2+6	Alter: DB(BO)5,SM3,OL(BŘ)2	SM OL BŘ BO			
597	Olšové (březové aj.)	N	80	20	71	2+7	Kvalitní porosty DB, BO obnovovat opět na DB(BO)			(5%)	
71	Exponovaná stanoviště horských poloh: 7K9,7N (prudké svahy a kamenité lokality vrcholů i svahů – žula, svor, čedič, kvarcit – rankerový podzol až kryptopodzol)										94 ha 0,19%
711	Smrkové	P,N	130	40	111	2+7	SM8,BK2,JD,KL,BŘ,JŘ,BO	SM	15% - BK,JD,KL,JŘ	5%	
73	Kyselá stanoviště horských poloh: 7M,7K,7S (vrcholy, hřbety, plošiny, mírné svahy – žula, svor, čedič, porfyr žulový – humusový podzol až kryptopodzol)										1841 ha 3,68%
731	Smrkové	P(N)	130	30	111	2+7	SM8,BK2,JD,BO,KL,BŘ,JŘ	SM	15% - BK,JD, JŘ(KL)	10%	
734	Náhradní porosty	N	40	20	31	2+7					
77	Oglejená stanoviště horských poloh: 7O,7P,7Q (náhorní plošiny, mírné svahy, ploché poklesliny – žula, svor, kvarcit, rula – pseudoglej podzolový až rašelinný i mesotrofní)										1624 ha 3,25%
771	Smrkové	P,N	120	40	101	2+7	SM9,BK(JD)1,BŘ,BO,KL,JŘ Alter: BO5,SM3,BŘ(JD)2	SM (BO)	10% - BK,JD,KL,BŘ,JŘ	5%	
79	Podmáčená stanoviště horských poloh: 6G,6R,7V9,7G,7T,7R,8G,8T (náhorní plošiny, mírné svahy, prameniště, poklesliny – žula, svor, rašelina – gleje +- rašelinné a rašelinohumosní, oligotrofní až mesotrofní rašeliny)										2888 ha 5,78%
791	Smrkové	P(N)	120	40	101	2+8	SM10,BŘ,JD,BO,JŘ,OL Alter: OL4,SM6	SM (OL)	5% - JD,BŘ,JŘ	5% (+)	
01	Mimořádně nepříznivá stanoviště										Celkem: 948 ha 1,90%

01 b,e0Z,1Z,0C1,0M5 (skalní výstupy vrcholů a svahů, iniciační stadia – žuly, amfibolit, svory, hadec, čedič, písky – ranker až litozem – eroze)											334 ha 0,67%	
011	Smrkové	V(P,N)	150-f	∞	-	2+10	BO(DB)8,BŘ(SM)2,JD,LP,HB,BK,BŘK Dubové porosty obnovovat opět na DB	BO BŘ (DB, SM)	5% - BŘ,BK,DB,JD 1Z 70% - DB, LP, HB,BŘK,MK,BŘ	5% (+) 70%		
013	Borové	V(P,N)	150-f	∞	-	2+10						
015	Dubové (tvrdé list.)	V(P)	200-f	∞	-	2+12						
017	Březové	N(P,V)	100-f	(40+)	(81+)	2+10						
01 f,g3Z,5Z,6Z,3Y,5Y,6Y (iniciační stadia na hřebetech a vrcholech, skály a sutě i na svazích, výsypky, rumišťe, žuly, svory, ruly, amfibolit, čedič, kvarcit, žulový porfyr – rankery, litozem až rankerová kambizem – eroze, včetně intraskeletové)											353 ha 0,71%	
011	Smrkové	V(P)	150-f	∞	-	2+10	SM(BO)7,BK(BŘ)3,DB,JD,JV KL,JŘ,LP Bukové a dubové porosty obnovovat opět na BK(DB)	SM BO BŘ BK (DB)	30% - BK,JD,BŘ (DB,KL,JŘ)	20%	MD+	
013	Borové	V(P)	150-f	∞	-	2+8						
016	Bukové (tvrdé list.)	V(P)	200-f	∞	-	2+9						
017	Březové	V(N)	100-f	(40+)	(81+)	2+10						
01 h7Z,7Y (vrcholy, hřebety, skály, iniciační stadia – žula, svor, žulový porfyr – ranker podzolový až humosní i litozem)											22 ha 0,04%	
011	Smrkové	V(P)	150-f	∞	-	2+12	SM9,BK(BŘ)1,BO,JD,JŘ,KL	SM	10% - BK,JD,BŘ,JŘ	5% (+)		
01 j,k3J,5J (skály, sutě na vrcholech i svazích – čediče, amfibolit, žuly, ruly – humosní ranker mesotrofní)											23 ha 0,05%	
011	Smrkové	V(P)	150-f	∞	-	2+12	BK5,SM(BO)3,JV(KL,LP,JS,DB)2,JD,HB, BŘ,BŘK,TS Bukové (aj. cenné list.) porosty obnovovat opět na BK	SM BK (DB) (BŘ)	3J -90% 5J – 60% BK,DB,JV,KL,JS,JL, LP,JD,HB,BŘK,TS	50%		
016	Bukové (tvrdé list.)	V(P)	200-f	∞	-	2+10						
017	Březové	V(N)	100-f	(40+)	(81+)	2+12						
01n o,p0R,8R,9R (poklesliny náhorních plošin – inverzní polohy – vrchovištní rašelina - organozem)											215 ha 0,43%	
011	Smrkové	V(P)	150-f	∞	-	2+13	SM(BL i klečovitá)10,BO,BŘ,JŘ	SM BL (i kleč)	Do 5% BL (i kleč) BŘP,JŘ	+		
014	Blatkové (i klečovitá)	V(P)	200-f	∞	-	2+15						

PLO 04 Doupovské hory

Přehled základních hospodářských doporučení zastoupených HS

HS	POROSTNÍ TYP (současné porosty)	ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ					CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA - alternativy /desítky %/	zákl. meliorač. a zpevňující dřeviny (Příl. č.4 k vyhl. č.83/96)	sníž. % MZD	regionálně nepůvodní dřeviny %	
		1	2	3	4	5					
19 Lužní stanoviště: 1L,2L, • 1U • 3U úžlabí, aluviální nivy (fluvizem)											
191	smrkové	N,H	100	20	91	2+6	1L,2L: DB3-8,JS1-4,LP1-3,JV(JL,HB,OL,TP) ±1VR,SM	DB JS (SM, OL)	15% - DB, BK, JS, JL, LP, OL,JD,HB, BB, OS, VR,BŘK	15%	
195	dubové	H,P	150	30	131	2+6	1U: DB1-5,JS1-4,OL(VR,TP)1-3,LP,JL,OS,BŘ				
197	olšové s JS a JV	N,P	90	20	81	2+6	3U: DB1-6,JS1-4,JV(BK,LP,JD)1-2,SM+-4, JL(OL)± 1 alter.:SM3-7				
21 Exponovaná stanoviště nižších poloh : 1C,2C • 2A • 2N • 3N,4N,3K9-mělké,kamenité, suché											
213	borové	N,P	120	30	101	2+5	1C,2C : DB7-9,LP(HB)+-2,BŘK(BB,BK)+-1, BO,BOČ	DB BO	30 % : DB, LP, HB, JV,JS, JL, JD, BŘ, BB, BŘK, TS,BK	30%	MD 1-5 BOČ +-1
215	dubové	N,P	140	30	121	2+6	2A : DB4-6,BK(LP,JV)1-2,HB+-1, JL,JV,JS,BB,BŘK,TS,BO,MD				
216	bukové (LP)	P,N	130	30	111	2+6	kat. N,K: BO2-7,DB1-6,BK2-8,LP(JV)1-2, HB,JD,SM,BŘ,MD alter.:BO2-7 (kat.C)				
Dubové porosty obnovovat opět na → DB, AK, BŘ, křoviny → přeměna											
23 Kyselá stanoviště nižších poloh : 1K,2K • 2S6 • 3K,3I • 0K,0M - mělčí, vysychavé, svahy											
231	smrkové	H,N	100	20	91	2+5	1K,2K : BO5-7,DB1-4,BK(LP)+-2,BŘ (HB)+-1, MD	BO DB	25 % : DB, BK, DG LP,HB,JD,BŘ	25%	MD 1-5 BOČ +-2 DG+
233	borové	H,P	120	20	111	2+5	2S6. : BO4-6,DB2-4,BK(LP)1-2,HB+-1		0M,0K: 5%+JŘ		
235	dubové (LP,BK)	P,N	140	30	121	2+6	3K,3I: BO4-6,BK(DB)2-6,BŘ(LP)+-1 0K,0M: BO6-9,BŘ1-2,DB(BK)+-2,SM				
Dubové porosty obnovovat opět na → DB (BK →BK), AK,BŘ → přeměna											
25 Živná stanoviště nižších poloh : 1B,1D • 2B,2D,2H,2S4 • 1V - svahy, obohacované i spráše											
251	smrkové	H(N)	90	20	81	2+6	1B,2B,2H,2S4 : DB5-8,LP(BK)+-2, HB(JV,JS)+-1,JL,JD,BB,TR,DG,MD	DB	20 % : DB, BK, LP, HB, JV, JS, JL, JD, BB, BŘK, TR, JDO	20%	MD 2-6 DG4-8 JDO+
255	dubové	P,N	150	30	131	2+6	1D,2D: DB5-7,BK(LP)1-2,JV(JS)+-1, JD,DG,JDO,HB,JL,TR				
256	bukové (LP,JS)	P,N	130	30	111	2+6	1V: DB5-8,JS(LP)1-2,JV(OL)+-1,JL alter.: BO3-6(2S4)				
Dubové a bukové porosty opět na → DB,BK, AK,BŘ → přeměna											
29 Olšová stanoviště na podmačených půdách: 3L • 1G • 1T - potoční aluvia, močály, rybníky											
291	smrkové	N	90	20	81	2+6	3L: OL6-8,JS1-4,SM+-3,JV(BŘ,OS,VR)+-1	OL JS	1G: 90%-OL,VR	90%	
296	javorojasanové	N,P	100	20	91	2+6	1G: OL7-10,VR+-3,JS(SM,OS,TP)+-1		1T: 75%-DB,BŘ,OL		
297	olšové (s JS)	N,P	80	20	71	2+6	1T: OL6-9,BŘ1-3,SM+-3,DB(OS)+-1,BO		3L: 70%-OL,JV		
31 Vysychavá a sušší acerózní stanoviště středních poloh : 3C, 4C,5C • 3A6,4A3 - mělké, suché svahy											
313	borové	N,P	120	30	101	2+6	3C : BK5-7,DB(LP)1-2,JV(HB,TR)+-1, JS, MD, BŘK,MD,BOČ,BO	BK BO	kat.C: 30%:BK, DB, LP, HB, JD, JV, BŘK, TR	30%	MD 4-8 BOČ 1-3
315	dubové	N,P	150	30	131	2+6	4C : BK4-8,DB1-3,LP1-2,MD+-1, HB, JV, JS, BŘK,TR,BOČ,BO		kat.A:-80%: BK, DB, LP, JV, JS, JL, JD, HB, BŘK, TR		
316	bukové	P,N	140	40	121	2+7	5C: BK5-8,LP(DB)+-2,MD+-1,JV,JS,BO,TR kat.A: BK3-7,JV(LP)1-2,DB+-2, JS,JL,JD,BŘK,TR,MD,HB,SM,BO alter.: BO2-7 (kat.C)				

41 Exponovaná stanoviště středních poloh : 3A,4A • 3F,4F,3S9,4S9,3B9,4B4,4B9 • 3D6,4D3												
411	smrkové	P,N	100	30	81	2+6	BK2-8,,DB(LP,JV)1-2,JD(JS,MD)+-1, HB,JL,DG,BOČ,BO,TR,BŘK alter.:SM1-6 (kat.S,F)	SM BK (BO)	30%:BK, JD, JV, JS, JL, LP, HB, DG	25%	MD3-7 DG+2 BOČ+	
415	dubové	N(P)	140	30	121	2+6						
416	bukové(JV,JS)	P(N)	140	40	121	2+7						
Bukové a dubové porosty obnovovat opět na → BK,DB												
45 Živná stanoviště středních poloh : 3S ,3H,3B • 4S,4B • 3D,4D - hlubší, svěží svahy												
451	smrkové	N,H	90	30	71	2+6	BK2-9,DB2-7,LP(JD)1-2,JS(JV,JL,DG)+-1, HB,TR,MD,JDO alter.: SM1-6 (kateg.S,H)	SM BK DB	25%: BK, DB, JD, LP, JV, JS, JL, HB, TR,JDO	20%	MD2-6 DG5-10 JDO+3	
455	dubové	N(P)	140	30	121	2+6						
456	bukové (JS,LP)	P(N)	130	40	111	2+7						
Bukové (dubové) porosty obnovovat opět na → BK(DB)												
47 Oglejená stanoviště středních poloh : 2V • 3V,4V,(kromě V9) • 3O,4O • 3D3,4D5 • 2P												
471	smrkové	N,P	100	30	81	2+6	2V: DB4-8,JS1-3,LP(BK)1-2,JV+-1 2P: DB6-8,LP1-2,BK(OS)+-1,JD,BŘ alter.:BO3-7,SM 3V,4V,3O,3D,4D: DB(BK)2-8,LP(JD)1-2, JV(JS)+-1,OL,JL,JDO,SM alter.: SM1-4 4O: DB3-8,BK2-6,LP(JD)1-2,JS(JV,OL)+-1, JDO,SM alter.:SM1-4	SM BO DB BK	25 % : BK, DB, JD, LP, JV, JS, JL, HB, JDO, OS	20%	MD+3 DG1-4 JDO1-3	
475	dubové	P,N	150	30	131	2+6						
476	bukové	P(N)	130	40	111	2+7						
Dubové (bukové) porosty obnovovat opět na → DB(BK)												
51 Exponovaná stanoviště vyšších poloh : 5S9,6S9 • 5F • 5B6,5B9,6B9 • 5A,6A • 5K9 • 5N												
511	smrkové	N,P	110	30	91	2+6	5S,5F,5B,6S,6B: BK2-8,KL1-2,JS(JD)+-1, LP,JL,MD,DG,TR,JŘ,SM alter.:SM1-4 5A,6A: BK3-7,KL1-3,JS(JD,LP,JL)+-1, MD,DG,TR,JŘ,SM alter.: SM1-3 5K9,5N: SM5-7,BK2-8,BO+-3,KL(JD,BŘ)+-1, LP,MD,DG	SM BK	30%: BK, JD, JV, JS, JL,LP,DG	25% (5K,5 N- 20%)	MD1-4 DG+2	
513	borové	N(P)	120	30	101	2+5						
516	bukové	P,N	150	40	131	2+7						
Bukové porosty obnovovat opět na → BK												
53 Kyselá stanoviště vyšších poloh : 4K,5K • 5M • 5S6,6S4 - chudší hřbety, svahy, kyselé podloží												
531	smrkové	P,N (H)	120	30	101	2+5	BK2-8,SM3-7,MD(JD)+-1,KL,BŘ,LP,DG,BO alter.: BO1-5	SM BK	25 % : BK,JD,LP,DG	15%	MD5-10 DG+3	
533	borové	P,H	120	30	101	2+5						
536	bukové	P,N	150	40	131	2+6						
Bukové porosty obnovovat opět na → BK												
55 Živná stanoviště vyšších poloh : 5S,6S • 5B,6B • 5D • 7S • 7B - svěží svahy, úpatí (nejvyšší vrcholy)												
551	smrkové	N,H (P)	100	30	81	2+6	5S,6S,5B,6B,5D: BK2-8,KL(JD)+-2, JS(LP,SM)+-1, JL,DG,JDO, MD alter.:SM1-4 7S,7B: BK1-6,SM2-7,KL(JD)+-1,JŘ,BŘ	SM BK	25 % : BK, JD, JV, JS, JL, LP, JDO, TR	20%	MD1-5 DG4-8 JDO+	
556	bukové	P,N	130	40	111	2+7						
Bukové porosty obnovovat opět na → BK												
57 Oglejená stanoviště vyšších poloh : 5O,6O • 7O • 5P,6P • 5V,6V (kromě V9) • 6D4 • 5U												
571	smrkové	N,P	100	30	81	2+7	5V,6V,6D4: BK2-7,KL(JD)+-2,JS (LP,JL,OL) +-1,JDO,DG,MD,SM alter.: SM2-7 5O,6O: SM4-7,BK2-4,JD1-2,JDO,DG,OL,OS 5P,6P: SM5-7,BK2-3,JD1-2, JDO,BŘ,OS,BO alter.: BO;1-5 5U: BK(KL,JV,JS)2-4,JD(LP,JL)+-1, OL, JDO, DG, SM; alter SM1-5 7O: SM6-8,BK(JD)1-2,KL(BŘ)+-1,JŘ,OS	SM BK BO JV, JS	25%: BK,JD, BŘ, JV, JS, JL, LP, JDO, OS 5U-30%: BK, JD, LP, JV, JL	20%	MD+1 DG+2 JDO1-3	
573	borové	N,P	120	30	101	2+6						
576	bukové	P,N	140	40	121	2+7						
Bukové porosty obnovovat opět na → BK												

59 Podmáčená stanoviště středních a vyšších poloh : 3V9,4V9 • 5V9,6V9 • 4G • 5G,6G • 7G											
591	smrkový	P,N	110	30	91	2+7	4G: DB2-8,OL(JD)1-2, JV, LP, BK, BŘ, OS, BO, SM - alter.:SM1-4	SM DB	V9,4G-20%: BK, DB, JD, JV, LP, OL, OS	20%	JDO+3
596	bukový	P,N	130	30	111	2+7	3V9,4V9: DB2-7,BK1-2,OL(JD,JS)+-1, JV, JL,J DO,SM - alter.:SM1-5				
597	olšovný (měk. listn.)	N	80	20	71	2+7	5V9,6V9: SM4-7,JD(BK,OL)+-2,KL(JS,JL)+-1, JDO 5G,6G: SM5-8,OL(JD,BO)1-2, DB,BK,OS,KL,BŘ,JŘ 7G: SM7-9,BŘ(JD,OL)+-1,BO,JŘ	SM SM	5,6G- 15%: BK, JD, JV, OL, OS 7G – 5%:JD,JŘ	10% 5%	
Dubové (bukové) porosty obnovovat opět na → DB(BK)											
01d Mimořádně nepříznivá stanoviště: 1X • 2X • 3X - živné, suché, mělké,svahy, hřebety											
2013	borové (BOČ)	V	150-f	40+	-	2+7	1X,2X: DB8-9,HB(LP,JV,JS,JL,BB,BŘK, MK)1-2, BK+-2,BO,DBP,TS,MD 3X: BK2-7,DB1-5,LP1-2, HB(JV,JS,JL,BŘK,BO)+-1,BB,MK,TS	DB BK	1X,2X-90%: DB, BK, DBP, HB, LP, BB, JV, JS, JL, BŘK, MK, BŘ, TS 3X-80%: BK, DB, HB, LP, JV, JS, JL, JD, BB, BŘK, MK, TS	90% 80%	
2015	dubové (BK,JV)	V	150-f	50+	-	2+8		DBP			
2017	březové (ost. list)	N(V)	80	40	61	2+6					
01e Mimořádně nepříznivá stanoviště: 1Z • 2Z4 • 3Z8 - kyselé, výše i živné, skeletovité svahy, vrcholy											
3013	borové (MD,BOČ)	V	150-f	40+	-	2+6	1Z,2Z4: DB5-10,BO(BK)+-3, LP(HB,BŘ)+-1, BŘK,MK 3Z8: BK3-6,DB1-4, BO+-2, LP(JV,JS,JL,BŘ)+-1	DB BK BO	1Z-70%: DB, HB, LP, BŘ, BŘK, MK 2Z-60%: DB, BK, LP, HB, BŘ 3Z-30%: BK, DB, JD, BŘ	70% 60% 30%	MD+
3015	dubové (BK,JV)	V	150-f	40+	-	2+7					
3017	březové (ost. list)	N(V)	80	40	61	2+6					
01f,g Mimořádně nepříznivá stanoviště: 2Z1 • 3Z1 • 3Y • 4Z • 5Z • 0Z - ± chudé, kyselé, mělké svahy, vrcholy											
4011	smrkové	V	150-f	40+	-	2+6	2Z1: DB3-7,BK(BO)1-4,BŘ+-2, LP, HB	DB	2Z- 60%: DB, BK, LP, HB, BŘ	60%	MD+
4013	borové (MD)	V	150-f	40+	-	2+6	3Z1,4Z,3Y: BK3-7,DB1-3,BO+-5, BŘ+-2, JV, JD, SM, LP,MD	BK BO BK SM BO	3Z,4Z,3Y: 30%: BK, DB, JD, BŘ 5Z:- 30%: BK, JD, BŘ, JŘ, KL	30% 30%	
4017	březové (ost. list)	N(V)	80	40	61	2+7	5Z: BK4-8,BO1-5,BŘ+-2,SM+-4, JD, JŘ,MD		0Z: - 5%: BK, DB, BŘ, JD	5%	
							0Z: BO7-10,BŘ+-4,SM, BK, JŘ, JD				
01ij Mimořádně nepříznivá stanoviště: 1J • 3J - živné, skalnaté, mělké svahy, hřebety											
6011	smrkové	N(V)	100-f	40+	(81)	2+7	1J: DB2-6, JV(LP,HB)2-4,JL (BŘK,BB)+-1, JS,JD,TR,MK 3J: BK2-6, JV(LP)1-4, DB(HB,JS)+-3, JD(JL,SM,BŘK)+-1,TS,MK	DB JV BK JV	1J: 95% DB, LP, HB, JV, JS, JL, BB, BŘK, MK,TR, TS 3J:- 90%:BK,DB,LP, JV,JS, JL, JD, HB, BŘK, MK,TS	95% 90%	
6016	bukové (tvrdé list.)	V	150-f	40+	-	2+7					
6017	březové (ost. list.)	N(V)	80	40	61	2+6					
01k Mimořádně nepříznivá stanoviště: 5J - živné,mělké,skalnaté,nitrofilní svahy,vrcholy											
7011	smrkové	N(V)	110-f	40+	(91)	2+7	BK2-6,KL2-4,JS(LP,JL,JD)+-2,SM+-1,JŘ	BK KL	60 % :BK, KL JV, JS, JL, LP, JD	60%	
7016	bukové (tvrdé list.)	V	150-f	40+	-	2+7					
7017	březové (ost.list.)	N(V)	80	40	61	2+6					

PLO 05 ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ

Přehled základních hospodářských doporučení zastoupených HS

HS	POROSTNÍ TYP (současné porosty)	ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ					CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA - alternativy /desítky %/	zákl. dřeviny (Příl. 6.4 k vyhl. 6.83/96)	meliorač. a zpevňující dřeviny	sníž. % MZD	regionálně nepůvodní dřeviny %	
		1	2	3	4	5						
13 Přirozená borová stanoviště : 0M, 0K, 0N (kvádrové pískovce v okrajích k PLO 18 a 19 • jílovité pískovce a miocenní písky uvnitř PLO 5 - jen slt 0K)												194 ha
133	borové	H	120	20	111	2+5	0M,0K : BO8-9.5,(BK,DB)+-2,BŘ+-0.5	BO, (SM)	0M- 5 %: DB,BŘ,(BK) 0K - 10 %: BK,DB,BŘ 0N - 10 %:BK,JD,BŘ	5 % 10% 10%	(DBČ 2% jen mimo CHKO)	
137	březové	H	80	20	71	2+5	0N : SM5-7,BO1-3,BK1-2,JD+-0.5,BŘ					
21 Exponovaná stanoviště nižších poloh : 1N, 2N • 1C,2C • 2B9, 1A, 2A (exponované svahy, hřbítky, mělké erozí ohrožené půdy)												3381 ha
213	borové (modřínové)	N,P	120	30	101	2+5	1N,2N : a) DB4-8,BO 0-3,LP(HB,BK)+-2,BŘ-1, MD 0-0.5 • b) BO5-6,DB2,LP(HB,BK)2,MD-0.5	BO DB	30 % : BK,DB,LP,HB, BŘ 30 % : BK,LP,JV,HB, JS,DB,BŘK,BB	30%	MD 5%	
215	dubové *)	N,P	150	30	131	2+6	1C,2C : DB6-9,LP+-2,HB+-2,BK+-1					
217	březové (akátové)	N	80	20	71	2+5	1A,2A,2B9 : DB5-7,(LP,BK)2-3,HB+-1,JV+-2, JS,JL					
Poznámka HS 21 : *) dubové porosty obnovovat opět → DB • l.zóna CHKO, biocentra → DB (bez MD)												
23 Kyselá stanoviště nižších poloh : 1K, 1S • 2K, 2I, 2S6 • (2P) (plošiny až střední zvlněné svahy, oligotrofní kambizemě, luvizemě)												1418 ha
231	smrkové	nH	100	20	91	2+5	1K,1S : BO6,DB2-3,LP1-2,MD-1	BO DB	25 % : BK,LP,HB,DB	25%	MD 10%	
233	borové	nH,P	110	20	101	2+5	2K,2I,2S6 : BO6,DB2-3,BK(LP)1-2,MD+-1					
235	dubové (LP,BK)*	P,N	120	30	101	2+5	2P : BO6-7,DB3-4,OS+-1,LP,BK					
237	březové (AK,JS,)	nH	80	20	71	2+5						
Poznámka HS 23 : *) dubové porosty obnovovat opět → DB • l.zóna CHKO, biocentra → DB (bez MD)												
25 Živná stanoviště nižších poloh : 1B, 1H, 1D • 2S0, 2S4, 2B (mimo 2B9), 2H, 2D, 2V (střední zvlněné svahy • mezotrofní až eutrofní kambizemě, hnědozemě, pelozemě a pelické pararendziny)												7303 ha
251	smrkové	pH	90	30	71	2+6	1B,1H,1D : DB5-8,LP1-2,HB+-1,JV+-1,JS+-1, MD 0-0.5	DB	20 % : BK,DB,LP,HB, JV,JS,JL,TR, BŘK	20%	MD 5% (mimo CHKO 10%)	
253	borové(BOČ, MD)	nH	110	30	91	2+6	2S,2B,2H,2D : DB5-7,LP(BK)2,HB+-1,JV+-1, JS+-1, MD 0-0.5					
255	dubové (LP,BK)	nP,N	150	30	131	2+6	2V : DB5-7,LP(BK)+-1,HB+-1,JS+-2,JV+-2,JL					
257	březové (AK)	nH	80	20	71	2+6						
258	topolové (OL)	pH	50	20	41	2+6						
Poznámka HS 25 : l.zóna CHKO, biocentra → DB (bez MD)												
29 Olšová stanoviště na podmáčených půdách : 1T, 1G, 3L • 2L, 3U (prameniště, potočiny)												656 ha
296	JV, JS a tvrdé listnáče	pN	90	20	81	2+5	1T : OL8,BŘ2,DB	OL	1T - 70% : DB,BŘ,OL	70%	--	
297	olšové (+ JS), březové	pN	90	20	81	2+5	1G : OL10, keřové vrby 3L : OL7,JS3,JV 3U : JS5,OL1-2,JV2-3,BK+-2,DB,LP,JL,SM 2L : DB6,JS3,(JV,LP)1,OL,JL	OL OL,JS JS,DB DB	1G - 70 % : OL,VR 3L - 70 % : OL,JV 15 % : BK,JV,JL,LP, OL,DB 15 % : DB,LP,JV,JL, HB,BB,BŘK	70% 15% 15%		
41 Exponovaná stanoviště středních poloh : 3N, 4N • 3B9, 3A • 4B9, 4A • 3C příkré až srázné (kamenité svahy, oligotrofní až mezotrofní kambizemě rankerové)												3024 ha
411	smrkové (modřínové)	pN	100	30	81	2+5	3N,4N : SM5-7,BK2-3, /DB,LP,JD/+-1,MD 0-0.5	SM BK	30 % : BK,DB,LP,JD	15%	MD 5%	
416	bukové (DB, tvrdé list.)	P	150	30-40	131	2+6	3A,4A,3B9,4B9 : BK6-8,DB+-2,JV(JS)+-2,LP+- 1,JD,(MD-0.5)					
417	březové	N	80	20	71	2+6	3C : BK6-8,DB1-2,LP+-1,JV-1,HB,TR,(MD-0.5)					
Poznámka HS 41 : BK porosty obnovovat opět → BK • l.zóna CHKO, biocentra → BK (bez MD)												
43 Kyselá stanoviště středních poloh : 3K, 3I, 3S8 • 4K, 4S5 (plošiny, mírné až příkré svahy • oligotrofní kambizemě, /slt 3I/ - luvizemě)												2966 ha
431	smrkové (modřínové)	N,nH	100	30	81	2+5	a) 3K (altern.), 3I1,3S8,4K,4S5 : SM6-7,BK2-3, JD+-1,MD 0-0.5	SM BO BK	25 % : BK,JD,LP,DB,	10%	MD 5% (mimo CHKO 10%)	
433	borové	nH	110	30	91	2+5	b) 3K (altern.),3I4 : BO5-7,BK2-3,(LP,DB, JD)+-1, MD 0-0.5					
436	bukové (DB, tvrdé list.)	P,(N)	150	30-40	131	2+5						
437	březové	N,nH	80	20	71	2+5						
Poznámka HS 43 : BK porosty obnovovat opět → BK • l.zóna CHKO, biocentra → BK (bez MD)												
45 Živná stanoviště středních poloh : 3S1, 3S6, 3B (mimo 3B9), 3H, 3D • 4S1, 4S4, 4B (mimo 4B9), 4H, 4D (plošiny, mírné až příkré svahy • mezotrofní až eutrické kambizemě)												10473 ha
451	smrkové (modřínové)	N,nH	100	30	81	2+6	SM5-6,BK3-4,(LP,DB,JD,JV)+-1,MD 0-0.5	SM BK	25 % : BK,DB,JD,LP, JV,JS,JL,HB,TR	10%	MD 5% (mimo	
455	dubové	N,nP	150	30	131	2+6						

456	bukové (tvrdé list.)	P,(N)	150	30-40	131	2+6					CHKO 10%)
457	březové	N,nH	80	20	71	2+5					
458	topolové	pH	50	20	41	2+5	BK porosty obnovovat opět → BK				
Poznámka HS 45 : BK porosty obnovovat opět → BK • l.zóna CHKO, biocentra → BK (bez MD)											
47 Oglejená stanoviště středních poloh : a) 3V, 4V • 3O b) 4O, 4P, 4Q c) 4G, 4R (poklesliny, úžlabiny)											1182 ha
471	smrkové	N,(P)	100	30	81	2+5	a) SM 5-6,BK2-3,(DB,LP,JD)+-1,(JV,JS)+-1, MD 0-0.5 b) 4O,(4P): SM6-7,DB2,BK+-1,JD+-1 (4P),4Q: BO6-7,DB1,BK+-1,JD+-1,(BŘ,OS)1	SM BK SM, BO	25 % : BK,JD,DB,LP, JV,JS,JL,HB 25 % : BK,JD,DB,LP, OS	10% 10%	MD 5% (mimo CHKO 10%)
477	březové (OL)	(p)N	80	20	71	2+5	c) 4G,4R : SM8-9,OL1-2,JD	SM	10 % : 4G - BK,JD, DB,JV,LP,OL,OS 4R - BŘ,JD,(OL)	10 %	
478	topolové	pH	50	20	41	2+5					
Poznámka HS 47 : BK porosty obnovovat opět → BK • l.zóna CHKO, biocentra : (slt 3V, 4V) → BK porosty + cenné listnáče, slt 4O → DB porosty (bez MD)											
51 Exponovaná stanoviště vyšších poloh : 5N • 5A • 5U (kamenité svahy, oligotrofní až mezotrofní kambizemě rankerové)											483 ha
511	smrkové	pN	110	30	91	2+5	5N : SM6-7,BK2-3,(JD,KL)+-1,MD 0-1 5A : SM5-6,BK3,KL1-2,JD+-1,MD0-1	SM BK	30 % : BK,JD,JV,LP	10%	MD 10%
516	bukové	P,N	150	40	131	2+6	5U : SM+-6,BK2-4,KL1-3,JS+-3,JD+-2,JL+-1	JV,JS	slt 5U : 30% BK,JV, LP,JL,JD		
517	březové	N	80	20	71	2+5					
Poznámka HS 51 : BK porosty obnovovat opět → BK • l.zóna CHKO, biocentra : → BK porosty + cenné listnáče (bez MD)											
53 Kyselá stanoviště vyšších poloh : 5K (plošiny a mírné až střední svahy v severním okraji PLO • oligotrofní kambizemě)											6 ha
531	smrkové	nH	110	30	91	2+5	SM6-7,BK2-3, JD+-1,MD 0-1	SM	25 % : BK,JD,LP	10%	MD 10%
537	březové	nH	80	20	71	2+5	(BK porosty obnovovat opět → BK)	BK			
55 Živná stanoviště vyšších poloh : 5S, 5B, 5H, 5D (plošiny a mírné až střední svahy na bazaltech a tufech, typické mezotrofní až eutrické kambizemě, SV část Litoměřického středohoří)											562 ha
551	smrkové	nH	110	30	91	2+6	SM6-7,BK2-3, JD+-1,KL 0-1,MD 0-1	SM, BK	25 % : BK,JD,JV,JL, LP,JS	10 %	MD 10%
556	bukové	P,(N)	150	30-40	131	2+6					
557	březové	N,nH	80	20	71	2+5					
Poznámka HS 55 : BK porosty obnovovat opět → BK • l.zóna CHKO, biocentra : → BK porosty + cenné listnáče (bez MD)											
57 Oglejená stanoviště vyšších poloh : 5V • 5O • (5G) (konkávní svahy, úžlabiny, poklesliny)											114 ha
571	smrkové	N,(P)	110	30	91	2+6	5V : SM5-7,BK2-3,JD+-1,KL+-1	SM	25 % : BK,JD,JV,JS, JL	10%	--
577	březové	(p)N	80	20	71	2+5	5O : SM6-7.5,BK2-3,JD+-1 5G : SM9,OL+-1,BK+-1,JD+-1,KL	BK			
01b Mimořádně nepříznivá stanoviště - reliktní bor (OZ), roklinový bor (OY) (kvádrové pískovce v sev. okraji PLO x PLO 19)											4 ha
1013	borové	V	150-f	∞	-	2+6	0Z : BO9-9.5,BŘ+-1,DB+-1 0Y : BO7-9,BK+-2,DB+-2,BŘ	BO	5 % : BK,DB,BŘ	5 %	--
01d Mimořádně nepříznivá stanoviště - dřínová doubrava (1X) (± příkré až srázné slunné svahy, exponované hřebítky)											260 ha
2015	dubové	V	150-f	∞	-	2+6	DB(DBP)5-10,HB+-1,LP+-2,JS+-1,JV+-1, (JL,BB,BŘK,MK)+1	DB, DBP	90 % : DB,HB,LP,BB, BRK,muk, JV,JS,JL	90%	--
01e Mimořádně nepříznivá stanoviště - zakrslá doubrava (1Z), zakrslá buková doubrava (2Z) (± příkré až srázné, slunné svahy, exponované hřebítky)											370 ha
3013	borové (MD)	V,nP	150-f	40-∞	131	2+6	1Z : DB5-10, /LP,HB,BŘ/+-3,BO+-3	DB	70 % : DB,LP,HB, BŘ,břek,muk	70%	--
3015	dubové	V	150-f	∞	-	2+6	2Z : DB5-10, BK 0-3,/LP,HB,BŘ/+-3,BO+-3		60 % : BK,DB,LP,HB, BŘ	60%	
3017	březové (AK, JS)	pN	80	40	61	2+6	DB porosty obnovovat opět → DB				
Poznámka HS 01e : DB porosty obnovovat opět → DB bez borovice • l.zóna CHKO, biocentra : → DB porosty + cenné listnáče (bez BO)											
01f, 01g Mimořádně nepříznivá stanoviště - zakrslé a skeletové dubové bučiny (3Z, 3Y), zakrslá a skeletové bučiny (4Z, 4Y), zakrslé a skeletové jedlové bučiny (5Z, 5Y) (kamenité a skalnaté svahy)											245 ha
4011	smrkové, (MD)	V,pN	110-f	40-∞	91	2+6	3Z,3Y : BK5-7,DB2-4,LP+-1HB+-1,(BŘ,JŘ)+-1	BK	30 % : BK,DB,JD,BŘ	30%	--
4013	borové	V,nP	150-f	40-∞	131	2+6	4Z,4Y: BK7-9,DB1-2,LP-1,(JV,KL)-1,(BŘ,JŘ)-1				
4016	bukové (s dubem aj.)	V	150-f	∞	-	2+6	5Z,5Y : BK7-10,KL+-2,JD+-2,BŘ+-1,SM+-1	BK, SM	30 % : BK,JV,JD,BŘ JŘ	30%	
4017	březové	pN	80	40	61	2+6					
01i, j,k Mimořádně nepříznivá stanoviště - habrová javořina (1J), lipová javořina (3J), suťová javořina (5J) (sutě, balvanité půdy)											884 ha

6011	smrkové	V,pN	110-f	40-∞	91	2+6	<u>1J</u> : DB2,LP3-4,JV2-3,HB1-2,(BŘK,BB,JL/+1	DB,JV	95%: DB,LP,HB,JV, JS,JL,TŘ,BŘK,BB, MK	95%	--
6016	bukové (+ tvrdé listnáče)	V	150-f	∞	-	2+6	<u>3J</u> : BK4,LP3,JV2,JS+-1,JL+-1,HB,DB,TŘ	BK,JV	90%: BK,JV,DB, LP, HB,JS,JL,BŘK, JD	90%	
6017	březové	pN	80	40	61	2+6	<u>5J</u> : BK3-4,JD+-1,KL3-4,JL+-2,JS1-2,LP,JV	BK,JV	60%: BK,JV,JD,JL, LP,JS	60%	

PLO 06 Západočeská pahorkatina

Přehled základních hospodářských doporučení zastoupených HS

TAB. Č. 9.4.: PLO 06 – KATEGORIE LESŮ HOSPODÁŘSKÝCH

HS	POROSTNÍ TYP	ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ					CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA	MELIORAČNÍ A ZPEVNŮJÍCÍ DŘEVINY	Geogr. nepův. dřeviny
		1	2	3	4	5			
13 Přirozená borová stanoviště: 13c:0M, 0K, 13d:0Q <i>permokarbonské sedimenty většinou s kaolinem a na žule, půdy podzolové, písčitojilovité, na žulách písčité</i>									
133	borové	P(N,H)	140	120 (=0K)	20	131	13c:BO 8-9 (DB,BK,BŘ) 1-2 SM MD DBČ	5 % BK,DB ,JŘ,JD,DBČ,BŘ	MD 1-4 DBČ +-1
	borové netvárné (genetika "D")	H	100	nebo bez zásahu	20	91	13d: BO 8-9 (SM BŘ DB) 1-2 JD DBČ OS MD		
	smrkové→231								
21 Exponovaná stanoviště nižších poloh: 21a: 2N, 2K9 (přirazené 1K) 21c: 1A, 2A 21d:1C, 2C, 3C2,9 <i>(exponované svahy a hřbety většinou skeletovité, ohrožené půdní erozí)</i>									
211	smrkové nevhodné	N	100	90-110	20	91	21a,d: BO 7 DB 2 (BK,LP,HB,MD)1	30 %	MD 1-3
213	borové	N(P)	120	110-130	20	111	21c: BO 3-4 DB 2-4 (BK JV MD) 1-2 (HB LP BŘ BŘK BB TS)+1	BK, DB, LP, HB, JD, JV, JS,JL, BŘ, BŘK, BB,TS	
	dubové →255						DB 7-10 BK 0-2 (BO,LP,HB)1 BŘK		
23 Kyselá stanoviště nižších poloh: 2M, 2K, 2I, 3M, 3K5 (přirazené 1M) <i>(průměrné polohy, půdy vodou neovlivněné)</i>									
231	smrkové nevhodné	N(H)	100	(110)	20	91	BO 7 DB 2 (BK,LP,HB,SM) 1 MD JD BŘ DG DBČ	25 % DB BK LP HB JD BŘ DG	MD 1-4 DG+1 DBČ+1
233	borové	N(P,H)	120	(130)	20	111			
	dubové →255						DB 7-10 BK 0-2 (BO,LP,HB)1		
25 Živná stanoviště nižších poloh: 2S, 2H, 2B, 2D 2O <i>(průměrné sušší a teplejší polohy)</i>									
251	smrkové (nevhodné)	N(H,P)	100	90-110	20	91	DB 6-7 SM +-2 (LP,BK, JV) 1-2 JD MD DG	20 % DB BK LP HB JD JV JS JL BB BŘK TR	MD 8-10 DG 1-4
253	borové (± nevhodné)	N(H)	110	80-120	30	91	DB 5-6 BO +-3 (BK,LP,HB,JV) 1-2 MD		
255	dubové	P(N)	150	110-150	30	131	DB 6-10(BK,LP,JS,HB) 0-4 MD JD JV JL BŘK TR		
27 Oglejená chudá stanoviště nižších a středních poloh: 2P, 2Q, 3Q, 4Q, 5Q <i>(kyselé a chudé oglejené půdy na plošinách v nižší části pahorkatiny)</i>									
271	smrkové (nevhodné)	N(H)	100	(110)	20	91	BO 6-8 SM+-2 (DB,BK,JD,BŘ,OS) 2 MD JDO DBČ	20 % DB BK LP HB JD BŘ OS	MD 1-4 JDO +1 DBČ +
273	borové	P(N,H)	120	100-130	20	111	BO 6-8 DB 1-3 JD+1 SM BK BŘ OS MD DBČ		
	dubové →255						DB 7-10 BK 0-2 (BO,MD,BK,BŘ)1		
29 Olšová stanoviště na podmáčených půdách: 3L, 1T, 1G, slt přirazené: 2L <i>(potoční aluvia (3L,5L), podmáčené poklesliny (1G,1T9), údolní nivy větších toků (2L - pro malou rozlohu přirazeno z HS 19)</i>									
297	olšové	(N)	80	70-90	20	71	OL 10 JS OS SM	90%(1G) - OL,VR	-
	(olšové s jasanem)	(N)	90	80-100	20	81	3L: OL 7 JS 3 JV SM 1T:OL 7 SM 2 BŘ 1 DB BO JŘ	70%(3L) - OL, JV 15%) (2L)-DB, LP,JV,JL	
	vrbové	(N)	40	30-50	10- 20	31	1G: OL 9 VR 1 OS SM 2L:DB 6 JS 3 LP 1 JV OS SM OL JL TP	HB 65%(1T) -DB,BŘ, OL	
	listnaté (AK,BŘ,OS)	N	70	50-90	20	61	obnovní cíl dle příslušného HS	dle příslušného HS	
41 Exponovaná stanoviště středních poloh: 41a-3N, 3K9,4N 41b-3C4, 3S9, 3F, 3A ,4A, 3D, 3U <i>(exponované svahy a hřbety většinou skeletovité, ohrožené půdní erozí)</i>									
411	smrkové	P(N)	110	(100)	30	91	41a:SM(BO) 6-7,(BK,DB,LP)-3, (MD,JD,JV)-1 41b: SM 6-7,(BK,DB,LP,JV)-3, (MD,JS,JD,HB)1,JL,TR	30 % BK,DB,JD,LP,DG,JV,JS JL,LP,HB	MD 6- 9
413	borové	(N)P	120	110-130	30	101	41a:BO(SM) 6-7,(BK,DB,LP)-3, (MD,JD,JV)-1 41b:SM 6-7,(BK,DB,LP,JV)-3 (MD,JS,JD,HB)1,JL,		

	bukové→456						41a:BK 7-10 DB +2 (MD,LP)+1 SM 41b: BK 7-10 (JV JS JL) +2 (DB,LP)+1 MD SM		
43 Kyselá stanoviště středních poloh: 3K, 3I, 4K (mírné svahy, půdy vodou neovlivněné)									
431	smrkové	P(N,H)	110	100-120	30	91	SM (BO)7, BK 2, (DB,LP,JD,HB) 1, MD,BŘ,DG	25% BK,JD,LP,DB,HB,DG	MD 8-10 DG 4-7 VJ +1
433	borové	P(N,H)	120	110-130	20(30)	111	BO (SM) 7, DB 2,(BK,LP,JD,HB) 1 MD,BŘ,VJ		
	bukové→456						BK 7-10 DB +2 (BO,LP,HB)+1 SM		
45 Živná stanoviště středních poloh: 3S, 4S, 3B, 4B, 3H (mírně zvlněné svahy a ološiny, půdy živnější, vodou neovlivněné)									
451	smrkové	N(P,H)	100	90-110	30	81	SM 7,(BK,LP) 2, (JD, DB,HB,JV,JS,JL) -1 JDO,TŘ,BO,MD,DG	25 % BK,JD,LP,JV,JL,DB,HB TŘ,JDO,JS	MD 8-13 DG 6-10 JDO +3
453	borové	N(H)	110	100-120	30	91	sukatá BO=přeměna na SM (451) kvalitní BO=obnova opět na BO(433)		
456	bukové	P(N)	140	130-150	40	121	sběrný HS BK 7-10 DB +2 (BO,LP,HB)+1 SM		
	dubové →255						DB 6-10(BK,LP,JS,HB) 0-4 MD JD JV JL		
47 Oglejená stanoviště středních poloh: 41a:3O, 3V, 4O, 4V, 41c:4P, 3P, (mírně zvlněné plošiny a poklesliny , půdy střídavě vlhké většinou s pseudoglejem)									
471	smrkové	N(P,H)	110	100-120	30	91	SM 7, (JD, BK, DB) 2, (LP, JS, OL, MD, BO, JV) 1, JL, JDO	25 % BK, DB, JD, LP, JV, JS, JL,JDO	MD 3-7 JDO 3-7
473	borové	N(H,P)	110	100-120	30	91	41a: jako u SM por. typu (471) 41b:kvalitní BO → BO (473) sukatá BO → SM (471) BO(SM) 7, (JD, BK,DB) 2, (LP, OL, MD) 1		
	dubové→255						DB 6-10(BK,LP)0-4 MD JD SM		
57 Oglejená stanoviště vyšších poloh: 5O, 5P, 5V (mírně zvlněné plošiny, půdy střídavě vlhké s pseudoglejem v polohách na přechodu do vrchoviny)									
571	smrkové	N(P,H)	110	100-120	30	91	SM 7, (JD, BK, DB) 2,(OL,MD,BO,)1 JL, KL, LP, JS, JDO	25 % BK, JD, LP, KL, JS, JL,JDO	MD 3-7 JDO 3-7
59 Podmáčená stanoviště středních a vyšších poloh: 4G, 5G, 6G, 0G, 4R, (slit přiřazené 0T, 0G, 5T) (trvale zamokřené půdy v terénních pokleslinách a plochých úžlabinách)									
591	smrkové	P(N)	120	100-130	30(40)	101	SM 8, (JD, BK, DB)1- 2, (JV,LP,BŘ,OL)+- 1, BO,OS,JL,JDO 0G:SM 6 BO 4 BŘ JD DB OS OL 0T:BO 8 BŘ 2 DB SM 5T:BO 6,SM 2,JD 2,OL,OS,BŘ 4R: SM 10 BŘ JD BO OL	5G,6G=15% 4G=20% BK,JD,KL,LP, OL OS 0G,0T,4R=5% BŘ,OL, OS 5T=10%BŘ,JD,OL,O S. DB	-

TAB. Č. 9.5.: PLO 6 - KATEGORIE LESŮ OCHRANNÝCH

01 Mimořádně nepříznivá stanoviště: 0Z, 1Z, 2Z, 3Z, 1J, 3J, , 3Y (skalnaté hřbety a suťovité svahy v rámci kategorie lesa ochranného)									
011 013 015 016	smrkové borové dubové bukové	(V,P)	(150)	fyz.věk	(50) nepřetrž.	(121)	0Z: BO 8-9 DB +1 BŘ -1 BK 1Z: DB 7-9 BO+1 HB-1 LP-1 BŘ-1 BŘK MK 2Z: DB 3-5 BO+3 BK+3 BŘ+1 HB LP 3Z: BK 4-5 BO 3-5 DB 1-2 BŘ+1 3Y: BK 4-7 DB 1-3 BO-4 JD BŘ 1J: DB 3 HB 2 JV 3 LP 2 BB TS TŘ BŘK 3J: BK 2-4 JV 2-4 JL-2 LP-1 JD -3 DB HB JS SM	0Z: 5% (BK,BŘ DB) 1Z: 70% (DB,HB,LP, BŘ,BŘK,MK) 2Z: 60%(BK,DB,LP,BŘ, HB) 3Z: 30%(BK,DB,JD,BŘ) 3Y:30%(BK,DB,JD,BŘ) 1J -95%(DB,HB,JV,LP, BŘK,BB,TS,TŘ) 3J: 90%(BK,JV,LP,DB, JD,HB,JS,JL	-

zákla

PLO 07 Brdská vrchovina

9.3.1. Přehled základních hospodářských doporučení zastoupených HS

ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ PLO 7 - BRDSKÁ VRCHOVINA

plocha: 64 348,43, ha

HS	POROSTNÍ TYP (současné porosty)	ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ 12345					CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA - alternativy /desítky %/	meliorační a zpevňující dřeviny (Přil. č.4 k vyhl. č.83/96)	sníž. % MZD	geograficky nepůvodní dřeviny %
19	Lužní stanoviště: 2L údolní nivy větších potoků a řek; převažují fluvizemě							64,86 ha 0,10 %		
195	dubové (smíšené)	pH,(P)	150	20	141	2+5	DB6, JS3, JV+-1, LP+-1, OLL, JL	15% DB,LP,JV,JL,HB,BB,BŘK	---	---
191	smrkové	pH	100	20	91	2+5	DB4, JS3, SM2, JV+-1, LP+-1, OLL, JL			
197	jasanové (s olší)	nH,H	90	20	81	2+5	JS4, DB3, OLL1-2, JV1, SM+-1, JL, LP			
198	topolové	H,(HH)	40	10	31	2+5	DB6, JS3, JV+-1, LP+-1, OLL, JL; alt.: TP10			
21	Exponovaná stanoviště nižších poloh: 2C, 3C, 2N, 2K9, 3M9, 2A, 2S9 příkré svahy ± kamenité, hřebeny, kupy; převažují kambizemě rankerové a erodované							433,61 ha 0,67 %		
213	borové - N, C, K9, M9	nN	120	30	101	2+6	BO6, DB2, BK(LP)1, MD1, HB, BR, BOČ	30% C, N, K9, M9: BK,DB,LP,HB,JD,BŘ A, S9: BO - BK,DB,LP,JV,JS, HB,JD,BŘK,BB,TS DB - BK,DB,LP,JV, JS,JL, HB,JD, BŘK,BB,TS	---	MD+-5 BOČ+-1
	borové - A, S9	nN	120	30	101	2+6	BO4, DB3, BK(LP)1, JV1, HB1, JS, JL			
211	smrkové - N, C, K9, M9	nN	100	30	81	2+6	BO6, DB2, BK(LP)1, MD1, HB, BR			
	smrkové - A, S9	nN	100	30	81	2+6	DB5, BO2, BK(LP)1, JV1, HB1, JS, JL			
215	dubové - N, C, K9, M9	pN,P	130	30	111	2+7	DB6, BO3, BK(LP)1, MD, HB, BR			
	dubové - A, S9	pN,P	130	30	111	2+7	DB6, BO1, BK(LP)1,JV1, HB1, JS, JL			
217	akátové (nekvalitní listnaté)	N	70	20	61	2+6	viz HS 213; AK por. alternativa: AK10			
23	Kyselá stanoviště nižších poloh: 2K (kromě 2K9), 2I, 2M, 3M (kromě 3M9), 4M svahy, kupy, hřbety a zvlněné plošiny na kyselém podloží, někdy s hlinitými překryvy; kambizem, luvizem							1 107,90 ha 1,72 %		
233	borové	p(n)H,(nP)	110	20	101	2+5	BO7, DB2, BK(LP)1, MD, HB, BR, DG, BOČ	25% BO - DB,BK,LP,HB,BŘ, JD,DG DB,BK - BK,LP,HB,JD,DB	---	MD+-5 DG+-2 BOČ+-1 DBČ+-1
231	smrkové	nH	100	20	91	2+5	BO6,DB2,BK(LP)1,MD1,SM,HB,BR,DG,DBC			
235	dubové	pN,pH,(P)	130	30	111	2+7	DB7, BO2, BK(LP)1, MD, HB, BR, DG			
236	bukové	P,(pN)	130	40(30)	111	2+7	BK5, DB3, LP1, MD1, BO, HB*			
237	listnaté nekvalitní	H	70	20	61	2+5	BO6, DB2, MD1, LP1, HB, BR			
	SLT 3M, 4M: BO7, DB1, BK(LP)1, BR1, MD, DBČ, BOČ * v BK por. alternativa: DB6, BK2, LP1, MD1, BO, HB									
25	Živná stanoviště nižších poloh: 2S (kromě 2S9), 2B, 2D plošiny, svahy a ploché hřbety, někdy s překryvy spraše či sprašové hlíny; kambizem, hnědozem, luvizem							472,70 ha 0,73 %		
255	dubové (smíšené)	nP,pN,(pH)	160	30	141	2+7	DB7, BK(LP)1, MD1, JV(HB)1, JS, JL, TR, JD	20% - BK,LP,HB,JV,JS, JL,JD,JDO,TR,DB, BŘK,BB	10- -15	MD5-10 DG+-4 JDO+-3
251	smrkové	nH,nN	100	20	91	2+5	DB6,MD2,BK(LP)1,JV1,HB,JS,OS,SM,BO,JD,,JDO,DG			
253	borové	pN,pH	110	20	101	2+5	DB6, BO2, MD1, BK(LP)1, HB, JV, JS			
257	listnaté nekvalitní	pH	70	20	61	2+5	DB5, LP2, BO1, MD1, HB1, JV, JS, OS, TR			
	na LT 2S a 2B1 alternativa: BO6, DB2, MD1, BK(LP)1, HB, JV									
27	Oglejená chudá stanoviště nižších a středních poloh: 2P, 4Q mírně zvlněné plošiny na kyselých horninách s hlinitými až jílovitohlinitými překryvy; pseudoglej až glejový podzol							336,43 ha 0,52 %		
273	borové	nN,(nH,P)	120	20	111	2+6	BO7, DB2, BR1, SM, JD, MD, BK, OS, VJ	20% BO - BK,DB,BŘ,JD,OS, DB - BK,JD,BŘ,OS,DB	10- -15	MD+-5 VJ+ JDO+-1
271	smrkové	(n)N,(n)H	100	20	91	2+6	BO7, SM1, DB1, BR1, JD, BK, MD, OS, VJ,JDO			
275	dubové	pN,(pH,P)	130	30	111	2+7	DB6, BO4, BR, BK, OS, JD			
277	listnaté nekvalitní	nN,(nH)	70	20	61	2+6	BO7, DB1, MD1, BR1, BK, OS			
278	topolové	H	50	20	41	2+6	BO7, DB2, BR1, SM, JD, MD, BK, OS, VJ			
29	Olšová stanoviště na podmáčených půdách: 3L, 5L,1G potoční aluvia a prameniště (s mírně pohyblivou půdní vodou - 3L, 5L) a trvale zamokřené terénní poklesliny (se stagnující vodou 1G); fluvizem, glej							524,77 ha 0,82 %		
297	olšové (smíšené) - L	pN	90	20	81	2+6	OLL5-7, JS2-3, SM1-2, JV, BR, OS *	3L, 5L: 70% - JV,OLL 1G: 90% - OLL,VR	---	---
	olšové - 1G	N,pN	80	20	71	2+6	OLL9, VR1, SM, JS, BR, OS			
291	smrkové	pN	100	20	91	2+6	OLL5, SM3, JS2, JV, BR, OS *			
298	topolové	H	50	20	41	2+6	OLL6, JS3, SM1, JV, BR, OS; alt.: TP 10			
	* SLT 5L: OLL5, JS3, SM1, OLŠ1									
41	Exponovaná stanoviště středních poloh: 3N, 4N, 3K9, 3F, 4F, 3A, 4A, 3D7, (5C) příkré či kamenité svahy, hřebeny a zářezy svahů na různém podloží; kambizem rankerová, erodovaná, podzolovaná							2 280,89 ha 3,54 %		
411	smrkové - N, K9, C	n(p)N,pP	110	30	91	2+7	SM6, BK2, BO1, MD1, JD, JV, LP, DB, BR, DG*	30% N, K9: SM - BK,DB,LP,JD,DG BO,BK - BK,DB,LP,JD F, A, D7:	---	MD5-10 DG+-2
	smrkové - F, A, D7	n(p)N,nP	110	30	91	2+7	SM6, BK2, JV1, MD1,JD,JS,JL,DB,BO,LP,DG			
413	borové - N, K9, C	(n)N,(nP)	120	30	101	2+7	BO5, BK2, DB1, MD2, SM, JV, JD, BR*			
	borové - F, A, D7	(n)N,(nP)	120	30	101	2+7	SM3, BK3-5, BO+-2, JV2, MD, DB, HB, JS, LP			
415	dubové	P,(pN)	130	40(30)	111	2+7	DB7, BO2, BK(LP)1, MD, SM, JD			

416	bukové - N, K9	P,(pN)	130	40(30)	111	2+7	BK6-8, DB1-3, MD+-1, SM+-1, JD, LP, BO	SM - BK,JD,JV,JS,JL, LP,HB,DG		
	bukové - F, A, D7	P,(pN)	130	40(30)	111	2+7	BK6, SM1, JV(LP)1, MD1, DB1, JD, HB, JS			
417	listnaté nekvalitní	N,pN	90	30	71	2+7	viz HS 413	BO - BK,JD,JV,JS,JL, LP,HB		
								(5C: BK,DB,LP,JD,HB)		
	*ve SM porostech alt.: BO5, BK2, DB1, MD2, SM, JV, JD, BR; v BO porostech alt.: SM6, BK2, BO1, MD1, JD, JV, LP, DB, BR, DG SLT 5C: BO(KL)7, BK2, LP1, MD, DB									
43	Kyselá stanoviště středních poloh: 3K (kromě 3K9), 4K, 3I, 4I, 5M svahy, zvlněné plošiny a hřebety na kyselém podloží a chudších hlínách; kambizem, luvizem								15 741,64 ha 24,46 %	
431a	smrkové	nP,nN,(pH)	110	30	91	2+5	SM5-6,BK2,BO1,MD1,DB+-1, JD,HB,LP,BR,DG *	25%		MD5-10
431b	smrkové poškozené	nH,nN,(nP)	100	30	81	2+5	SM5-6,BK2,BO1,MD1,DB+-1,JD,HB,LP,BR,DG *	SM - BK,DB,LP,JD,HB,DG		DG4-6
433	borové	nH,(nN)	110	20	101	2+5	BO6, BK1, DB1, MD1, SM1, JD, HB, LP, BR *			
435	dubové	nP,pN,(H)	130	30	111	2+7	DB7 BK2, MD1, JD, LP, HB, SM **	BO,BK,DB -		
436	bukové	P,(pN)	130	40(30)	111	2+7	BK6, DB2, SM(BO)1, MD1, JD, HB, LP	BK,DB,LP,JD,HB		
437	listnaté nekvalitní	(p)H,(pN)	70	20	61	2+5	SM(BO)6,BK1-2,DB1-2, MD1,JD,HB,LP,BR			
	*SM por. slunné (sušší): alternativa viz HS 433; BO por. stinné: alternativa viz HS 431 ** v DB por. alternativa: BO(SM)6, BK1-2,DB1-2,MD1,JD,HB,LP,BR,DG SLT 3I, 4I alternativa: DB 10, BK, MD, JD, SM, LP, HB									
45	Živná stanoviště středních poloh: 3S, 3B, 3H, 3D2, 3D8, 4S, 4B, 4H svahy, zvlněné plošiny a ploché svahové úžlabiny na neutrálním a bazickém podloží a hlinitých překryvech; kambizem								3 444,32 ha 5,35 %	
451a	smrkové	nN,nH(P)	100	30	81	2+5	SM7,BK2,MD1,JD,BO,DB,HB,JV,JS,LP,JL,TR,DG,JDO	25%		MD5-10
451b	smrkové poškozené	nH,nN	90	20	81	2+5	SM7,BK2,MD1,JD,BO,DB,HB,JV,JS,LP,JL,TR,DG,JDO	SM,BK,BO - BK,DB,JD,LP, JV, JS,JL,HB,TR,JDO	-15	DG5-10 JDO+3
453	borové	nH	100	20	91	2+5	SM6-7,BK2,MD1,BO+-1,JD,DB,HB,JV,JS, LP, DG, JDO			
455a	dubové kvalitní	nP,nN,(pH)	160	30	141	2+7	DB7, BK2, MD1, JD, JV, JS, LP, JL, SM			
455b	dubové běžné kvality	pN,pH,(nN)	130	30	111	2+7	DB7, BK2, MD1, JD, JV, JS, LP, JL, SM *	DB - BK,JD,LP, JV, JS,JL, HB,TR,JDO		
456	bukové	P,(pN)	130	40(30)	111	2+7	BK6-7,DB1-2,MD1,SM+-1,JD+-1,HB,LP,JV,JS, JL,TR			
457	listnaté nekvalitní	(p)H,(pN)	70	20	61	2+5	SM5, DB2, BK1, LP1, MD1, HB, JV, JS, JL			
	Na LT 3B3 alternativa: BO7, BK(DB)2, MD1, SM, HB, JV, LP, DG * v DB porostech alternativa: SM7, BK1-2, MD1, JD+-1, DB, HB, JV, JS, LP, JL									
47	Ogležená stanoviště středních poloh: 3O, 4O, 3P, 4P, 3V, 4V, 3U zvlněné plošiny, ploché úžlabiny a svahové úžlabiny s potůčky, rokliny; pseudoglej, kambizem pseudoglejová, glej, fluvizem								12 133,79 ha 18,86 %	
471a	smrkové - 3V, 4V, 3O, 3U	pN,(pP)	110	30	91	2+6	SM7,DB(BK)2, JD1, MD,LP,JV,JS,JL,HB,OLL,OS,JDO	25%		MD+5
	smrkové - 3P, 4P, 4O	pN,(pP)	110	30	91	2+6	SM5-6,DB(BK)1-2,BO+-2,MD1,JD+-1,LP,OLL,OS,BR,JDO,VJ *	3V, 4V, 3O:	5- -15	VJ+ JDO+5
471b	smrkové poškozené	pN,(pH)	100	30	81	2+6	podle SLT viz HS 471a	SM,BO - BK,DB,JD,LP,JV, JS,JL,HB,JDO		
471c	smrkové proředěné	pN,pH,(pP)	90	30	71	2+6	podle SLT viz HS 471a			
473	borové - 3V, 4V, 3O, 3U	pN,(pP)	110	30	91	2+6	SM7, DB(BK)2 , JD1,BO, MD,JV,JS,OS,OLL,JDO	DB - DB,JD,LP,JV, JS,JL, HB		
	borové - 3P, 4P, 4O	pN,(pP)	110	30	91	2+6	BO5-6, DB(BK)1-2, MD1, SM+-1, JD+-1, OLL,BR,OS *	BK - BK,DB,JD,LP,JV,JS, JL,HB		
475a	dubové kvalitní	pP,pN,(pH)	160	30	141	2+7	podle SLT viz HS 475b	3P, 4P, 4O:		
475b	dubové - 3V, 4V, 3O, 3U	pN,pH,(pP)	140	30	121	2+7	DB7-8, LP2, BK(JV)+1, JD, JS, JL, SM	SM - BK,JD,DB,LP,OS, JDO		
	dubové - 3P, 4P, 4O	pN,pH,(pP)	140	30	121	2+7	DB8, BK(LP)2, MD, JD, BO, BR, OS, SM			
476	bukové	P,(pN)	130	40(30)	111	2+7	BK6-8,DB+-3,SM+-2,JV(LP)+1,JD+-1,MD,HB,JS,JL **	BO - BK,JD,DB,LP,OS, BŘ		
477	olšové (+ list. nekvalitní)	(p)N	70	20	61	2+6	SM6, DB2, OLL1, JD+-1, BK+-1, LP, BR, OS	DB - BK,JD,LP		
478	topolové	H	50	20	41	2+6	podle SLT viz HS 471a	3U: 15% - BK,JV,JL,OLL, DB,LP,JD		
	* ve SM por. alt.: BO5-6, DB(BK)1-2, MD1, SM+-1, JD+-1, OLL, LP, BR, OS; v BO por. alt.: SM5-6, DB(BK)1-2, BO+-2, MD1, JD+-1, LP, OLL, OS, BR, JDO, VJ ** v BK por. alt.: viz HS 475b SLT 3U: JS2-3, DB1-2, JV(KL)2, SM2-3, OLL+-1, LP, BK, JD, JL									
51	Exponovaná stanoviště vyšších poloh: 5N, 6N, 5A, 5F, 6M, 6K9, (7N4) kamenité svahy, hřebeny; kambizem rankerová								2 792,16 ha 4,34 %	
511a	smrkové - 5N	(n)N,(nN)	120	30	101	2+7	SM6-7, BK3, MD(JD)+1, DBZ0-+,BO,JVLP,BR,DG	30%		MD5-10
	smrkové - 6N, 6M, 6K9, (7N)	(n)N,(nN)	120	30	101	2+7	SM6-7, BK3, MD(JD)+1, BO, JV, BR, JŘ	5-6N, M, K9:		DG+2
	smrkové - A, F	(n)N,(nN)	120	30	101	2+7	SM6,BK2,JV1,JD1,DBZ0-+,MD,JS,JL,LP,DG,TR	BK,JD,JV,LP,DG		
511b	smrkové - rezonanční	nP,(nN)	160	40	141	2+7	SM7, BK2, JD1, JV, LP	A, F:		
516	bukové - 5N	nP,(n,pN)	140	40(30)	121	2+7	BK6-7, SM2-3, MD(JD)+1, DBZ0-+, JV, LP	SM - BK,JD,JV,JS,JL,LP, DG		
	bukové - 6N, 6M, 6K9, (7N)	nP,(n,pN)	140	40(30)	121	2+7	BK6-7, SM2-3, MD(JD)+1, JV, JŘ	BK - BK,JD,JV,JS, JL, LP		
	bukové - A, F	nP,(n,pN)	140	40(30)	121	2+7	BK6,SM1-2,JV1-2,JD1,DBZ0-+, MD,JS,JL,LP,TR	(7N: BK,JD,JV,JŘ)		
	SLT 7N: SM8, BK2, JD, BO, JV, BŘ, JŘ									
53	Kyselá stanoviště vyšších poloh: 5K, 6K, 5I, (7M4) svahy, hřebety, zvlněné plošiny na kyselém podloží či s hlinitým překryvem; kambizem, luvizem								6 394,64 ha 9,94 %	
531a	smrkové kvalitní (smíšené)	p(n)P,(nN)	120	40(30)	101	2+5	SM6, BK3, MD(JD)1, LP, JV	25%		MD5-10
531b	smrkové - 5K, 5I	nN,nP,nH	110	30	91	2+5	SM6-7,BK2,MD(JD)1,DBZ 0-1, LP,JV,BO,BR,DG	BK,JD,LP,DG		DG+4

	smrkové - 6K, (7M)	nN,nP,nH	110	30	91	2+5	SM6-7, BK2-3, MD(JD)1, JV, BO, BR, JŘ			
531c	smrkové poškozené	nN,nH(P)	100	30	81	2+5	podle SLT viz HS 531b	(7M: 15% - BK,JD,BŘ)		
533	borové - 5K, 5I	nN,nH	120	30	101	2+5	SM5-6, BK2-3, BO+3,MD+1,DBZ0-1, JD,JV,LP,BR			
	borové - 6K, (7M)	nN,nH	120	30	101	2+5	SM5-6, BK2-3, BO+3, MD+1, JD, JV, BR, JŘ			
536	bukové	P,(pN)	140	40	121	2+7	BK6-7, SM2-3, JD(MD)1, LP, BR, JV			
	SLT 7M: SM8-9, BK1-2, JD, BO, BR, JŘ									
55	Živná stanoviště vyšších poloh: 5S, 6S, 5B, 5D svahy a zvlněné plošiny; kambizem								1 506,85 ha 2,34 %	
551a	smrkové kvalitní (smíšené)	p(n)P, (nN)	120	40 (30)	101	2+5	SM6, BK3, JD(MD)1, JV, JS, JL, LP, DG, JDO	25%		MD5-10
551b	smrkové běžné kvality	nN,nH(P)	110	30	91	2+5	SM7, BK2, JD(MD)1, JV, JS, JL,LP,TR,DG,JDO	SM - BK,JD,JV,JL,LP, JS,JDO,TR	5- -15	DG4-6
551c	smrkové - rezonanční	p(n)P, (nN)	160	40	141	2+5	SM7-8, BK2, JD+1, JV, JL			JDO+3
551d	smrkové poškozené	nN,nH (P)	100	30	81	2+5	SM7, BK2, JD(MD)1, JV, JS, JL,LP,TR,DG,JDO	BK - BK,JD,JV,JL,LP, JS,JDO		
556	bukové	P,(pN)	130	40 (30)	111	2+7	BK6-7, SM2-3, JD(MD)+1, JV, JS, JL, LP, TR			
57	Oglejená stanoviště vyšších poloh: 5P, 6P, 5Q, 6Q, 5O, 6O, 5V1, 6V1, 5U plošiny, plochá úpatí svahů a široké ploché úžlabiny s hlinitými překryvy; pseudoglej								14 521,37 ha 22,57 %	
571a	smrkové - 5P, 5Q, 5O	pN,pP	110	30	91	2+7	SM7,JD1,BO1, BK+1,DBL0-1, MD,BR,OL,OS,JDO	25%		MD8-15
	smrkové - 5V, 5U	pN,pP	110	30	91	2+7	SM7,JD1,BK1-2,DBL0-1, MD,JV,JS,OLL,LP,JDO	O, P, Q:	5- -15	JDO+5
	smrkové - 6P, 6Q, 6O	pN,pP	110	30	91	2+7	SM7, JD1, BO1, BK1, MD, BR, OLL, OS, JDO	BK,JD,JDO,BR,OS		
	smrkové - 6V	pN,pP	110	30	91	2+7	SM7, JD1, BK2, MD, JV, JS, OLL, LP, JDO	V:		
571b	smrkové - rezonanční	pP,(pN)	160	40	141	2+7	SM7-8, JD1-2, BK1-2, JV, JL, LP	BK,JD,JV,JS,JL,LP,JDO		
571c	smrkové poškozené	pN(P), pH	100	30	81	2+7	podle SLT viz HS 571a			
571d	smrkové proředěné	pN,pH,(pP)	90	30	71	2+7	podle SLT viz HS 571a	5U: - 30% - BK,JL,LP,JD, JV		
573	borové - 5P, 5Q, 5O, (5V, 5U)	pN	110	30	91	2+7	SM5, BO3, JD1,BK+1,DBL0-1, MD,BR,OLL,OS			
	borové - 6P, 6Q, 6O, (6V)	pN	110	30	91	2+7	SM5, BO3, JD1, BK1, MD, BR, OLL, OS			
576	bukové	P,(pN)	130	40	111	2+7	BK6-7, SM2-3, JD(MD)+1, JV, JS, LP			
577	olšové (+ listnaté nekvalitní)	(p)N	70	20	61	2+7	SM7, JD1, BO1, OLL1, BK, MD, BR, OS, JDO			
	SLT 5U: SM6, BK2, KL1, JD1, DB, JS, LP, OLL Na SLT 5Q alternativa: BO7, DB2, BR1, SM, JD, MD, BK, OS									
59	Podmáčená stanoviště středních a vyšších poloh: 4G, 5G, 6G, 5V9, 6V9, (5T) terénní poklesliny a ploché úžlabiny na hlinitých až jílovitohlinitých, trvale zamokřených půdách; glej								1 278,45 ha 1,99 %	
591a	smrkové běžné kvality	pN,(pP)	110	30	91	2+7	SM7-8, JD1, DB+1, OLL+1, LP, OS, BR, BO	4G: 20% - BK,JD,DB,LP, JV,OLL,OS	5- -10	---
591b	smrkové poškozené	pN,(pP)	100	30	81	2+7	SM7-8, JD1, DB+1, OLL+1, LP, OS, BR, BO			
597	olšové	pN	80	20	71	2+7	SM8, JD1, OLL1, DB, OS, BR, BO	5G, 6G: 15% - BK,JD,JV, OLL,OS		
								V9: 20% - BK,JD,JV,OLL, OS		
								5T: 10% - DB,JD,BŘ,OS		
	SLT 5T: BO5-7, SM+2, JD1, DB1, BŘ1, OLL, OS									
79	Podmáčená stanoviště horských poloh: 6R, 7R, 7T, 7G podsvahové plošiny a mělké prohlubně plošin na trvale zamokřených půdách; rašelinový glej, organozem								455,72 ha 0,71 %	
791	smrkové	(p)P, (pN)	120	40	101	2+7	SM8-9, JD+1, OLL+1, BR+1, BO, JŘ	5%	+5	---
								T: JD,JŘ		
								R: BŘ,JŘ,JD		
01	Mimořádně nepříznivá stanoviště: 0Z, 1Z, 2Z, 5Z, 6Z, 7Z, 3Y, 4Y, 5Y, 6Y, 3J, 5J kamenité a balvanité sutě, příkré svahy a vrcholy; ranker, litozem, kambizem rankerová								858,34 ha 1,33 %	
011	smrkové	V,(N)	150-f	∞(40)	--	--	0Z: BO9, BR1, DB, BK	0Z: 5% - BK,DB,BŘ		
013	borové	V,(P,N)	150-f	∞(40)	--	--	1Z: DB7-9, BO+2, HB(LP)+1, BR, BRK, MK	1Z: 70% - DB,HB,LP,BŘ,BŘK,MK		
015	dubové	V,(P)	150-f	∞(40)	--	--	2Z: DB5-7, BO+2, BK1-3, HB, LP, BR	2Z: 60% - BK,DB,LP,BŘ,HB		
016	bukové	V,(P)	150-f	∞(40)	--	--	3Y1: BK4-6, DB+2, BO2-4, JD, JV, BR	3Y,4Y: 30% - BK,DB,JD,BR		
017	ostatní listnaté (BŘ, OS, AK)	N, (V)	100-f	40(∞)	81	--	3Y9: BŘ10, BO	5Z,6Z,5Y,6Y: 30% - BK,JD,BR,JR,JV		
							4Y: BK6-7, DB1, BO2-3, JD, JV,BR,SM	3J: 90% - BK,JV,LP,DB,JD,HB,JS,JL,BRK,MK		
							5Y,5Z: BK4-7, SM3, BO+3, JD, JV,BR,JR	5J: 60% - BK,JV,JD,JL,LP,JS		
							3J: BK3,JV3,LP2,SM1,DB1,JD,HB,JS,JL,BRK, MK	7Z: 10% - BK,JD,BŘ,JŘ		
							5J: BK3, JV3, LP1, SM2, JD1, JS, JL			
							6Z: SM3-6, BO+2, BK2-5, BŘ+1, JD, JŘ			
							6Y: SM4-7, BK2-4, JD+1, BO, JV, BŘ, JŘ			
							7Z: SM7-8, BK1-2, JD, BO, BŘ, JŘ			

PLO 08a Křivoklátsko

Přehled základních hospodářských doporučení zastoupených HS plocha: 51 882,39 ha

HS	POROSTNÍ TYP (současné porosty)	ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ					CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA - alternativy /desítky %/	zákl. meliorač. a zpevňující dřeviny (Příl. č.4 k vyhl. č.83/96)	sníž. % MZD	geograficky nepůvodní dřeviny %
		1	2	3	4	5				
13	Přirozená borová stanoviště: 0K, 0Q písčité půdy na třetihorních a čtvrtorních říčních sedimentech a permokarbonských pískovcích; kambizem podzolovaná, podzol pseudoglejový								145,61 ha 0,28 %	
133a	borové (smíšené)	H,(P)	120	20	111	2+5	0K: BO8, DB1, BK1, BŘ, VJ, DBČ	5% -	---	DBČ +
133b	borové genet. kat. D	H, (HH)	100	20	91	2+5	0Q: BO8, DB1, BŘ1, JD, SM	0K: DB,BK,BŘ,DBČ 0Q:BK,DB,JD,JŘ,DBČ,BŘ		VJ 2
19	Lužní stanoviště: 2L úrodné nivy větších potoků; fluvizem								64,99 ha 0,13 %	
195	dubové (smíšené)	pH,(P)	150	20	141	2+5	DB6, JS3, JV+1, LP+1, OLL, JL	15%	---	---
191	smrkové	pH	100	20	91	2+5	DB4, JS3, SM2, JV+1, LP+1, OLL, JL	DB,LP,JV,JL,HB,BB,BŘK		
197	jasanové (s olší)	nH,H	100	20	91	2+5	JS4, DB3, OLL1-2, JV1, SM+1, JL, LP			
198	topolové	H,(HH)	40	10	31	2+5	DB6, JS3, JV+1, LP+1, OLL, JL; alt.: TP10			
21	Exponovaná stanoviště nižších poloh: 1C, 2C, 1A, 2A, 2N, 2M9, 1K9, 2K9, 2S9, 2B9, 2D9 příkré svahy ± kamenité, hřebeny, kupy; převažují kambizemě rankerové a erodované								6 159,68 ha 11,87 %	
213	borové - C, N, K9 II. zóna CHKO	nN	120	30	101	2+6	BO6-7,DB1-2, MD1,BK(LP)+1,HB,BŘ,BŘK,BB,MK BO5,DB2,BK(LP)1,HB1,MD1,JV,BŘ,BŘK,BB,MK	30% C, N, K9, M9: BK,DB,LP,HB,BŘ A, S9, B9, D9: BO - BK,DB,LP,JV,JS, HB,JD,BŘK,BB,TS DB,BK - BK,DB,LP,JV, JS,JL, HB,JD, BŘK,BB,TS	---	MD3 BOČ +
211	borové - A, S9, B9, D9 smrkové - C, N, K9 II. zóna CHKO	nN	120	30	101	2+6	BO2-3,DB4-5,JV(LP)1-2, HB1,BK+1, JS,JL,BŘK,BB BO6-7,DB1-2, MD1,BK(LP)+1,HB,BŘ,BŘK,BB,MK BO5,DB2,BK(LP)1,HB1,MD1,JV,BŘ,BŘK,BB,MK			
215	dubové - C, N, K9 dubové - A, S9, B9, D9	pN,P	130	30	111	2+7	DB6-7,LP(BK)2,BO1-2,HB,MD,BŘ,BŘK,BB,MK,TS DB5-6, BK1-2, LP1-2, JV1-2, HB+1,JS,JL,BŘK,BB			
216	bukové - C, N, K9 bukové - A, S9, B9, D9	pN,(P)	130	30(40)	111	2+7	BK4-6, DB2-4, LP1, MD+1,BO,HB, JV,BŘK,BB BK5-7, DB1-2, LP1-2, JV1-2, HB, JS, JL, BŘK, BB			
217	ostatní listnaté	N	70	20	61	2+6	viz HS 213			
23	Kyselá stanoviště nižších poloh: 1K (kromě 1K9), 2K (kromě 2K9), 2I, 2M (kromě 2M9) svahy, kupy, hřbety a zvlněné plošiny na kyselém podloží, někdy s hlinitými překryvy; kambizem, luvizem								6 589,24 ha 12,70 %	
233	borové II. zóna CHKO	p(n)H,nP	120	20	111	2+5	BO6-7, DB1-2, BK(LP)+1, MD1, HB, BŘ, DG BO5, DB2, BK(LP)2, HB+1,MD+1, BŘ	25% BO - DB,BK,LP,HB,BŘ, JD,DG,DBČ DB,BK - BK,LP,HB,JD,DB	---	MD 4 DG 1 DBČ 1
231	smrkové II. zóna CHKO	nH	100	20	91	2+5	BO6-7,DB1-2,BK(LP)+1,MD1, SM,HB,BŘ,DG BO5, DB2, BK(LP)2, HB+1,MD+1, BŘ			
235	dubové	pN,pH,(P)	130	30	111	2+7	DB6-7, BK(LP)2, BO1, HB+1, MD, JV, BŘ			
236	bukové	P,(pN)	130	40(30)	111	2+7	BK6, DB2, LP1, MD1, BO, JV, HB*			
237	ostatní listnaté	H	70	20	61	2+5	BO6-7, DB1-2, BK(LP)+1, MD1, HB, BŘ			
	2M: BO6-7, DB2, BK1, BŘ+1, DBČ; * v BK porostech alternativa: DB6, BK2, LP1, MD1, BO, JV, HB									
25	Živná stanoviště nižších poloh: 2S (kromě 2S9), 1B, 2B (kromě B9), 1H, 2H, 1D, 2D2, 1V, 1O, 2O plošiny, svahy a ploché hřbety, někdy s překryvy spraše či sprašové hlíny; kambizem typická a pseudoglejová, hnědozem, luvizem								6 795,25 ha 13,10 %	
255	dubové (smíšené)	nP,pN,pH	160	30	141	2+7	1B: DB5-8, LP2, HB+1, BK+1, MD+1, JV, BŘK, BB, TŘ	20% - BK,LP,HB,JV,JS, JL,JD,JDO,TŘ,DB, BŘK,BB	10- -15	MD 10 JDO 2 DG 2
256	bukové	P,(pN)	150	40(30)	131	2+7	1H: DB6-8, HB1-2, LP+1, MD0-1, BŘK, TŘ			
251	smrkové	nH,nN	100	20	91	2+7	2S, 2B, 2H: DB5-6, BK(LP)1-2, JV+1, HB+1, MD+1, SM, BO, BŘK, BB, TŘ			
253	borové	p(n)H	110	20	101	2+7	1D: DB7, HB1, LP1, JV1, JS, JL, MD, BŘK, TŘ			
257	ostatní listnaté	pH	70	20	61	2+7	2D: DB5-6, BK(LP)1-2, JV(JL)+1, JS+1, HB, TŘ, SM, MD, OLL 1V: DB6, JS2, LP1-2, JV+1, JL, OLL, HB, OS, BBK 1O: DBL8, HB1, LP1, JV, JS, JD, OLL, OS 2O: DB5-6, BO0-2, LP1-2, HB+1, JD, JV, JS, OLL, JDO			
	na LT 2S2 a 2B1 alternativa: BO6-7, DB1-2, BK(LP)+1, MD1, HB, JV, BŘ; na LT 2S5 alternativa: SM5, MD1, BK(LP)2, DB1, JV1, HB, BO, JD, JDO, DG; v BK por. alternativa: BK5-7, DB2-3, LP+1, JV(KL)+1, JS, JL, HB, MD, SM, BŘK									
27	Ogležená chudá stanoviště nižších a středních poloh: 2P, 2Q, 4Q mírně zvlněné plošiny na kyselých horninách s hlinitými až jílovitohlinitými překryvy; pseudoglej, podzol pseudoglejový								141,28 ha 0,27 %	
273	borové	nN,(nH,P)	120	20	111	2+6	BO7, DB2, BŘ+1, SM+1, MD, JD, OS, OLL, VJ	20%	10- -15	MD 4 VJ 2 JDO 1
271	smrkové	(n)N,(n)H	100	20	91	2+6	BO6-7,DB2,SM1,BŘ+1,MD,JD,OS,OLL,VJ,JDO	BO - BK,DB,BŘ, JD,OS, SM,VJ		
275	dubové	pN, pH,P	130	30	111	2+7	DB6-7, BO3-4, JD, MD, BŘ, OS, BK, OLL	DB - BK,JD,BŘ,OS,DB		
277	ostatní listnaté	nN,(nH)	70	20	61	2+6	BO7, DB2, BŘ+1, SM+1, MD, JD, OS, OLL, VJ			

ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ PLO 8 - KŘIVOKLÁTSKO A ČESKÝ KRAS

podoblast 8a - Křivoklátsko

plocha: 51 882,39 ha

HS	POROSTNÍ TYP (současné porosty)	ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ					CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA - alternativy /desítky %/	zákl. meliorač. a zpevňující dřeviny (Přil. č.4 k vyhl. č.83/96)	sníž. % MZD	geograficky nepůvodní dřeviny %
		1	2	3	4	5				
29	Olšová stanoviště na podmačených půdách: 3L, 1G, 3U potoční aluvia a prameniště (s mírně pohyblivou půdní vodou - 3L, 3U) a trvale zamokřené terénní poklesliny (se stagnující vodou 1G); fluvizem, glej							945,96 ha 1,82 %		
297	olšové (smíšené) - 3L, 3U	pN	90	20	81	2+6	OLL5-6, JS3, SM1-2, JV, BŘ, OS	3L: 70% - JV,OLL 1G: 90% - OLL,VR 3U: 15% - BK,JV,JL,OLL, DB,LP,JD	---	---
	olšové - 1G	N,pN	80	20	71	2+6	OLL8-10, VR0-2, SM, JS, BŘ, OS			
291	smrkové	pN	100	20	91	2+6	OLL5, SM3, JS2, JV, BŘ, OS			
298	topolové	H	50	20	41	2+6	OLL6, JS3, SM1, JV, BŘ, OS; alt.: TP10			
	SLT 3U: JS4, JV(KL)3, BK1, DB1, OLL1, SM, JD, JL, LP									
41	Exponovaná stanoviště středních poloh: 3N, 3K9, 3S9, B9, 3F, 3A, 3D0 příkré či kamenité svahy, hřebeny a zářezy svahů na různém podloží; kambizem rankerová, erodovaná							3 265,50 ha 6,29 %		
411	smrkové - N, K9	n(p)N,pP	110	30	91	2+6	SM6,BK2-3,MD1,DB+1,BO,JD,JV,LP,BŘ*	30% - N, K9: BK,DB,LP,JD F, A, D0, B9, S9: BK,JD,JV,JS,JL, LP,HB	---	MD 10
	Il. zóna CHKO						SM5,BK3,MD1,DB1,BO,JD,JV,LP,BŘ			
	smrkové - F, A, D0, B9, S9	n(p)N,nP	110	30	91	2+6	SM6, BK2, JV1, MD1,JD,JS,JL,DB,BO,LP			
	Il. zóna CHKO						SM3, BK2-3, JV1-2, MD1,JD,JS,JL,DB,BO,LP			
413	borové - N, K9	(n)N,(nP)	120	30	101	2+6	BO6, BK2, DB(LP)1, MD1, SM, JV, JD, BŘ*			
	Il. zóna CHKO						BO5, BK2, DB(LP)2, MD1, SM, JV, JD, BŘ			
	borové - F, A, D0, B9, S9	(n)N,(nP)	120	30	101	2+6	SM5-6,BK2,JV1,MD1,BO+1,JD,DB,HB,JS,LP			
	Il. zóna CHKO						SM5,BK2,JV2,MD1,BO,JD,DB,HB,JS,LP			
415	dubové - N, K9	P,(pN)	150	40(30)	131	2+7	DB6-7, BO1-2, BK(LP)1, MD1, SM, JD			
	dubové - F, A, D0, B9, S9	P,(pN)	150	40(30)	131	2+7	DB6-7, BK1-2, LP(JV)1-2, MD+1, HB, JS, JL			
416	bukové - N, K9	P,(pN)	150	40(30)	131	2+7	BK6-8, DB1-3, MD1, SM+1, JD, LP, BO			
	bukové - F, A, D0, B9, S9	P,(pN)	150	40(30)	131	2+7	BK7, JV(LP)2, SM+1, MD+1,JD,DB,HB,JS,JL			
417	ostatní listnaté	N,pN	90	30	71	2+6	viz HS 413			
	*ve SM porostech alt.: BO6, BK2, DB(LP)1, MD1, SM, JV, JD, BŘ; v BO porostech alt.: SM6,BK2-3,MD1,DB+1,BO,JD,JV,LP,BŘ									
43	Kyselá stanoviště středních poloh: 3K (kromě 3K9), 3I svahy, zvlněné plošiny a hřbety na kyselém podloží a chudších hlínách; kambizem, luvizem							6 904,02 ha 13,31 %		
431a	smrkové	nP,pH,nN	110	30	91	2+5	SM6-7, BK2, MD1, BO+1,DB,JD,HB,LP,BŘ,DG,VJ*	25% SM - BK,DB,LP,JD,HB,DG BO,BK,DB - BK,DB,LP,JD,HB	---	MD 10 DG 7 VJ +
	Il. zóna CHKO						SM6, BK3, MD1, BO, DB,JD,HB,LP,BŘ			
431b	smrkové poškoz. a proředěné	nH,nN,nP	90	20	81	2+5	SM6-7, BK2, MD1, BO+1,DB,JD,HB,LP,BŘ,DG,VJ*			
	Il. zóna CHKO						SM6, BK3, MD1, BO, DB,JD,HB,LP,BŘ			
433	borové	nH,(nP)	110	30	91	2+5	BO6-7,BK(DB)2,MD1,SM+1,JD,HB,LP,BŘ,VJ*			
	Il. zóna CHKO						BO6, BK(DB)3, MD1,SM, JD, HB, LP, BŘ			
435	dubové	nP,pN(H)	130	30	111	2+7	DB7, BK1-2, MD1, BO+1, JD, LP, HB, SM**			
436	bukové	P,(pN)	150	40	131	2+7	BK6, DB2, SM(BO)1, MD1, JD, HB, LP			
437	ostatní listnaté	(p)H,pN	70	20	61	2+5	SM(BO)6,BK2-3,DB1-2,MD,JD,HB,LP,BR			
	*SM por. slunné (sušší): alternativa viz HS 433; BO por. stinné: alternativa viz HS 431; ** v DB por. alt.: BO(SM)7, BK(DB)2, MD1,JD,HB,LP,BŘ,VJ,DG									
45	Živná stanoviště středních poloh: 3S, 3B (kromě 3B9), 3H, 3D2 svahy, zvlněné plošiny a ploché svahové úžlabiny na neutrálním a bazickém podloží a hlinitých překryvech; kambizem							13 348,88 ha 25,73 %		
451a	smrkové	nN,nH(P)	100	30	81	2+5	SM7,BK2,MD1,JD,JV,KL,BO,DB,HB,JS,LP,JL, TR,DG,JDO*	25% SM,BK,BO - BK,DB,JD,LP, JV, JS,JL,HB,TR,JDO DB - BK,JD,LP, JV, JS,JL, HB,TR,JDO	5- -15	MD 13 JDO 3 DG 10
	Il. zóna CHKO						SM6,BK3,JD1,JV,KL,MD,BO,DB,HB,JS,LP,JL,TR*			
451b	smrkové pošk. a proředěné	nH,nN	90	20	81	2+5	viz HS 451a			
453a	borové kvalitní	nH(nN,P)	110	30	91	2+5	SM(BO)6-7, BK(DB)2, MD1,LP+1,JV,KL,JD,HB, JS, DG,JDO			
	Il. zóna CHKO						SM(BO)6, BK(DB)2-3, MD+1, LP+1,JV,KL,JD,HB,JS			
453b	borové	nH	100	30	81	2+5	SM6-7,BK2,MD1,BO+1,DB,JV, KL,JD,MD,HB, LP,JS,DG,JDO*			
	Il. zóna CHKO						SM6-7, BK2, DB1, BO+1, JV, KL, JD, MD, HB, LP, JS*			
455	dubové	pN,nP,pH	160	30	141	2+7	DB6-7, BK1-2, MD1, LP+1,HB,JD,JV,JS,JL,SM			
456	bukové	P,(pN)	150	40	131	2+7	BK6-7,DB1-2,LP1,SM+1,JD+1,MD,HB,JV,JS,JL,TR			
457	ostatní listnaté	(p)H,(p)N	70	20	61	2+5	SM7, BK1, DB(LP)1, MD1, HB, JV, JS, JL			
	*Na LT 3B3, 3H3 a 3S6 alt.: BO6-7, BK(DB)2-3, MD+1, LP+1, SM, HB, OS, DG, JDO									

ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ PLO 8 - KŘIVOKLÁTSKO A ČESKÝ KRAS

podoblast 8a - Křivoklátsko

plocha: 51 882,39 ha

HS	POROSTNÍ TYP (současné porosty)	ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ					CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA - alternativy /desítky %/	zákl. meliorač. a zpevňující dřeviny (Přil. č.4 k vyhl. č.83/96)	sníž. % MZD	geograficky nepůvodní dřeviny %
		1	2	3	4	5				
47	Oglejená stanoviště středních poloh: 3O, 4O, 3P, 4P, 3V mírně zvlněné plošiny, ploché úžlabiny a svahové úžlabiny s potůčky; pseudoglej, kambizem pseudoglejová, glej									4 484,86 ha 8,64 %
471a	smrkové - 3V, 3O II. zóna CHKO	pN,(pP)	110	30	91	2+6	SM6-7,DB(BK)1-2,JD1, MD+1,LP,JV,JS,JL,HB,OLL,OS,JDO	25% 3V,3O:	5- -15	MD 7 JDO 5
	smrkové - 3P, 4P, 4O II. zóna CHKO	pN,(pP)	110	30	91	2+6	SM6, DB(BK)2, JD1, MD+1, LP(JV)+1,JS,JL, HB,OLL,OS SM5-6, DB(BK)1-2, BO+3, JD1, MD+1, LP, OLL,OS, BŘ,JDO*	SM,BO - BK,DB,JD,LP,JV, JS,JL,HB,JDO		
471b	smrkové pošk. a proředěné	pN,(pH)	90	20	81	2+6	viz HS 471a	BK,DB - BK,DB,JD,LP,JV, JS,JL,HB		
473	borové - 3V, 3O II. zóna CHKO	pN, (pP)	110	30	91	2+6	SM6-7,DB(BK)1-2, JD1,MD+1,BO,LP,JV,JS,HB,OLL,OS,JDO SM6, DB(BK)2, JD1, MD+1, LP(JV)+1, BO, JS, HB, OLL, OS	3P, 4P, 4O: SM - BK,JD,DB,LP,OS, JDO		
	borové - 3P, 4P, 4O II. zóna CHKO	pN,(pP)	110	30	91	2+6	BO5-6,DB(BK)1-2,SM+2,JD+1,MD+1,LP,BŘ,OLL,OS* BO5,DB2,BK+1,SM+2,JD+1,MD+1,LP,BŘ,OLL,OS	BO - BK,JD,DB,LP,OS, BŘ		
475	dubové - 3V, 3O	pP,pN(pH)	160	30	141	2+7	DB7-8, LP1-2, BK(JV)+1,JD,HB,JS,JL,SM,OLL	DB,BK - BK,JD,LP		
	dubové - 3P, 4P, 4O	pP,pN(pH)	160	30	141	2+7	DB8, LP1-2, BK+1,BO,JD,MD,BŘ,OS,OLL,SM			
476	bukové - 3V, 3O	P,(pN)	150	40(30)	131	2+7	BK6-8,DB+3,SM+2,JV(LP)+1,JD+1,MD,HB,JS,JL,OLL			
	bukové - 3P, 4P, 4O	P,(pN)	150	40(30)	131	2+7	BK6, DB+3, SM(BO)+2, LP+1,JD+1, MD, OLL*			
477	olšové (+ ostatní listnaté)	(p)N, (H)	70	20	61	2+6	SM6,DB2,BK+1,OLL+1,JD+1,BO,LP,BR,OS			
	* ve SM por. alt.: BO5-6,DB(BK)1-2,SM+2,JD+1,MD+1,LP,BŘ,OLL,OS; v BO por. alt.: SM5-6,DB(BK)1-2,BO+3,JD1,MD+1,LP,OLL,OS,BŘ,JDO; v BK por. alt.: viz HS 475									
59	Podmáčená stanoviště středních a vyšších poloh: 2G, 3G, 4G terénní poklesliny a ploché úžlabiny na hlinitých až jílovitohlinitých, trvale zamokřených půdách; glej									136,40 ha 0,26 %
591	smrkové	pN,(pP)	110	30	91	2+7	SM7-8, JD1, DB+1, OLL+1, LP, OS, BŘ, BO	20% BK,JD,DB,JV,LP,	10- -15	---
593	borové	pN	120	30	101	2+7	SM5, BO2-4, JD1, DB+1, OLL+1, LP,OS,BŘ	OLL,OS		
597	olšové (+ ostatní listnaté)	pN	90	20	81	2+7	SM6-7, OLL1-2, JD1, DB+1, LP, OS, BŘ, BO			
01	Mimořádně nepříznivá stanoviště: 0Z, 1Z, 2Z, 2Y, 3Y, 1J, 3J Z, J, 3Y - kamenité a balvanité sutě, příkré svahy a vrcholy, 2Y - haldy a skládky hlíny; ranker, litozem, kambizem rankerová, antrozem									2 900,73 ha 5,59 %
011	smrkové	V,(N)	150-f	∞(40)	---	---	0Z: BO9, BŘ1, DB, BK	0Z: 5% - BK,DB,BŘ		
013	borové	V,(P,N)	150-f	∞(40)	---	---	1Z: DB7-9, BO+2, HB(LP)+1, BŘ, BŘK, MK	1Z: 70% - DB,HB,LP,BŘ,BŘK,MK		
015	dubové	V,(P)	150-f	∞(40)	---	---	2Z: DB5-7, BO+2, BK1-3, HB, LP, BŘ	2Z: 60% - BK,DB,LP,BŘ,HB		
016	bukové	V,(P)	150-f	∞(40)	---	---	2Y: BO6, DB2, BR2, HB, LP	2Y: 60% - DB,BŘ,HB,LP		
017	ostatní listnaté	N,(V)	100-f	40(∞)	---	---	3Y: BK4-6, DB1-3, BO+3, JD, JV, BŘ	3Y: 30% - BK,DB,JD,BŘ		
							1J: DB4,JV3,LP2,HB1,JS,JL,TR,BB,BŘK,MK,TS	1J: 95% - DB,JV,HB,LP,JL,BŘK,MK,BB,TS,TR,JS		
							3J: BK3,JV3,LP2,SM1,DB1,JD,HB,JS,JL,BŘK,MK,TS	3J: 90% - BK,JV,LP,DB,JD,HB,JS,JL,BŘK,MK,TS		

PLO 08b Český kras

Přehled základních hospodářských doporučení zastoupených HS

HS	POROSTNÍ TYP (současné porosty)	ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ					CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA - alternativy /desítky %/	zákl. meliorač. a zpevňující dřeviny (Přil. č.4 k vyhl. č.83/96)	sníž. % MZD	geograficky nepůvodní dřeviny %
		1	2	3	4	5				
13	Přirozená borová stanoviště: 0K písčité, podzolované půdy třetihorních sedimentů									1,32 ha 0,02 %
133	borové (smíšené)	H,(HH)	120	20	111	2+5	BO9, DB1, BR, BK, DBČ, VJ	5% - DB,BK,BR,JŘ	---	DBČ + VJ 2
21	Exponovaná stanoviště nižších poloh: 1C, 2C, 1A, 2A, 1K9, 2K9, 2S9, 2B9, 2W9 příkré svahy ± kamenité, hřebeny; převažují kambizemě rankerové a rendzinové a rendziny									2 083,03 ha 28,17 %
213	borové - C,K9 II. zóna CHKO	nN	120	30	101	2+6	BO6-7,DB1-2,MD1,BK(LP)+1,HB,JV,JS,BŘ,JŘ,BŘK,BB,BOČ BO5,DB2-3,BK(LP)1,HB1,MD+1,DBP,JV,JL,JS,BŘ,JŘ,BŘK,BB	30% C,K9: BK,DB,LP,HB,BŘ	---	MD 3 BOČ +
211	smrkové - C,K9 II. zóna CHKO	nN	100	30	81	2+6	BO6-7,DB1-2,MD1,BK(LP)+1,HB,JV,JS,BŘ,JŘ,BŘK,BB,BOČ BO5,DB2-3,BK(LP)1,HB1,MD+1,DBP,JV,JL,JS,BŘ,JŘ,BŘK,BB	A,S9,B9,W9: DB,BK - BK,LP,JV,HB,JS, JL,JD,BŘK, BB,		
215	dubové - C,K9 II. zóna CHKO	pN,P	130	30	111	2+7	DB7, LP(BK)2, BO1, HB, JV, JS, MD, BŘ, JŘ,BŘK,BB DB6,LP2,BK1,HB1,BO,DBP,JV,JL,JS,BŘ,JŘ,BŘK,BB	TS,DB BO - BK,DB,LP,JV,JS, HB,JD,BŘK,BB,TS		
216	bukové - C,K9	pN,P	130	30	111	2+7	BK4-6, DB2-4, LP1, MD+1,BO, HB,JV, JS,BŘK,BB			
216	bukové - A,S9,B9,W9	pN,P	130	30	111	2+7	BK5-7,DB1-2,LP1-2,JV1-2,HB,JD, JS,JL,BŘK,BB			
219a	výmladkové - nepřímý převod	pN,(P)	120	30	101	2+7	viz HS 215			
219b	les nízký (cílový)	N	60	20	51	2+7	DB7, LP(BK)2, HB1, JV, BŘ			
217a	ostatní listnaté	N	70	20	61	2+6	viz HS 213			
217b	akátové	N	70	20	61	2+6	viz HS 213; alternativa: AK10			
23	Kyselá stanoviště nižších poloh: 1K(kromě 1K9), 2K (kromě 2K9), 1I, 2I svahy a zvlněné plošiny na kyselém podloží, někdy s hlinitými překryvy; kambizem, luvizem									1 058,87 ha 14,32 %
233	borové II. zóna CHKO	p(n)H,(P)	110	20	101	2+5	BO6-7, DB1-2, BK(LP)1, MD1, HB, BŘ, DBČ BO5,DB3,BK(LP)1,HB1,MD,BŘ,JŘ	25% BO - DB,BK,LP,HB,JD, BŘ,DG, DBČ	---	MD 4 DG 1 DBČ 1
231	smrkové II. zóna CHKO	nH	100	20	91	2+5	BO5-6,DB1,BK(LP)1-2,MD1,SM+1,HB,DBČ,DG BO4-5,DB2,BK(LP)2,HB1,SM+1,MD	DB,BK - BK,LP,HB,JD,DB		
235	dubové	pN,pH,(P)	130	30	111	2+7	DB6-7, LP(BK)1-2, BO+1, HB1, MD, JV, BŘ, JŘ			
236	bukové	P,(pN)	130	30	111	2+7	BK4-7, DB1-4, LP1, MD+1, HB, JV			
237a	ostatní listnaté II. zóna CHKO	H	70	20	61	2+5	BO6-7, DB1-2, BK(LP)1, MD1, HB, BŘ BO5,DB3,BK(LP)1,HB1,MD,BŘ,JŘ			
237b	akátové	H	70	20	61	2+5	BO6-7, DB1-2, BK(LP)1, MD1,HB,BŘ; alt.:AK10			
239a	výmladkové - nepřímý převod	pN,pH,(P)	120	30	101	2+7	DB6-7, LP(BK)1-2, BO+1, HB1, MD, JV, BŘ, JŘ			
239b	les nízký (cílový)	H	60	20	51	2+7	DB7, LP(BK)2, HB1, JV, BŘ, JŘ			
25	Živná stanoviště nižších poloh: 2S2, 1B, 2B (kromě 2B9), 1W, 2W (kromě 2W9),1H, 2H, 2D, 2V plošiny, svahy a ploché hřbety, někdy s překryvy spraše či sprašové hlíny; kambizem (typická, rendzinová, pseudoglejová), hnědozem									3 281,92 ha 44,39 %
255	dubové (smíšené)	nP,pN,pH	160	30	141	2+7	1B, 1W: DB5-8, LP2, HB+1, BK+1, MD+1, JV, BŘK, BB	20% - BK,LP,HB,JV,JS, JL,JD,TR, BŘK,BB, DB, JDO	10- -15	MD 10 DG 2 JDO 2
251	smrkové	nH,nN	100	20	91	2+7				
253	borové	p(n)H	110	20	101	2+7	1H: DB6-8, HB1-2, LP+1, MD0-1, BŘK			
256	bukové	nP,(pN)	160	40	141	2+7	2S, 2B, 2H, 2W3: DB5-6, BK(LP)1-2, JV+1, HB+1, MD+1, SM, BO, BŘK, BB, DG, JDO			
257a	ostatní listnaté	pH	70	20	61	2+7	2D: DB5-6, BK(LP)1-2, JV(JL)+1, JS+1, HB, SM, MD, OLL, JDO			
257b	akátové	H	70	20	61	2+7				
259a	výmladkové - nepřímý převod	pN,pH,nP	120	30	101	2+7	2V: DB6,JS2,LP1-2,JV+1,KL,JL,OLL,HB,JD,JDO			
259b	les nízký (cílový)	H	60	20	51	2+7	2W1: DB3-5, BK3-5, LP+1, JV(KL)+1, JS, JL, HB, MD, SM, BŘK			
	na SLT 2S alternativa: BO5-7, DB1-3, BK(LP)1, MD1, JV, HB, BŘ; v BK por. alternativa: BK5-7, DB2-3, LP+1, JV(KL)+1, JS, JL, HB, MD, SM, BŘK; AK por. alt.: AK10; les nízký: DB7, LP(BK)2, HB1, JV, JŘ									

ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ PLO 8 - KŘIVOKLÁTSKO A ČESKÝ KRAS
podoblast 8b - Český kras

HS	POROSTNÍ TYP (současné porosty)	ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ					CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA - alternativy /desítky %/	zákl. meliorač. a zpevňující dřeviny (Přil. č.4 k vyhl. č.83/96)	sníž. % MZD	geograficky nepůvodní dřeviny %
		1	2	3	4	5				
29	Olšová stanoviště na podmáčených půdách: 3L, 1G potoční aluvia (s mírně pohyblivou půdní vodou - 3L) a trvale zamokřené terénní poklesliny (se stagnující vodou 1G); fluvizem, glej								17,38 ha	0,24 %
297	olšové (smíšené) - 3L	pN	90	20	81	2+6	OLL5-7, JS2-3, SM0-2, JV, OS	3L: 70% - JV, OLL 1G: 90% - OLL,VR	---	---
	olšové - 1G	N,pN	80	20	71	2+6	OLL8-10, VR0-2, SM, JS, BŘ, OS			
291	smrkové	pN	100	20	91	2+6	OLL5, SM3, JS2, JV, BŘ, OS			
298	topolové	H,(HH)	50	20	41	2+6	OLL6, JS3, SM1, JV, BŘ, OS; alt.: TP10			
01	Mimořádně nepříznivá stanoviště: 0Z, 1Z, 0X, 1X,1J, 3J kamenité a balvanité sutě, příkré svahy a vrcholy; opuštěné lomy (1X9); ranker, litozem (silikátová a karbonátová), kambizem rankerová, rendzina								951,12 ha	12,86 %
011	smrkové	V,(N)	150-f	∞(40)	--	--	0Z: BO9, BŘ1, DB, BK	0Z: 5% - BK,DB,BŘ 1Z: 70% - DB,HB,LP,BŘ,BŘK,MK 0X: 10% - BK,DB,HB,LP,DBP,BŘK,BB,MK 1X: 90% - DB,DBP,HB,LP,BB,BŘK,MK 1J: 95% - DB,JV,HB,LP,JL,BŘK,MK,BB,TR,JS,TS 3J: 90% - BK,JV,LP,DB,JD,HB,JS,JL,BŘK,MK,TS		
013	borové	V,(P,N)	150-f	∞(40)	--	--	1Z: DB7-9, BO+2, HB(LP)+1, BR, BRK, MK			
015	dubové	V,(P)	150-f	∞(40)	--	--	0X: BO9, DB1, DBP, BK, BB, BR, LP, BRK, MK			
016	bukové	V,(P)	150-f	∞(40)	--	--	1X: DB3-5, DBP3-5, LP1, BB1, BRK, HB, MK			
017	akátové (+ ost. list.: BŘ,OS)	N,(V)	100-f	30(∞)	--	--	1J: DB4, JV3, LP2,HB1,JS,JL,TR,BB,BRK,MK,TS			
							3J: BK3,JV3,LP2,SM1,DB1,JD,HB,JS,JL,BRK,MK,TS			
	AK por. alternativa: AK10									

PLO 09 Rakovnicko - kladenská pahorkatina

Přehled základních hospodářských doporučení zastoupených HS

HS	POROSTNÍ TYP (současné porosty)	ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ					CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA - alternativy /desítky %/	meliorační a zpevňující dřeviny (Přil. č.4 k vyhl. č.83/96)	sníž. % MZD	regionálně nepůvodní dřeviny %			
		1	2	3	4	5							
13	Přirozená borová stanoviště: 0K, 0M, 0O, 0P, 0Q, 1M permokarbonské a křídové pískovce a třetihorní štěrkopískové terasy; podzol, kambizem arenická podzolovaná, pseudoglej												
133a	borové	H,P,(HH)	120	20	111	2+5	0K: BO9, DB(BK)1, DBČ, BŘ, VJ, MD 0M: BO8, DB(DBČ)1, BŘ1, VJ, MD 0O: SM3-5, BO4-6, DB(JD)1, BŘ, VJ, MD 0P: BO9, DB1, BŘ, JD, SM, VJ, MD 0Q: BO8, DB1, BŘ1, JD, SM, VJ, MD 1M: BO8, DB(DBČ)2, LP, BŘ, VJ, MD	5% - 0K, 0M: DB,BK,BŘ,DBČ 0O, 0P, 0Q: DB,JD,BŘ 15% - 1M: DB,LP,BŘ,DBČ	---	DBČ+-1 MD1-4 VJ+-1			
133b	borové nepřirůstavé - 0M	H,(HH)	140	20	131	2+5							
133c	borové genet kat. D	H,(HH)	100	20	91	2+5							
131	smrkové	H,(HH)	100	20	91	2+5							
135	dubové	(n)H	130	20	121	2+5							
137a	březové (listnaté nekvalitní)	H	70	20	61	2+5							
137b	akátové	H	70	20	61	2+5	v AK porostech alternativa: BO9, AK1, BŘ; AK10						
19	Lužní stanoviště: 1L, 2L údolní nivy větších potoků a řek; fluvizem kambická, oglejená												
195a	dubové (smíšené)	pH,(P)	150	20	141	2+5	DB5-6, JS3, JV1, LP+-1, OLL, JL, HB, BB *	15% - DB,LP,JV,JL,HB, BB	---	---			
195b	listnaté smíšené (JS,JV + DB)	pH,(P)	120	20	111	2+5							
197	olšové	H	90	20	81	2+5							
198	topolové	H,(HH)	40	10	31	2+5							
	* 1L: DB6, JS2, LP2, JV, JL, OLL, TP, VR, HB, BB, střemcha												
21	Exponovaná stanoviště nižších poloh: 1C, 2C, 2A, 2N, 1K, 2K9, 2M9, 3M9, 2S9 příkré svahy ± kamenité, hřebeny; převažují rendziny, kambizemě rankerové a erodované												
213	borové - N, C, 1K, 2K9, M9	nN	120	30	101	2+6	BO6-7, DB1-2, BK(LP)1-3, MD+-1, HB, BŘ	30% - 2N, 1C, 2C, 1K, 2K9, M9: BK,DB,LP,HB,BŘ, BŘK 2A, 2S9: BK,DB,LP,JV,JS, HB,JL,BŘK	---	MD1-3			
	borové - 2A, 2S9	nN	120	30	101	2+6							
211	smrkové - N, C, 1K, 2K9, M9	nN	100	30	81	2+6	BO7, DB1-2, BK(LP)1, MD+-1, HB, SM, BŘ						
	smrkové - 2A, 2S9	nN	100	30	81	2+6	DB4-5, BO2, LP2, JV1, BK+-1, HB, JS, JL, MD						
215a	dubové - N, C, 1K, 2K9, M9	pN,P	130	30	111	2+7	DB7, LP+-2, HB+-2, BO+-1, BK0-2, MD, BŘ, BŘK						
	dubové - 2A, 2S9	pN,P	130	30	111	2+7	DB4-6, BK1-2, LP1-2, JV1-2, HB+-1, JS, JL, BŘK						
215b	dubové s borovicí - N, C, K, M	pN, (P)	130	30	111	2+7	BO2-4, DB3-7, HB+-2, LP+-2, BK						
	dubové s borovicí - 2A, 2S9	pN, (P)	130	30	111	2+7	DB4, BO2, BK1-2, LP+-2, JV1-2, HB, JL						
217a	březové (listnaté nekvalitní)	N	70	20	61	2+6	viz HS 213						
217b	akátové	N	70	20	61	2+6	viz HS 213; alternativa: AK10						
23	Kyselá stanoviště nižších poloh: 2K (kromě K9), 2I, 2M, 3M, 2S6 svahy, hřebety a zvlhčené plošiny na břidlici, křemenci, žule, fylitu, svoru, granodioritu, opuce a permokarbonu; kambizem												
233	borové	p(n)H,nP	120	20	111	2+5	BO6, DB2, BK(LP)1, MD1, HB, BŘ, DG *	25% - DB,BK,LP,HB, BŘ,DG	---	DG+-1 DBČ+-1 MD1-4			
231	smrkové	nH	100	20	91	2+5							
235	dubové	pH,(pN,P)	130	30	111	2+7							
237a	březové (listnaté nekvalitní)	H	70	20	61	2+5							
237b	akátové	H	70	20	61	2+5							
	* 2M: BO6-7, DB2, BK1, BŘ+-1, DBČ; 3M: BO6-7, BK2, DB1, BŘ1, DBČ												
25	Živná stanoviště nižších poloh: 2S2, 2S4, 2S7, 2B, 2H, 2D, 2V, 2O zvlhčené plošiny a svahy na rule, břidlici, fylitu, opuce a permu, někdy s hlinitými překryvy; kambizem, méně hnědozem												
255	dubové (smíšené)	nP,pN,pH	160	30	141	2+7	2S, 2B, 2H: DB6, LP(BK)2, MD2, HB+, SM0+-, TŘ, DG, JDO, BB, BŘK	20% - BK,LP,HB,JV,JS, JL,JD,JDO,TŘ, DB,BRK,BB	10- -15	JDO1-2 DG1-4 MD8-10			
251	smrkové	nH,(nN)	100	30	81	2+5							
253	borové	p(n)H	120	30	101	2+5	2D: DB6, LP1-2, JV1, JS1, MD+-1, JDO						
257a	březové (listnaté nekvalitní)	(p)H	70	20	61	2+5	2V: DB6, JS2, LP1-2, JV+-1, JL, OLL, HB						
257b	akátové	H	70	20	61	2+5	2O: DB5-6, BO0-2, LP1-2, HB+-1, JD, JV, JS,						
258	topolové (2V)	H	40	10	31	2+5	OLL, JDO						
	na SLT 2S alternativa: BO6, DB2, MD1, BK(LP)1, HB; v TP por. alternativa: TP10; v AK por. alternativa: AK10												
27	Oglejená chudá stanoviště nižších a středních poloh: 2P, 2Q, 3Q, 4Q mírně zvlhčené plošiny na pískovcích, štěrkopískách a žule ± s hlinitými překryvy; pseudoglej až glejový podzol												
273	borové	nN,(nH,P)	120	20	111	2+6	BO7, DB2, BŘ1, SM, JD, MD, BK, OS, VJ, DBČ OS,SM,VJ	20% - BK,DB,BŘ,JD, OS,SM,VJ	10- -15	VJ+-3 MD1-4 DBČ+			
271	smrkové	(n)N,(n)H	100	20	91	2+6							
275	dubové	pN, pH,P	130	30	111	2+7							
277	březové (listnaté nekvalitní)	nN,(nH)	70	20	61	2+6							
29	Olšová stanoviště na podmačených půdách: 3L, 3U, 1G, 1T potoční aluvia (s mírně pohyblivou půdní vodou - 3L, 3U) a trvale zamokřené terénní poklesliny (se stagnující vodou 1G, 1T); fluvizem, glej												
297	olšové (smíšené) - 3L, 3U	pN	90	20	81	2+5	3L: OLL5-7, JS2-3, SM0-2 1G: OLL8-10, VR0-2 1T: OLL5, BŘ2, SM1, OS2, BO, DB 3U: JS2-3, JV(KL)2, SM1-4, DB0-2, BK0-2, OLL+-1, LP, JD, JL	70% - 3L: JV,OLL 90% - 1G: OLL,VR 75% - 1T: DB,BŘ,OLL 15% - 3U: BK,JV,JL, LP, JD,OLL,DB	---	---			
	olšové - 1G, 1T	N,pN	80	20	71	2+5							
291	smrkové	pN	100	30	81	2+5							
298	topolové	H	50	20	41	2+5							

ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ PLO 9 - RAKOVNICKO-KLADENSKÁ PAHORKATINA

HS	POROSTNÍ TYP (současné porosty)	ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ					CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA - alternativy /desítky %/	meliorační a zpevňující dřeviny (Přil. č.4 k vyhl. č.83/96)	sníž. % MZD	regionálně nepůvodní dřeviny %			
		1	2	3	4	5							
31	Vysýchavá stanoviště středních poloh: 3C slunné svahy na opuce, čediči a permokarbonských sedimentech; rendzina, kambizem rendzinová												
316	bukové	P,pN	150	40	131	2+7	BK5-7, DB1-2, LP1-2, MD+2, HB, JD, JV, TR	30% - BK,DB,LP,JD,HB, JV,TR	---	MD1-4			
311	smrkové	(p)N	100	30	81	2+6	BK5-7, DB1-2, LP1-2, MD+2, HB, JD						
313	borové	pN	120	30	101	2+6	BK5-7, DB1-2, LP1-2, MD+1, BO+2						
39	Podmáčená chudá stanoviště: 0T, 0G, 2T, 5T plošiny, poklesliny, úžlabiny na permokarbonských sedimentech ± s hlinitými překryvy; podzol glejový, glej												
393	borové	pN,P	120	30	101	2+6	0T, 0G: BO8, BR2, DB, SM, JD *	5% - 0T, 0G	---	---			
391	smrkové	(p)N	110	30	91	2+6	2T: BO7, BR2, DB1, JD, SM, OLL, OS	10% - 2T, 5T					
397	březové (listnaté nekvalitní)	N(H)	70	20	61	2+6	5T: BO6, SM2, JD2, OLI, OS, BR	DB,JD,BR,OS					
	* Na SLT 0G alternativa: SM6, BO4, BR, JD, DB, OS, OLL												
41	Exponovaná stanoviště středních poloh: 3N, 4N, 3K9, 3A, 3F, 3S4, 3S9, (5A) příkré, většinou kamenité svahy na různém podloží a erozivní rýhy; kambizem rankerová, erodovaná, typická												
411	smrkové - 3N,4N,3K9	n(p)N,pP	110	30	91	2+6	SM6, BK2-3, DB0-1, MD1, BO, JD, LP, JV, DG *	30% - 3N, 4N, 3K9: BK,DB,LP,JD,DG 3A, 5A, 3F, 3S4, 3S9: BK,JD,JV,JS,JL, LP,HB,DG	---	DG+2 MD6-10			
	smrkové - 3A,5A,3F,3S4,3S9	n(p)N,nP	110	30	91	2+6	SM6, BK2, JV1, MD1, JD, JS, JL, DB, LP, DG						
413	borové - 3N,4N,3K9	(n)N,(n)P	120	30	101	2+6	BO6, BK2, DB1, MD1, SM, JD, JV, BR *						
	borové - 3A,5A,3F,3S4,3S9	(n)N	120	30	101	2+6	SM6, BK2, JV1, MD1, JD, BO, JS, JL, DB, LP						
416	bukové - 3N,4N,3K9	P,(p)N	150	40	131	2+7	BK6-8, DB1-3, MD+1, LP+1, SM1, JD, BO						
	bukové - 3A,5A,3F,3S4,3S9	P,(p)N	150	40	131	2+7	BK7, JV(LP)2, MD1, JD, SM, DB, HB, JS						
417	březové (listnaté nekvalitní)	N,pN	80	30	61	2+6	viz HS 413						
	*ve SM porostech alt.: BO6, BK2, DB1, MD1, SM, JD, JV, BR; v BO porostech alt.: SM6, BK2-3, DB0-1, MD1, BO, JD, LP, JV, DG												
43	Kyselé stanoviště středních poloh: 3K (kromě 3K9), 4K, 3I, 3S8, (5K) svahy, zvlněné plošiny na břidlici, fylitu, svoru, žule, granodioritu, opuce, permokarbonu a hlíně; kambizem, méně luvizem												
431a	smrkové	pH,(n)P	110	30	91	2+5	SM6-7, BK2-3, MD1, BO, DB, JD, LP, BR, DG, VJ*	25% - BK,DB,LP,JD, HB,DG	---	DG3-7 VJ+1 MD8-10			
431b	smrkové poškozené (prořed.)	pH,(n)P	90	20	81	2+5	SM6-7, BK2-3, MD1, BO, DB, JD, LP, BR, DG, VJ*						
433a	borové	nH,(n)P	120	30	101	2+5	BO6-7, BK(DB)2-3, MD1, SM, JD, HB, LP, BR, VJ*						
433b	borové genet. kat. D	H,(HH)	90	20	81	2+5	BO6-7, BK(DB)2-3, MD1, SM, JD, HB, LP, BR, VJ*						
435	dubové	nP,(H)	130	30	111	2+7	DB7, BK2, MD1, JD, LP, HB, SM **						
436	bukové	P,(p)N	150	40	131	2+7	BK6-8, DB1-2, MD1, SM(BO)0-1, JD, HB, LP						
437	březové (listnaté nekvalitní)	(p)H	70	20	61	2+5	SM(BO)6, BK1-2, DB1-2, MD1, JD, HB, LP, BR						
	*SM por. sušší: alternativa viz HS 433; BO por. stinné: alternativa viz HS 431; ** v DB por. alternativa: BO(SM)6, BK1-2, DB1-2, MD1,JD,HB,LP,BR,VJ,DG												
45	Živná stanoviště středních poloh: 3S1, 3S2, 3S7, 4S, 3H, 3B, 3D, (5S) svahy, zvlněné plošiny a úžlabiny na spilitu, čediči, granodioritu, břidlici, opuce, permokarbonu, permu a hlíně; kambizem												
451a	smrkové - 3S, 3B, 3H, (5S)	nH(nN,P)	100	30	81	2+5	SM6, BK2-3, MD1, JD+1, DB, JV, LP,TR,DG,JDO	25% - BK,DB,JD,LP,JV, JS,JL,HB,TR, JDO	5- -15	JDO+3 DG8-10 MD10-15			
	smrkové - 3D	nH(nN,P)	100	30	81	2+5	SM6, BK(LP)2, MD1, JV1, JD, DB, JS, JL,DG,JDO						
451b	smrkové poškozené (prořed.)	nH,nN	90	20	81	2+5	viz 451a						
453a	borové kvalitní	nH(nN,P)	110	30	91	2+5	SM5-6, BK2-3, MD1,BO+2,LP,JD,DB,JV,DG,JDO*						
453b	borové běžné kvality	nH	100	30	81	2+5	SM6, BK2-3, MD1, LP+1, JD,BO,DB,JV, DG,JDO						
455	dubové - 3S, 3B, 3H, (5S)	pN,nP,pH	160	30	141	2+7	DB6-7, BK1-2, MD1, LP+1, HB, JV, JL **						
	dubové - 3D	pN,nP,pH	160	30	141	2+7	DB6-7, BK1-2, MD1, LP(JV)+1, HB, JS, JL **						
456	bukové - 3S, 3B, 3H, (5S)	P,(p)N	150	40	131	2+7	BK6-7,DB1-2, MD1, JD+1, SM, HB, LP,JV,JL,TR						
	bukové - 3D	P,(p)N	150	40	131	2+7	BK6-7,DB1-2, MD1, JD+1, JV1, SM, LP, JS, JL						
457	březové (listnaté nekvalitní)	(p)H	70	20	61	2+5	SM5, DB2, BK1, LP1, MD1, HB, JV, JS, JL *						
458	topolové	H	50	20	41	2+5	viz HS 451						
	*V kvalitních BO porostech a na LT 3B3 a 3H3 alt.: BO7, BK(DB)2, MD1, JD, JV, LP, DG, JDO; **v DB porostech alt.: SM6, BK2-3, MD1, JD+1, DB,JV,LP,TR,DG,JDO												
47	Oglejená stanoviště středních poloh: 3O, 3P, 4P, 3V, (5V, 5O, 5P) zvlněné plošiny, prohlubně, svahové úžlabiny s potůčky; pseudoglej, kambizem pseudoglejová, glej												
471a	smrkové - 3V,3O,3U,(5V,5O)	pN,(p)P	110	30	91	2+6	SM7,DB(BK)1-2,MD1,JD+1,LP,JV,JS,JL,HB,OLL,JDO**	25% - 3V, 3O, (5V, 5O): BK,DB,JD,LP,JV, JS,JL,HB,JDO 3P, 4P, (5P): BK,DB,JD,LP, OS,BR,JDO 3U: BK,JV,JL, LP,JD, OLL,DB	5- -15	JDO2-5 MD5-10			
	smrkové - 3P, 4P, (5P)	pN,(p)P	110	30	91	2+6	SM5-6,DB1-2,BO+2,MD1,JD+1,BK,LP,OLL,OS,BR,JDO*						
471b	smrkové poškozené (prořed.)	pN,(p)H	90	20	81	2+6	viz 471a						
473	borové - 3V,3O,3U,(5V,5O)	pN,(p)P	120	30	101	2+6	SM7, DB(BK)1-2, MD1,JD+1,BO,LP,JV,JS,JDO **						
	borové - 3P, 4P, (5P)	pN,(p)P	120	30	101	2+6	BO5-6, DB1-2, MD1, SM+1,JD+1,BK,LP,BR,OS *						
475	dubové - 3V,3O,3U,(5V,5O)	pP,(pN,pH)	160	30	141	2+7	DB7-8, LP2, BK(JV)+1, JD, JS, JL, SM **						
	dubové - 3P, 4P, (5P)	pP,(pN,pH)	160	30	141	2+7	DB8, BK(LP)2, MD, JD, BO, BR, OS, SM *						
476	bukové - 3V,3O,3U,(5V,5O)	pN,(P)	150	40	131	2+7	BK6-8,DB+2,LP(JV)+1,JD+1, MD,SM,HB,JS,JL**						
	bukové - 3P, 4P, (5P)	pN	150	40	131	2+7	SM5-6,DB1-2,BO+2,MD1,JD+1,BK,LP,OLL,OS,BR,JDO						
477a	olšové	(p)N	90	20	81	2+6	SM6, DB2, OLL1, JD, BK, LP, BR, OS **						
477b	březové (listnaté nekvalitní)	(p)N,(H)	70	20	61	2+6	SM6, DB2, BK+1, OLL+1, JD+1, LP, BR, OS **						
478	topolové	H,(N)	50	20	41	2+6	viz HS 471						
	*ve SM por. alt.: BO5-6, DB1-2, MD1, SM+1, JD+1, BK, LP, BR, OS; v BO por. alt.: SM5-6, DB1-2, BO+2, MD1, JD+1, BK, LP, OLL, OS, BR, JDO; v DB por. alt.: viz HS 471; **3U: JS2-3, DB1-2, JV(KL)2, SM2-3, OLL+1, LP, BK, JD, JL												

ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ PLO 9 - RAKOVNICKO-KLADENSKÁ PAHORKATINA

HS	POROSTNÍ TYP (současné porosty)	ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ					CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA - alternativy /desítky %/	meliorační a zpevňující dřeviny (Přil. č.4 k vyhl. č.83/96)	sníž. % MZD	regionálně nepůvodní dřeviny %
		1	2	3	4	5				
59 Podmáčená stanoviště středních a vyšších poloh: 2G, 4G terénní poklesliny a ploché úžlabiny na hlinitých až jílovitohlinitých, trvale zamokřených půdách; glej										
591	smrkové	pN,(pP)	110	30	91	2+7	SM7-8, OLL1-2, JD1, DB, LP, OS, BŘ, BO	20% - JD,DB,LP,JV, OLL,OS	10- -15	---
593	borové	pN	120	30	101	2+7	SM4-6, BO2-4, OLL1-2, JD1, DB, OS, BŘ			
597a	olšové	pN	90	20	81	2+7	SM7-8, OLL1-2, JD1, DB, OS, BŘ			
597b	březové (listnaté nekvalitní)	pN	70	20	61	2+7	SM8, JD1, OLL1, DB, OS, BŘ, BO			
01 Mimořádně nepříznivá stanoviště: 0Z, 1Z, 2Z, 2Y, 3Y, 1X, 2X, 3J sutě, příkré svahy a vrcholy, haldy, býv. lomy; ranker, litozem, rendzina, pararendzina, kambizem rankerová, antrozem										
011	smrkové	V,(N)	150-f	∞(40)	---	---	0Z: BO9, BŘ1, DB	5% - 0Z: BK,DB,BŘ 70% - 1Z: DB,HB,LP,BŘ,BŘK,MK 60% - 2Z: BK,DB,LP,BŘ,HB 5% - 2Y1: BŘ,DB 60% - 2Y2: BK,DB,LP,BŘ,HB 30% - 3Y: BK,DB,JD,BŘ 90% - 1X: DB,DBP,HB,LP,JV,JS,JL,BB, BŘK,MK 90% - 2X: DB,BK,HB,LP,JV,JS,JL,BB, BŘK,MK 90% - 3J: BK,JV,LP,DB, JD,HB,JS,JL, BŘK,MK		
013	borové	V,(P,N)	150-f	∞(40)	---	---	1Z: DB6-9, BO+3, HB(LP)+1, BŘ, BŘK, MK			
015	dubové	V,(P)	150-f	∞(40)	---	---	2Z: DB4-7, BO+3, BK1-3, BŘ+1, HB, LP			
016	bukové	V,(P)	150-f	∞(40)	---	---	2Y1: BO8, BŘ2, DB			
017	březové (listnaté nekvalitní)	V,(N)	100-f	30	81	---	2Y2: DB7, BO2, BŘ1, HB, LP, BK			
							3Y: BK4-6, DB2-4, BO+2, JD, JV, BŘ			
							1X: DB6-9, DBP0-3,HB+1,BŘK+1,LP,JV,JS,JL, MK,BB, keře			
							2X: DB5,DBP1,BK1-2,HB1,BŘK+1,LP+1,JV,JS, JL,keře			
							3J: BK3-4,JV2-3,LP2-3,JD1,DB+1,HB,JS,JL, BŘK, MK			

PLO 10 STŘEDOČESKÁ PAHORKATINA

ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ *plocha: 194 248,16 ha*

HS	POROSTNÍ TYP (současné porosty)	ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ 12345					CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA - alternativy /desítky %/	meliorační a zpevňující dřeviny (Přil. č.4 k vyhl. č.83/96)	sníž. % MZD	geograficky nepůvodní dřeviny %			
13	Přírozená borová stanoviště: 0C2, 0K, 0M, 0P, 0Q, 1M písčité, podzolované půdy třetihorních sedimentů										699,41 ha 0,36 %		
133a	borové kvalitní	P,N,(H)	130	20	121	2+5	0M,0K: BO7-9, DB+2, BR+1, SM0-1, DBC	0C, 0K, 0M, 0P, 0Q: 5% - BK,DB,JŘ,JD,DBČ,BŘ 1M: 15% - DB,BŘ,HB,LP,JD,DBČ	---	DBC +1			
133b	borové běžné kvality	H,(P,HH)	110	20	101	2+5	0C: BO9, (DB, BR, JD)1 0P,0Q: BO6-8, SM+3, DB+2, BŘ1, JD, DBČ 1M: BO6-8, DB(DBČ)1-3, BŘ+1, HB, LP						
19	Lužní stanoviště: 1U, 1L, 2L, 3U údolní nivy větších potoků a řek; převažují fluvizemě										1 266,91 ha 0,65 %		
195a	dubové kvalitní i běžné kvality	pH,P	150	30	131	2+5	DB6,JS2,LP1,JV+1,JL+1,OLL,HB,TP,VR,BB	15% 1L, 2L: LP,JV,JL,HB,BB,BŘK,DB 1U: JL,LP,OLL,VR,OS,DB 3U: BK,JV,JL,LP,JD,OLL,DB	---	TPK +			
195b	dubové nekvalitní	pH	100	20	91	2+5	DB6, JS3, JV+1, LP+1, OLL, JL						
191	smrkové	pH	100	20	91	2+5	DB5, JS3-4, JV1, LP+1, SM, OLL, JL						
197a	jasanové (smíšené)	nH,H	110	20	101	2+5	JS4, DB4, OLL1, JV1, SM, JL, LP						
197b	olšové (smíšené)	(p)H	90	20	81	2+5	JS4, DB3, OLL2, JV1, JL, LP,VR						
198	topolové	H,(HH)	40	10	31	2+5	DB6, JS3, JV+1, LP+1, OLL, JL; alt.: TP10						
	SLT 1U: TP2-6, OLL1-2, JS1-3, VR+2, DB1-5, JL, OS; 3U: JS2-3, DB1-2, JV(KL)2, SM2-3, OLL+1, LP, BK, JD, JL												
21	Exponovaná stanoviště nižších poloh: 1C, 2C, 2N, 1A, 2A, 2M9, 3M9, 2K9, 2S9, 2B9 příkré svahy ± kamenité, hřebeny, kupy; převažují kambizemě rankerové a erodované										8 180,72 ha 4,21 %		
213	borové - N,C,M9,K9	nN	120	30	101	2+6	BO7, DB2, BK(LP)1, MD, HB, BR	30% N, C, M9, K9: BK,DB,LP,HB,JD,BŘ A, S9, B9: BO - BK,DB,LP,JV,JS, HB,JD,BŘK,BB,TS DB - BK,DB,LP,JV, JS, JL,HB,JD, BŘK,BB,TS	---	MD 1-3			
	borové - A,S9,B9	nN	120	30	101	2+6	BO4, DB3, BK(LP)1, JV1, HB1, JS, JL						
211	smrkové - N,C,M9,K9	nN	100	30	81	2+6	BO7, DB2, BK(LP)1, MD, HB, BR						
	smrkové - A,S9,B9	nN	100	30	81	2+6	DB5, BO2, BK(LP)1, JV1, HB1, JS, JL, MD, SM						
215	dubové - N,C,M9,K9	pN,P	130	30	111	2+7	DB6, BO3, BK(LP)1, MD, HB, BR						
	dubové - A,S9,B9	pN,P	130	30	111	2+7	DB6, BO1, BK(LP)1, JV1, HB1, JS, JL						
216	bukové	pN,(P)	130	30	111	2+7	viz HS 213; alternativa: BK6, DB3, LP1						
217	akátové (ostatní listnaté)	N	70	20	61	2+6	viz HS 213; AK por. alternativa: AK10						
23	Kyselá stanoviště nižších poloh: 1K, 2K (kromě K9), 2I, 2M, 3M, 4M (kromě M9), 1S, 2S0, 2S1, 2S6 svahy, kupy, hřbety a zvlněné plošiny na kyselém podloží, někdy s hlinitými překryvy; kambizem, luvizem										21 149,45 ha 10,89 %		
233	borové	p(n)H,(n)P	110	20	101	2+5	BO7, DB2, BK(LP)1, MD, HB, BR	25% BO - DB,BK,LP,HB,BŘ, JD,DG DB,BK - BK,LP,HB,JD,DB	---	MD 1-4 DG +1 DBC +1			
231	smrkové	nH	100	20	91	2+5	BO6,DB2,BK(LP)1,MD1,SM,HB,BR,DG,DBC						
235	dubové	pN,pH,(P)	130	30	111	2+7	DB7, BO2, BK(LP)1, MD, HB, BR, DG						
236	bukové	P,(pN)	130	30	111	2+7	BK5, DB3, LP1, MD1, BO, HB *						
237	ostatní listnaté	H	70	20	61	2+5	BO6, DB2, MD1, LP1, BK, HB, BR						
	SLT 3M, 4M: BO7, DB1, BK(LP)1, BR1, MD; 1K: BO7, DB1, LP1, BR1, HB, MD; 1S: BO4-7, DB1-4, HB1. LP1, MD, BŘ * v BK por. alternativa: DB6, BK2, LP1, MD1, BO, HB												
25	Živná stanoviště nižších poloh: 2S2, 2S5, 2S7, 2S8, 1B, 2B (kromě 2B9), 2H, 2D, 1V, 2V, 2O zvlněné plošiny a svahy na zvětralých bohatých hornin, někdy s hlinitými překryvy; kambizem popř. hnědozem										7 871,90 ha 4,05 %		
255a	dubové kvalitní i běžné kvality	nP,pN,(pH)	160	30	141	2+7	DB7,BK(LP)1,MD1,JV(HB)1,JS,JL,OLL,TR,JD	20% BK,LP,HB,JV,JS, JL,JD, JDO,TŘ,DB, BŘK,BB	10- -15	MD 8-10 DG 1-4 JDO +2			
255b	dubové nekvalitní	pN,pH,(pP)	120	20	111	2+7	DB7,BK(LP)1,MD1,JV(HB)1,JS,JL,OLL,TR,JD						
251	smrkové	nH,nN	100	20	91	2+5	DB6,MD2,BK(LP)1,JV1,HB,JS,OLL,OS,SM,BO,JD,JDO,DG						
253	borové	p(n)H	110	20	101	2+5	DB6, BO2, MD1, BK(LP)1, HB, JV, JS						
256	bukové	P,(pN)	150	40	131	2+7	BK5, DB2, LP1, HB1, MD1, JD, JV, JS, JL,TR *						
257	ostatní listnaté	(p)H	70	20	61	2+5	DB5,LP2,BO0-1,MD1,HB1,JS+1,JV,OLL,OS,TR						
258	topolové	H	50	20	41	2+5	DB7, LP1, JV(HB)1, JS1, JL, OLL, TR						
	2D9: JS2-3, DB1-2, JV(KL)2, SM2-3, OLL+1, LP, BK, JD, JL na LT 2S a 2B1 alternativa: BO6, DB2, MD1, BK(LP)1, HB, JV; na LT 2S5, 2D alternativa: SM5, MD2, BK(LP)1, DB1, JV1, HB, BO,JD, JDO, DG * v BK por. alt.: viz HS 255												
27	Oglejená chudá stanoviště nižších a středních poloh: 1P, 2P, 1Q, 2Q, 3Q, 4Q chudé hlinité až jílovitohlinité překryvy na mírně zvlněných plošinách; pseudoglej až glejový podzol										1 312,74 ha 0,68 %		
273a	borové kvalitní	nN, nP	130	30	111	2+6	BO7, DB2, BŘ+1, SM(JD)+1, MD, BK, OS	20% BO - BK,DB,BŘ,JD,OS DB - BK,JD,BŘ,OS,DB	10- -15	MD 1-4 JDO +1 VJ +			
273b	borové běžné kvality	nN,(nH,P)	120	20	111	2+6	BO7, DB2, BR1, SM, JD, MD, BK, OS, VJ						
271	smrkové	(n)N,(n)H	100	20	91	2+6	BO7, SM1, DB1, BR1, JD, BK, MD, OS, VJ						
275	dubové	pN,(pH,P)	130	30	111	2+7	DB6, BO4, MD, BR, BK, OS, JD						
277	ostatní listnaté	nN,(nH)	70	20	61	2+6	BO7, DB1, MD1, BR1, BK, OS						
278	topolové	H	50	20	41	2+6	BO7, DB2, BR1, SM, JD, MD, BK, OS						
	1P: BO4-7, DB2-5, BR1, SM+1, OS, MD												
29	Olšová stanoviště na podmačených půdách: 3L, 1G, 1T potoční aluvia a prameniště (s mírně pohyblivou půdní vodou - 3L,3U) a trvale zamokřené terénní poklesliny (se stagnující vodou 1G,1T); fluvizem, glej										1 773,74 ha 0,91 %		
297a	olšové (s JS a SM)	pN	90	20	81	2+6	OLL5-6, JS3, SM1-2, JV, BR, OS	3L: 70% - JV,OLL 1G: 90% - OLL,VR 1T: 75% - DB,BŘ,OLL	---	---			
297b	olšové	N,pN	80	20	71	2+6	OLL7, JS2, SM1, VR, BR, OS						
291	smrkové	pN	100	20	91	2+6	OLL5, SM3, JS2, JV, BR, OS						
298	topolové	H	50	20	41	2+6	OLL6,JS3,SM0-1,VR0-1,JV,BR,OS; alt.: TP10						
	SLT 1T: OLL6-8, BŘ+3, SM0-2, BO, DB OS, JŘ; 1G: OLL9, VR1, SM, JS, BR, OS												

ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ PLO 10 - STŘEDOČESKÁ PAHORKATINA

plocha: 194

248,16 ha

HS	POROSTNÍ TYP (současné porosty)	ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ 12345					CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA - alternativy /desítky %/	meliorační a zpevňující dřeviny (Přil. č.4 k vyhl. č.83/96)	sníž. % MZD	geograficky nepůvodní dřeviny %
31	Vysýchavá a sušší acerózní a bázičká stanoviště středních poloh: 3C, 4C, 3A6, 3A9 kupy, slunné svahy a hřbety na neutrálních horninách a vápencích; kambizem rankerová									1 322,20 ha 0,68 %
316	bukové (smíšené)	P,pN	130	40	111	2+7	BK7, DB2, LP1, MD, BO, JV, HB, JS, TR, JD	3C,4C: 30% - BK - BK,DB,LP,JD,HB,JV, BŘK,TŘ BO - BK,DB,LP,JD,HB 3A: 80% - BK,DB,LP,JV,JS,JL,JD, HB,BŘK,TŘ	---	MD 1-5
311	smrkové (nevhodné)	pN	90	30	71	2+6	BK7, DB2, LP1, MD, BO, JV, HB, JS, TR, JD			
313	borové	pN	120	30	101	2+6	BO4, BK3, DB2, LP1, MD, HB, JV			
315	dubové	pN	130	30	111	2+7	BO2, BK4, DB3, LP1, MD, JV, HB, JS, TR *			
	* v DB porostech alt. BK7, DB2, LP1, MD, BO, JV, HB, JS, TR, JD									
35	Živná bázičká stanoviště středních poloh: 3W svahy, hřbety, ploché svahové úžlabiny na vápenci; kambizem, ranker									44,56 ha 0,02 %
356	bukové	P,(pN)	130	40(30)	111	2+7	BK7,DB1-2,JV(LP)1,MD+-1,HB,JS,JL,BŘK,JD,TŘ	70% BK,DB,JV,JS,LP,JD,JL, HB,BŘK,TŘ	---	MD 1-5
351	smrkové (nevhodné)	nN,nH	90	30	71	2+5	BK6, DB2, MD1, LP(JV)1, SM, HB, JS, TŘ			
353	borové	nN	110	30	91	2+5	BK7, DB2, LP(JV)1, BO, MD, HB, JS			
355	dubové	pN,(P)	130	30	111	2+7	DB5, BK4, JV(LP)1, BO, MD, HB, JS, JL, TŘ			
39	Podmáčená chudá stanoviště: 0T, 2T, 3T, 5T ploché poklesliny na plošinách s nepříznivými odtokovými poměry; fluvizem, glej									38,84 ha 0,02 %
391	smrkové (s BO)	pN	110	30	91	2+6	BO5-7, SM2-4, BŘ1, DB, OLL, OS	0T: 5% - DB,JD,BŘ,OS 2T, 3T, 5T: 10% - DB,JD,BŘ,OS	---	---
393	borové (se SM)	pN,P	120	30	101	2+6	BO6-7, SM1-2, DB1, BŘ+-1, JD+-1, OLL, OS			
41	Exponovaná stanoviště středních poloh: 3N, 4N, 3K9, 4K9, 4M9, 3S9, 4S9, 3B9, 4B9, 3F, 4F, 3A1, 3A3, 3A5, 4A, 3D6, 3D7, 4D3 příkré či kamenité svahy, hřebeny a zářezy svahů na různém podloží; kambizem rankerová, erodovaná, typická									10 241,85 ha 5,27 %
411	smrkové - N, K9, M9	n(p)N,pP	110	30	91	2+6	SM6,BK2,BO1,MD1,JD,JV,LP,DB,BR,DG *	30% N, K9, M9: SM - BK,DB,LP,JD,DG BO,BK - BK,DB,LP,JD F, A, D, S9, B9: SM - BK,JD,JV,JS,JL, LP,HB,DG BK,BO - BK,JD,JV,JS,JL, LP,HB	---	MD 5-10 DG +-3
	smrkové - F, A, D, S9, B9	n(p)N,nP	110	30	91	2+6	SM6, BK2, JV1, MD1,JD,JS,JL,DB,BO,LP,DG			
413	borové - N, K9, M9	(n)N,(nP)	120	30	101	2+6	BO6, BK2, DB1, MD1, SM, JV, JD, BR *			
	borové - F, A, D, S9, B9	(n)N,(nP)	120	30	101	2+6	SM3, BK3-5, BO+-2, JV2, MD, DB, HB,JS,LP			
415	dubové	P,(pN)	130	30	111	2+7	DB7, BO2, BK(LP)1, MD, SM, JD			
416	bukové - N, K9, M9	P,(pN)	130	40	111	2+7	BK6-8, DB1-3, MD+-1, SM+-1, JD, LP, BO			
	bukové - F, A, D, S9, B9	P,(pN)	130	40	111	2+7	BK7, SM1, JV(LP)1, MD1, JD, DB, HB, JS			
417	ostatní listnaté	N,pN	90	30	71	2+6	viz HS 413			
	*ve SM porostech alt.: BO5, BK2, DB1, MD2, SM, JV, JD, BR; v BO porostech alt.: SM6, BK2, BO1, MD1, JD, JV, LP, DB, BR, DG									
43	Kyselá stanoviště středních poloh: 3K (kromě 3K9), 4K (kromě 4K9), 3I, 4I, 3S0, 3S3, 3S5, 4S3, 4S4, 4S6 svahy, zvlněné plošiny a hřbety na kyselém podloží a chudších hlínách; kambizem, luvizem									60 454,88 ha 31,12 %
431	smrkové	nP,nN,(pH)	110	30	91	2+5	SM6, BK2, BO1, MD1, DB, JD, HB, LP, BR,DG*	25% SM - BK,DB,LP,JD,HB,DG BO,BK,DB - BK,DB,LP,JD,HB	---	MD 8-10 DG 3-7
433a	borové kvalitní	nP, (nH)	120	30	101	2+5	BO6, BK1, DB1, MD1, SM1, JD, HB, LP, BR			
433b	borové běžné kvality	nH,(nP)	110	20	101	2+5	BO6, BK1, DB1, MD1, SM1, JD, HB, LP, BR *			
435	dubové	nP,pN(H)	130	30	111	2+7	DB7, BK2, MD1, JD, LP, HB, SM **			
436	bukové	P,(pN)	130	40	111	2+7	BK6, DB2, SM(BO)1, MD1, JD, HB, LP			
437	ostatní listnaté	(p)H	70	20	61	2+5	SM(BO)6,BK1-2,DB1-2,MD1,JD,HB,LP,BR			
	*SM por. slunné (sušší): alternativa viz HS 433; BO por. stinné: alternativa viz HS 431 ** v DB por. alternativa: BO(SM)6, BK1-2, DB1-2, MD1, JD, HB, LP, BR, DG									
45	Živná stanoviště středních poloh: 3S1, 3S2, 3S4, 3S6, 3S7, 3S8, 4S1, 4S2, 4S7, 4S8, 3H, 4H, 3-4B (kromě B9), 3D3, 3D8, 3D9, 4D1, 4D5 svahy, zvlněné plošiny a ploché svahové úžlabiny na neutrálním a bazickém podloží a hlinitých překryvech; kambizem									47 059,28 ha 24,23 %
451a	smrkové kvalitní (smíšené)	n(p)P,nN	110	40	91	2+5	SM6,BK3,MD1,JD,BO,DB,HB,JV,JS,LP,JL,TR,DG,JDO	25% SM,BK,BO - BK,DB,JD,LP, JV,JS,JL,HB,TŘ,JDO DB - BK,JD,LP, JV, JS,JL, HB,TŘ,JDO	-15	MD 10-15 DG 5-10 JDO +-2
451b	smrkové běžné kvality	nN,nH(P)	100	30	81	2+5	SM7,BK2,MD1,JD,BO,DB,HB,JV,JS,LP,JL,TR,DG,JDO			
453	borové	nH	100	20	91	2+5	SM6-7,BK2,MD1,BO+-1,JD,DB,HB,JV,JS,LP,DG, JDO			
455a	dubové kvalitní	pP,nN(pH)	160	30	141	2+7	DB7, BK2, MD1, JD, JV, JS, LP, JL, SM			
455b	dubové běžné kvality	pN,pH,(P)	130	30	111	2+7	SM7, BK1-2, MD1, JD+-1, DB, HB,JV,JS,LP,JL*			
456	bukové	P,(pN)	130	40	111	2+7	BK6-7,DB1-2,MD1,SM+-1,JD+-1,HB,LP,JV,JS, JL,TR			
457	ostatní listnaté	(p)H,(p)N	70	20	61	2+5	SM5, DB2, BK1, LP1, MD1, HB, JV, JS, JL			
	Na LT 3B3 alternativa: BO7, BK(DB)2, MD1, SM, HB, JV, LP, DG, JDO * v DB porostech alternativa: DB7, BK2, MD1, JD, JV, JS, LP, JL, SM									

ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ PLO 10 - STŘEDOČESKÁ PAHORKATINA

plocha: 194

248,16 ha

HS	POROSTNÍ TYP (současné porosty)	ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ 12345					CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA - alternativy /desítky %/	meliorační a zpevňující dřeviny (Přil. č.4 k vyhl. č.83/96)	sníž. % MZD	geograficky nepůvodní dřeviny %	
47	Oglejená stanoviště středních poloh: 3O, 4O, 3P, 4P, 3V, 4V zvlněné plošiny, prohlubně, svahové úžlabiny s potůčky; pseudoglej, kambizem pseudoglejová, glej								27 541,19 ha 14,18 %		
471a	smrkové kvalitní (smíšené)	pP, (pN)	120	40	101	2+6	viz. HS 471b - smrkové	25%	5- -15	MD 1-5 JDO +3 VJ +	
471b	smrkové - 3V,4V,3O	pN,(pP)	110	30	91	2+6	SM7,DB(BK)2, JD1, MD,LP,JV,JS,JL,HB, OLL,OS,JDO	3V, 4V, 3O:			
	smrkové - 3P,4P,4O	pN,(pP)	110	30	91	2+6	SM5-6,DB(BK)1-2,BO+2,MD1,JD+1,LP,OLL,OS,BR,JDO,VJ*	SM,BO - BK,DB,JD,LP,JV, JS,JL,HB,JDO			
473a	borové kvalitní	pP, (pN)	120	30	101	2+6	viz. HS 473b - borové				
473b	borové - 3V,4V,3O	pN,(pP)	110	30	91	2+6	SM7, DB(BK)2, JD1, MD, BO,LP,JV,JS,OS,JDO	DB - BK,JD,LP,JV, JS,JL, HB			
	borové - 3P,4P,4O	pN,(pP)	110	30	91	2+6	BO5-6, DB(BK)1-2, MD1,SM+-1,JD+-1, LP, BR, OS*	BK - BK,DB,JD,LP,JV,JS, JL,HB			
475a	dubové - kvalitní	pP,pN(pH)	160	30	141	2+7	viz HS 475b - dubové				
475b	dubové - 3V,4V,3O	pN,pH,(pP)	140	30	121	2+7	DB7-8, LP2, BK(JV)+-1, JD, JS, JL, SM	3P, 4P, 4O:			
	dubové - 3P,4P,4O	pN,pH,(pP)	140	30	121	2+7	DB8, BK(LP)2, MD, JD, BO, BR, OS, SM	SM - BK,JD,DB,LP,OS, JDO			
476	bukové	P,(pN)	130	40	111	2+7	BK6-8,DB+-3,SM+-2,JV(LP)+-1,JD+-1,MD,HB,JS,JL **				
477	olšové (+ ostatní listnaté)	(p)N	70	20	61	2+6	SM6, DB2, BK+-1, OLL+-1, JD+-1,LP,BR,OS	BO - BK,JD,DB,LP,OS, BŘ DB - BK,JD,LP			
478	topolové	H	50	20	41	2+6	viz. HS 471				
	*ve SM por. alt.: BO5-6, DB(BK)1-2, MD1, SM+-1, JD+-1, LP, BR, OS; v BO por. alt.: SM5-6, DB(BK)1-2, BO+-2, MD1, JD+-1, LP, OLL, OS, BR, JDO, VJ ** v BK por. alternativa: viz HS 475b										
51	Exponovaná stanoviště vyšších poloh: 5A, 5F, 5S9 kamenité vrcholy a svahy; kambizem								32,24 ha 0,02 %		
511a	smrkové kvalitní (smíšené)	(n,p)P(N)	130	40	111	2+6	SM5,BK3,JV1,JD1,,MD,JS,JL,LP,TR	30%	---	MD 3-7 DG +1	
511b	smrkové běžné kvality	nN, (nP)	120	30(40)	101	2+6	SM6,BK2,JV1,JD1,,MD,JS,JL,LP,DG,TR *	SM - BK,JD,JV,JS,JL,LP,DG			
513	borové	(n)N	120	30	101	2+6	SM5-6,BK2,BO+-3,JD+-1,MD,LP,DG,TR *	BK -BK,JD,JV,JS,JL,LP			
516	bukové	nP,(p,nN)	140	40(30)	121	2+7	BK6-7,SM1-2,JV1,JD1,,MD,JS,JL,LP,TR				
	* alternativa: BK6-7,SM1-2,JV1,JD1,,MD,JS,JL,LP,TR										
53	Kyselá stanoviště vyšších poloh: 5I, 5K plošiny, mírné až zvlněné svahy; kambizem								63,39 ha 0,03 %		
531a	smrkové kvalitní (smíšené)	p(n)P(N)	120	40(30)	101	2+5	SM6, BK3, MD(JD)1, LP, JV	25%	---	MD 5-10	
531b	smrkové běžné kvality	nN,nH,nP	110	30	91	2+5	SM6-7, BK2-3, MD(JD)1, LP, JV, BO, BŘ *	BK,JD,LP,DG			
533	borové	nN,nH	120	30	101	2+5	SM5-6, BK2-3, BO+-3, MD1, JD,BŘ, JV *				
536	bukové	P, (pN)	140	40	121	2+7	BK6-7, SM2-3, JD(MD)1, LP, BŘ, JV				
	alternativa: BK6-7, SM2-3, JD(MD)1, LP, BR, JV										
55	Živná stanoviště vyšších poloh: 5B, 5H, 5S (kromě 5S9), 5D hřbety, svahy, mírné svahy při hřebenech; kambizem.								389,62 ha 0,20 %		
551a	smrkové kvalitní (smíšené)	p(n)P (N)	120	30	101	2+5	SM6, BK3, JD(MD)1, JV, JS, JL, LP *	25%	5- -15	MD 1-5	
551b	smrkové běžné kvality	nN,nH,(P)	110	30	91	2+5	SM7, BK2, JD(MD)1, JV, JS, JL, LP, TR *	SM - BK,JD,JV,JL,LP, JS,JDO,TR			
553	borové	nN, nH	110	30	91	2+5	SM7, BK2, JD(MD)1, JV, JS, JL, LP, TR *				
556	bukové	P, (pN)	130	40(30)	111	2+7	BK6-7, SM2-3, JD(MD)+1, JV, JS, JL, LP, TR	BK - BK,JD,JV,JL,LP, JS,JDO			
	alternativa: BK6-7, SM2-3, JD(MD)+-1, JV, JS, JL, LP, TR										
57	Oglejená stanoviště vyšších poloh: 5P, 5O, 5V plošiny a plochá úpatí svahů s hlinitými překryvy; pseudoglej								254,40 ha 0,13 %		
571a	smrkové kvalitní (smíšené)	pP,(pN)	120	40	101	2+6	viz. HS 571b - smrkové	25%	5- -15	MD 4-7 JDO +5	
571b	smrkové - 5P, 5O	pN, pP	110	30	91	2+6	SM7,BO1,JD1,BK1,MD,BR,OS,OLL,DBL,JDO	O, P:			
	smrkové - 5V	pN,pP	110	30	91	2+6	SM6-7, BK2, JD1,JV+-1,JS,JL,LP,OLL,MD,JDO	BK,JD,JDO,BR,OS			
573a	borové kvalitní	pN, (pP)	120	30	101	2+6	SM4-5, BO3-4, BK1, JD1, MD, DBL, BŘ	V:			
573b	borové běžné kvality	pN	110	30	91	2+6	SM5, BO3, JD1, BK+-1, DBL, MD, BR, OLL,OS	BK,JD,JV,JS,JL,LP,JDO			
576	bukové	P,(pN)	130	40	111	2+7	BK6-7, SM2-3, JD(MD)+-1, JV, JS, LP				
577	olšové (+ listnaté nekvalitní)	(p)N	70	20	61	2+6	SM7, JD1, BO1, OLL1, BK, MD, BR, OS, JDO				
59	Podmáčená stanoviště středních a vyšších poloh: 3G, 4G, 5G terénní poklesliny a ploché úžlabiny na hlinitých až jílovitohlinitých, trvale zamokřených půdách; glej								866,14 ha 0,45 %		
591	smrkové	pN,(pP)	110	30	91	2+7	SM7-8, JD1, DB+-1, OLL+-1, LP, OS, BR, BO	3G, 4G: 20% -	5- -10	---	
593	borové	pN	120	30	101	2+7	SM5-7, BO2-4, JD1, OLL+-1, OS, BR	SM - BK,JD,DB,LP,JV, OLL,OS			
597	olšové	pN	80	20	71	2+7	SM8, JD1, OLL1, DB, OS, BR, BO	DB - BK,JD,DB,LP,JV 5G: 15% - BK,JD,JV, OLL, OS			

ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ PLO 10 - STŘEDOČESKÁ PAHORKATINA
plocha: 194
248,16 ha

HS	POROSTNÍ TYP (současné porosty)	ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ					CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA - alternativy /desítky %/	meliorační a zpevňující dřeviny (Přil. č.4 k vyhl. č.83/96)	sníž. % MZD	geograficky nepůvodní dřeviny %
		1	2	3	4	5				
01	Mimořádně nepříznivé stanoviště: 0C3, 0Z, 1Z, 2Z, 3Z, 4Z, 5Z, 2Y, 3Y, 4Y, 1J, 3J, 0R kamenité a balvanité sutě, příkré svahy a vrcholy; ranker, litozem, kambizem rankerová; 0R - chudé rašeliny; 3Y9 - výsypky, antrozemě									3 684,71 ha 1,90 %
011	smrkové	V,(N)	150-f	∞(40)	--	--	0Z: BO9, BR+-1, DB+-1, BK	0Z: 5% - BK,DB,BŘ		
013	borové	V,(P,N)	150-f	∞(40)	--	--	1Z: DB7-9, BO+-2, HB(LP)+-1, BR, BRK, MK	1Z: 70% - DB,HB,LP,BŘ,BŘK,MK		
015	dubové	V,(P)	150-f	∞(40)	--	--	2Z,2Y: DB5-7, BO+-2, BK1-3, HB, LP, BR	2Z,2Y: 60% - BK,DB,LP,BŘ,HB		
016	bukové	V,(P)	150-f	∞(40)	--	--	3Z: BK3-5, DB1-4, BO+-5, BŘ+-1	3Z,4Z,3Y,4Y: 30% - BK,DB,JD,BR		
017	akátové (+BŘ)	N,(V)	100-f	40(∞)	--	--	4Z: BK5-6,BO2-4,DB1,BR1,SM,JD	5Z: 30% - BK,JD,BR,JR,JV		
							5Z: BK4-7, SM3, BO+-3, JD, BR,JR	1J: 95% - DB,JV,HB,LP,JL,BŘK,MK,BB, TS,TŘ,JS		
							3Y1: BK4-6, DB+-2, BO2-4, JD, JV, BR	3J: 90% - BK,JV,LP,DB,JD,HB,JS,JL,BRK,MK		
							3Y9: BR7-8, BO2-3, OS	0R: 5% - BŘP,BL		
							4Y: BK5-7,BO2-4,DB+-1,SM,JD,JV,BR	0C: 5% - BK,DB,JD,BŘ		
							1J: DB4, JV3, LP2,HB1,JS,JL,TR,BB,BRK,MK			
							3J: BK3,JV3,LP2,SM1,DB1,JD,HB,JS,JL,BRK,MK			
							3J9: SM3-5,JV2,BK(LP)1-2,JS1-2,DB1,MD,JD, HB,BO,JL,OLL			
							0R: BO5, BŘ5			
							0C: BO9, (DB, BR, JD)1			
	AK por. alternativa: AK10; 3Y9 - BR por. alternativa: BR 10									

Vysvětlivky:

Porostní typ: Zařazení dle současných porostních skupin podle převládající dřeviny. Porosty s převahou JD, JDO a DG jsou zařazeny do SM porostního typu;
porosty s převahou MD jsou zařazeny do BO porostního typu; porosty cenných listnáčů (LP, JV, JS, JL) jsou zařazeny do BK porostního typu.

Základní doporučení: 1 - hospodářský způsob: H - holosečný maloplošný, HH - holosečný velkoplošný, N - násečný, P - podrovní, V - výběrný; předsunuté skupiny nebo úzké pruhy: p - clonné, n - násečné (násek, kotlík)
2 - doporučené obmýty
3 - doporučená obnovní doba
4 - počátek obnovy
5 - doporučená doba zajištění kultur od vzniku holiny s ohledem na porostní typ a charakter stanoviště

Cílová druhová skladba: Upravená cílová druhová skladba, která je dosažitelná v podmínkách současných základních porostních typů jednotlivých cílových hospodářských souborů.

Meliorační a zpevňující dřeviny: Nezbytně potřebný minimální procentický podíl těchto dřevin v porostu v době zajištění kultury (příloha č. 4 k vyhl. č. 83/1996 Sb.).
Sníž. % MZD - přiměřeně snížený podíl melioračních a zpevňujících dřevin pro holiny vzniklé v důsledku nahodilých těžeb
(vyhl.č.84/1996,§10).

Geograficky nepůvodní dřeviny:
1 - Uveden je maximální podíl geograficky nepůvodních dřevin (v %) podle „Závazného stanoviska MŽP“ ze dne 14.2. 2001
2 - Při obnově porostů nebudou vytvářeny monokultury z geograficky nepůvodních druhů lesních dřevin.
3 - Maximální podíl geograficky nepůvodních druhů lesních dřevin, uvedený v přehledu ZHD, spolu s hlavní hospodářskou dřevinou nesmí překročit
70 % zastoupení v cílové druhové skladbě.
4 - V porostech, ve kterých dochází k přirozenému zmlazování geograficky nepůvodních lesních dřevin, je třeba v cílové druhové skladbě obnovovaných porostů dodržet minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin, stanovený v příloze č. 3, vyhlášky č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.
5 - Zavádění geograficky nepůvodních druhů lesních dřevin ve zvláště chráněných územích je zakázáno zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a doplňků. Případné použití těchto dřevin podléhá udělení výjimky podle ustanovení § 43 tohoto zákona.
6 - Ve vymezených a schválených územních systémech ekologické stability nebude zavádění geograficky nepůvodních druhů lesních dřevin navrhováno, pokud není stanoveno jinak v jejich podrobné dokumentaci.
7 - Ve II. zóně CHKO lze v přehledu základních hospodářských doporučení uvádět maximální zastoupení MD do 5% v cílové druhové skladbě pro porosty se zastoupením listnatých dřevin nižším než 30%. Při vyšším podílu listnatých dřevin MD neuvádět. Použití jiných geograficky nepůvodních dřevin je neodůvodněné.
Ve III. a IV. zóně CHKO lze v přehledu základních hospodářských doporučení uvádět maximální zastoupení MD do 10% v cílové druhové skladbě.
Použití jiných geograficky nepůvodních dřevin je neodůvodněné.

PLO 11 Český les

Přehled základních hospodářských doporučení zastoupených HS

Tab. č. 9. 4.: PLO 11 – ČESKÝ LES: KATEGORIE LESŮ HOSPODÁŘSKÝCH

HS	POROSTNÍ TYP	ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ					CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA	MELIORAČNÍ A ZPEVNŮJÍCÍ DŘEVINY	Geogr. nepův. dřeviny
		1	2	3	4	5	upravená (alternativní)		
29 Olšová stanoviště na podmáčených půdách: slt reprezentativní: 3L(339ha), 5L(39ha), 1T(193ha), 1G(92ha), slt okrajové:2L(4ha) (potoční aluvia (3L,5L), podmáčené poklesliny (1G,1T9), údolní nivy větších toků (2L - pro malou rozlohu přiřazeno z HS 19)									
297	olšové	(N)	80	70-90	20	71	3L: OL 7 JS 3 JV SM	90%(1G) - OL,VR 70%(3L,5L) – OL, JV 15%(2L)- DB,LP,JV,JL,HB 75%(1T) – DB,BŘ, OL	-
	(olšové s jasanem)	(N)	90	80-100	20	81	5L: OL 6 JS 2 SM 2 KL BŘ		
	vrbové	(N)	40	30-50	10-20	31	1T:OL 7 SM 2 BŘ 1 DB BOJŘ 1G: OL 9 VR 1 OS SM 2L:DB 6 JS 3 LP 1 JV OS SM JL HB		
43 Kyselá stanoviště středních poloh: slt reprezentativní: 5M(1525ha)4K(173ha), 3K(127ha), slt okrajové:4M(14ha), 3M(15ha), 0K(36ha), 0M(10ha) (mírné svahy, půdy vodou neovlivněné)									
431	smrkové	P(N,H)	110	100-120	30	91	SM (BO)6, BK 2, (DB, LP, JD, HB) 2, MD,BŘ	25% BK,JD,LP,DB,HB	SM 40-60 MD 8-10
433	borové	P(N,H)	120	110-130	20(30)	111	BO (SM) 7(6), DB 2, (BK,LP,JD,HB) 1(2) MD,BŘ		
435	dubové	P(N)	150		30	131	DB 7-10 BK 0-3 (,LP,HB) 1 BO JS MD		
45 Živná stanoviště středních poloh:slt reprezentativní: 4S(884ha), 3S(102ha, slt okrajové: 4B(47ha), 3B(4ha) (mírně zvlněné svahy a ološiny, půdy živnější, vodou neovlivněné)									
451	smrkové	N(P,H)	100	90-110	30	81	SM 7,(BK,LP) 2, (JD, DB,HB,JV,JS,JL) -1 JDO,TR,BO,MD,DG	25 % BK, JD, LP, JV, JL,DB,HB,TR JDO,JS	MD 8-10 DG 6-10 JDO +-3
453	borové	N(H)	110	100-120	30	91	(přeměna na SM)		
457	listnaté (AK,BŘ,OS)	N	70	50-90	20	61	sběrný HS přeměna dle přísl.HS (SLT)		
51 Exponovaná stanoviště vyšších poloh: slt reprezentativní: 6N(1221ha), 5A(791ha), 5N(241ha) slt okrajové: 4N(22ha), 3N(50ha), 4A(30ha), 3A(41ha), 3C(44ha),2C(14ha),5F(+ha) 3F(+ha), 7N(6ha),5M9(33ha),5K9(30ha),5S9(28ha) 3K9(22ha),4B9(3ha) (půdy silně kamenité, většinou svahy-často příkré a srázné, hřebeny)									
511	smrkové	N(P)	120	110-130	30	101	SM 7,BK2, (JD,JV,LP,JS,JL) 1 DG,BO,MD,BŘ,JŘ	30% BK,JD,JV,JL,LP, JS,DG	MD 5 –10 DG +-1
513	borové	N(P)	120	110-130	30	101	SM 5-6 BK 2-3 BO 1-2 JD MD JV LP JS,JL,DG,BŘ,JŘ		
516	bukové	N(H)	150	-	40	131	BK 6-9, (JD,JV,LP) 1, SM 0-3, JS,JL		
53 Kyselá stanoviště vyšších poloh: 5S7(11157ha), 5K(7189ha), 5I(419ha), 6K(5146ha), 6I(134ha), 6M(199ha), (mírné, zvlněné svahy do 20°, půdy normální, vodou neovlivněné)									
531	smrkové	P(N,H)	110	(100-130)	30	91	SM 7, BK 2, JD1 1, LP,DG,BO,MD,BŘ,JŘ,JV	25% BK,JD (DG,LP)	MD 4-10 DG 1-4
533	borové	N(H,P)	120	100-130	30	101	SM 6, BO 0-3, BK 2 JD LP,DG,MD,BŘ,JŘ,JV		
536	bukové	P(N)	150	-	40	131	BK 6-8, (JD,MD,LP,JV) 1, SM 2-3		
55 Živná stanoviště vyšších poloh: 5S1,2,5,6(1742ha), 5B(3445ha), 5H(133ha), 5D(27ha), 6S(4993ha), (mírné zvlněné svahy a plošiny, půdy normální, živnější, vodou neovlivněné)									
551	smrkové	N(P,H)	110	(100-130)	30	91	SM 7, BK 2, JD 1 JV,JS,JL,LP,JDO,TR,MD,JŘ, DG	25% BK,JD,KL,JL,LP JS, JDO TR	MD 5-10 DG 3-5 JDO +-2
556	bukové	P(N)	150	-	40	131	BK 6-9, SM 1-3, (JD,MD,JV) 1 JL,LP		

Tab. č. 9. 5.: PLO 11 – ČESKÝ LES: KATEGORIE LESŮ HOSPODÁŘSKÝCH

HS	POROSTNÍ TYP	ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ					CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA upravená (alternativní)	MELIORAČNÍ A ZPEVNŮJÍCÍ DŘEVINY	Geogr. nepův. dřeviny
		1	2	3	4	5			
57 Oglejená stanoviště vyšších poloh: 5O(4954ha), 5P(2647ha), 5V(3565ha), 6O(39ha), 6P(1083ha), 6V(714ha), 6Q(1130ha) (mírně zvlněné plošiny a ploché úžlabiny, půdy střídavě vlhké, uléhavé)									
571	smrkové	N(P,H)	110	(100-120)	30	91	SM 7,JD 2,BK 1,JV,JS,JL,LP, BŘ,OS,JDO,BO,MD,OL,JŘ	25% BK,JD,JV,LP,JL JS,JDO,BŘ,OS	MD 3-5 JDO 3-5
573	borové (kvalitní-6Q)	N(P,H)	120	(100-130)	30	101	BO 4, SM 5, (JD,BK) 1, MD,BŘ,OS		
576	bukové	P(N)	150	-	40	131	BK 6-8, SM 1-3, (JD,JV) 1 MD,JD,JS,JL,LP		
59 Podmáčená stanoviště středních a vyšších poloh: 5G(81ha), 6G(3085ha), 5R(179ha),6V9(272ha),4R(10ha),5V9(6ha) (trvale zamokřené půdy v terénních pokleslinách a plochých úžlabinách)									
591	smrkové	P(N)	110	100-130	30(40)	91	SM 8, JD 2,BK,JV,OL,OS, BO,BŘ,JŘ,JL	15% (5G,6G) BK,JD,JV, OL,OS 5% (5R) BŘ	-
73 Kyselé stanoviště horských poloh: 7K(323ha), 7S(255ha), 7M(75ha) (ploché hřebeny, horní části svahů v nejvyšších polohách PLO, půdy normální, vodou neovlivněné)									
731	smrkové	P(N,)	120	(110-130)	30(40)	101	SM 8, BK 1, JD 1, JŘ, BŘ, (JV-7S)	15% BK,JD, JŘ (JV-7S)	
79 Podmáčená stanoviště horských poloh: 7G(1571ha), 6R(470ha), 7R(134ha), 7T(8ha) (trvale zamokřené půdy v terénních pokleslinách a plochých úžlabinách)									
791	smrkové	P(N)	120	110-130	40	101	SM 9, JD 1, BO, BŘ, JŘ	5% BŘ,JŘ,JD	-

Tab. č. 9. 6.: KATEGORIE LESŮ OCHRANNÝCH

HS	POROSTNÍ TYP (současné porosty)	ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ					CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA - základní)	MELIORAČNÍ A ZPEVNŮJÍCÍ DŘEVINY	Geogr. nepův. dřeviny do %
		1	2	3	4	5			
01 Mimořádně nepříznivá stanoviště: 5J(192ha), 5Y(204ha), 6Y(277ha),3Z(5ha),4Z(25 ha), 5Z(+ha),6Z(100ha), 7Z(12ha), 8R(52ha), 0Z(19ha), 0R(3ha), 3Y(4ha), 3J(17ha) (skalnaté hřbety a suťovité svahy a hluboká vrchovištní rašeliniště)									
011	smrkové	(V,P)	(150)	fyz. věk	(50) nepře trž.	(121)	3J: : BK 2-4, JV 2-4, JL -2, LP -1, JD -3, DB,HB,JS, SM	90%: DB,BK,JV,JD, HB,LP,JL,BŘK,MK, TS,JS	-
013	borové						5J: BK 2-5 KL 2-3 JS 0-1 JL 0-1 SM 1-2 JD1-3	60%: BK, JD,BŘ,DB	
015	dubové						3Y: BK 4-7, DB 1-3, BO -4, JD, BŘ	30%: BK,JD,BŘ,JŘ,JV	
016	bukové						5Y: BK1-7 SM1-3 JD 0-1 BO 0-1 KL BŘ JŘ		
017	ost.listnaté (ol,bř,os,ak)						6Y: SM 4-7 BK 2-5 JD 0-1 BO KL BŘ JŘ		
							3Z: BK 3-5 DB 2-3 BO +3 BŘ	30%: BK,JŘ, JD, BŘ,JV	
							4Z: BK 5-6 BO +3 DB 1 BŘ		
							5Z: BK 5-6 BO 1-3 SM 1-2 JD BŘ		
							6Z: SM 3-6 BK 2-5 BO 0-2		
							7Z: SM 7-8 BK 1-3 JD BO BŘ JŘ		
							0Z: BO8-10 BŘ 0-1 DB BK JD SM BŘ 0-1 JD JŘ	5%: BK,BŘ,DB,JD	
							8R: SM 8-10 KLEČ BŘP JŘ BL	1-5%:-: KLEČ, BŘP JŘ	
							0R: BO 8-9 BŘP 0-1 BL SM		

PLO 12 Předhoří Šumavy a Novohradských hor

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH DOPORUČENÍ V HS

HS	POROSTNÍ TYP (současné porosty)	ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ					CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA (alternativy)	MELIORAČNÍ A ZPEVŇUJÍCÍ DŘEVINY	Geografi cky nepůvod ní dřeviny
		1	2	3	4	5			
LESY HOSPODÁŘSKÉ									
21 – Exponovaná stanoviště nižších poloh: 2Me, 3Me, 4Me, 2Ke, 3Nm, 2C, 2A, 2Se (prudké a kamenité svahy; kambizem oligotrofní, podzolovaná, rankerová)									
211	SM nevhodné	N	100	80-110	30	81	BO6 DB2 BK1 LP1 MD	30% - BK, DB, LP, HB, JD, JV, JS, JL, BŘ, TS	MD 1-3
213	Borové	N, P	120	110-140	30	111	HB JD JV JS JL BŘ		
215	Dubové	N, P	130	110-150	30	121			
31 – Vysychavá stanoviště středních poloh: 3Cw, 4Cw, 5Cw (slunné expozice na vápenci; rendzina kambická)									
313	Borové	N	120	110-140	30	101	BK6 BO2 DB2 SM JD JV	30% - BK, DB, LP, JD, HB, JV, JS, JL, TŘ	MD 1-5 BOČ +-1
315	Dubové	N, P	130	120-140	30	111	JS LP HB TŘ		
316	Bukové	N, P	130	120-140	40	111			
41 – Exponovaná stanoviště středních poloh: 3N, 3Ne, 4N, 3Ke, 4Ke, 3F, 4F, 3C, 4C, 3Se, 4Se, 3A, 4A, 3U (kamenitá stanoviště a příkré svahy; kambizem oligotrofní, oligomezotrofní a rankerová)									
411	Smrkové	N, P	110	100-130	30	91	SM6 BO1 BK2 DB1 JD	30% - BK, DB, JD, LP, JV, JS, JL, HB,	MD 5-10
413	Borové	N, (P)	120	110-140	30	101	MD LP JV JS JL BŘ		
416	Bukové	N, P	130	120-150	40	111	BO5 SM1 BK2 DB1 LP1 MD JD JV BŘ		
51 – Exponovaná stanoviště vyšších poloh: 5Me, 5Ke, 6Ke, 5N, 6N, 5Se, 6Se, 5C, 5F, 6F, 5A, 6A, 5U (prudké a kamenité svahy; kambizem oligotrofní, podzolovaná, rankerová, kryptopodzol rankerový, oligotrofní)									
1511	SM kvalitní	P, N	130	110-140	40	111	SM7 JD1 BK2 JV JL JS	30% - BK, JD, JV, JL, LP, JS	MD 5-10 DG +-1
511	Smrkové	N, P	120	110-130	40	101	LP		
512	Jedlové	P, N	120	110-140	40	101			
513	Borové	N, (P)	120	110-130	30	101	BK7 SM2 JD1 JV MD LP		
516	Bukové	P, N	140	120-150	40	121	JL JS		
13 – Přirozená borová stanoviště: 0M, 0K, 0N, 0C, 0P, 0Q (písečné sedimenty a štěrkopískové terasy; podzol arenický, oglejený a pseudoglejový)									
133	Borové	N,H,P	110	100-130	20	101	BO8 DB1 BK1 SM BŘ	5%, 1M 15% - BK, DB, JŘ, JD, HB, LP, DBČ, BŘ	VJ + DBČ +-1
131	SM nevhodné	H	100	80-110	10	91	HB LP JD VJ DBČ BŘ JŘ		
23 – Kyselá stanoviště nižších poloh: 2M, 2K, 2I, 3M, 3Km, 3Im, 4M (kyselá stanoviště nižších poloh na svazích a plošinách; kambizem dystrická, podzolovaná, oligotrofní)									
231	SM nevhodné	H, N	100	80-110	20	91	BO6 DB2 BK1 LP1 JD	25% - BK, DB, LP, HB, JD, BŘ, DG	MD 1-4 DG +-1 DBČ +-1
233	Borové	H,N,P	110	90-130	30	91	MD HB BŘ DG		
235	Dubové	N, P	130	110-150	30	111	DB6 BK2 BO2 MD LP HB BŘ		
43 – Kyselá stanoviště středních poloh: 3K, 3I, 4K, 4Km, 4I, 4Im, 5M (kyselá stanoviště středních poloh na svazích a plošinách; kambizem oligotrofní, oglejená, luvizem oglejená)									
431	Smrkové	H,N,P	110	100-30	30	91	SM7 JD1 BK2 BO MD LP	25% - BK, JD, DB, LP, HB, DG	MD 5-10 DG 5-10 VJ +-1
1433	BO kvalitní	P,H,N	120	110-140	30	101	DG VJ BŘ		
433	Borové	H,N,P	100	100-130	30	91	BO6 SM1 DB1 BK2 MD		
436	Bukové	P,N,H	130	120-150	40	111	LP JD HB BŘ		
437	Listnaté nekv.	N,H	70	60-80	30	51	BK7 SM1 DB1 JD1 BO MD LP		
53 – Kyselá stanoviště vyšších poloh: 5K, 5I, 6M, 6K, 6I (kyselá stanoviště vyšších poloh na svazích a plošinách; kambizem oligotrofní, pseudoglejová, kryptopodzol oligotrofní, oglejený)									
2531	SM rezonanční	P, N	160	150-170	40	141	SM6 BK3 JD1 MD JV JL	25% - BK, JD, LP,	MD 5-10
1531	SM kvalitní	P, N	120	110-140	40	101	LP		
531	Smrkové	P,N,H	110	100-130	30	91			
533	Borové	H, N	120	100-130	30	101			
536	Bukové	P,N,H	140	120-150	40	121			
25 – Živná stanoviště nižších poloh: 2S, 2H (živná stanoviště nižších poloh na svazích a plošinách; kambizem oligomezotrofní, luvizem typická)									
251	Smrkové	H, N	100	80-110	20	91	DB6 BK1 LP1 BO2 SM	25% - BK, DB, JV, JS, LP, JD, JL HB TŘ JDO	MD 5-10 DG 1-5 JDO 1-2
253	Borové	H, N	110	80-120	20	101	JD MD HB JV JS JL JDO		
255	Dubové	H,N,P	160	130-200	20	151	DG TŘ		
35 – Živná bazická stanoviště středních poloh: 3W, 4W, 5W (živná stanoviště na vápenci; kambizem rendzinová)									

353	Borové	N,H,P	110	100-130	30	91	BK7 DB1 BO1 SM JD JV	70% - BK, DB,	-
355	Dubové	P,N,H	130	120-140	30	111	HB JL LP TR	JV, JS, LP, JD,	
356	Bukové	P, N	130	120-140	30	111		JL, HB, TR	
45 – Živná stanoviště středních poloh: 3S, 4S, 3H, 4H, 3B, 4B, 3D, 4D (živná stanoviště středních poloh na svazích a plošinách; kambizem oligomezotrofní, mezotrofní, eutrická, luvizem oglejená)									
1451	SM kvalitní	H,N,P	110	100-120	30	91	SM6 BK2 DB1 JD1 LP	25% - BK, JD,	MD 5-10
451	Smrkové	H,N,P	100	90-120	30	81	BO MD JV JS JL DG	DB, LP, JV, JS	DG 8-10
452	Jedlové	P,N	120	110-140	30	101	JDO	JL, HB, TR, JDO	JDO +-3
453	Borové	H, N	100	90-120	20	91			
455	Dubové	H,N,P	130	110-140	30	111	DB7 BK2 LP1 MD SM JD		
456	Bukové	P,N,H	130	120-150	30	111	JV HB JS		
55 – Živná stanoviště vyšších poloh: 5S, 6S, 5H, 6H, 5B, 6B, 5D, 6D (živná stanoviště vyšších poloh na svazích a plošinách; kambizem oligomezotrofní, kryptopodzol oligomezotrofní, typický)									
2551	SM rezonanční	P, N	160	150-170	40	141	SM6 BK3 JD1 MD JV LP	25% - BK, JD,	MD 5-10
1551	SM kvalitní	P, N	120	110-130	30	101	JL TR	JV, JL, LP, JS,	
551	Smrkové	P,N,H	110	100-130	30	91	BK7 SM2 JD1 MD JV JL	TR	
552	Jedlové	P,N	120	110-140	40	101	LP		
553	Borové	N,H	110	90-120	30	91			
556	Bukové	P,N	130	120-150	30	111			
27 – Oglejená chudá stanoviště nižších a středních poloh: 3P, 3Q, 4Q, 5Q (střídavě zamokřovaná chudá stanoviště na plošinách kyselých hornin; pseudoglej typický, podzolový)									
271	SM nevhodné	H, N	100	80-110	20	91	BO7 DB2 SM1 JD BR	20% - BK, DB,	MD 1-5
273	Borové	H,N,P	120	100-130	30	101	MD OS JDO	BR, JD, OS	JDO +-1
275	Dubové	N,H	130	110-140	30	111			
47 – Oglejená stanoviště středních poloh: 3V, 4V, 3O, 4O, 4P (střídavě zamokřovaná stanoviště na plošinách a v úžlabinách; kambizem oglejená, pseudoglej kambický, pelický, typický)									
1471	SM kvalitní	N, P	120	110-140	30	101	SM6 JD1 DB1 BK1 BO1	25% - BK, JD,	MD 4-7
471	Smrkové	N, P	110	100-130	30	91	MD HB JV JS JL LP JDO	DB, LP, JV, JS,	JDO 3-7
473	Borové	N, P	110	100-130	30	91	BO5 SM2 JD1 DB1 BK1	JL, HB, JDO	VJ +-1
475	Dubové	N, P	160	140-180	30	141	MD LP BR		
476	Bukové	P, N	130	120-150	30	111	DB7 BK1 LP1 SM JD BO		
477	Olšové (BR)	N	70	60-80	20	61	MD		
57 – Oglejená stanoviště vyšších poloh: 5V, 6V, 6Va, 5O, 6O, 5P, 6P, 7P, 6Q (střídavě zamokřovaná stanoviště na plošinách a v úžlabinách; kambizem oglejená, oligomezotrofní, pseudoglejová, typická, glej kambický, kryptopodzol pseudoglejový)									
2571	SM rezonanční	P, N	160	150-170	40	141	SM7 JD1 BK2 JV MD JS	25% - BK, JD,	MD 5-10
1571	SM kvalitní	P, N	120	100-130	30	101	JL LP BR OS JDO	LP, JV, JS, JL,	JDO 3-7
571	Smrkové	P,N,H	110	90-130	30	91		HB, JDO	VJ +-1
1573	BO kvalitní	P,N	120	110-140	30	101	BK7 SM2 JD1 JV MD JS		
573	Borové	N, P	110	100-130	30	91	JL LP		
576	Bukové	P, N	130	120-150	40	111			
577	Olšové	N	70	60-90	20	61			
77 – Oglejená stanoviště horských poloh: 7O, 7P (střídavě zamokřovaná stanoviště horských poloh; kryptopodzol pseudoglejový, kambický, pseudoglej kambický, podzolový)									
771	Smrkové	P, N	130	120-150	40	111	SM9 JD,BK1 BR JR JV	15% - BK, JD,	-
								JV, BR, JR	
19 – Lužní stanoviště: 1L, 2L (zaplavovaná stanoviště a obohacovaná proudící vodou; fluvizem kambická)									
197	Olšové	N, H	90	70-100	20	81	DB5 JS3 LP1 JV1 JL HB	15% - DB, JV,	TPK +
							OL TP VR	LP, JL, HB, BB	
29 – Olšová stanoviště na podmáčených půdách: 1G, 3L, 5L (zaplavovaná stanoviště a obohacovaná proudící vodou; rašelinný glej, fluvizem glejová, kambická)									
291	Smrkové	N, P	90	80-100	30	71	OL7 JS2 SM1 JV BR OS	1T – 75%, 1G – 90%, 3L – 70%	-
297	Olšové	N	80	60-90	20	71		OL, BR, JV, DB, VR	
39 – Podmáčená chudá stanoviště: 0G, 0T, 5T, 5R (plošiny s nepříznivými odtokovými poměry; podzol glejový rašelinný)									
391	SM (s BO)	N	110	90-120	30	91	BO6 SM1 JD1 DB1 BR1	10% - JD, DB,	
393	BO (se SM)	N, P	120	100-130	30	91	OL OS	BR, OS	
59 – Podmáčená stanoviště středních poloh: 4Pg, 5Vg, 3G, 4G, 5G, 6G, 7G, 7T, 4R, 6R, 7R (podmáčená stanoviště na sníženinách a v úžlabinách; glej typický, humózní, rašelinový, organozem mezická)									
591	Smrkové	P, N	100	90-120	30	81	SM7 JD2 DB,BK1 BO JV	3g,4G,3Vg –	MD 5-10

1591	SM kvalitní	P, N	110	100-130	40	91	OL OS JS LP BŘ	20%, 4R – 5% JD, DB, BK, JV, LP, OL, BŘ, OS	
597	Olšové	N	80	60-90	20	71			
79 – Podmáčená stanoviště horských poloh: 6T, 6R, 7T, 7G, 7R (trvale zamokřená stanoviště horských poloh; kryptopodzol pseudoglejový, glej kambický, pseudoglej podzolový, organozem oligotrofní))									
791	Smrkové	P, N	120	110-140	40	101	SM9 JD1 BO BŘ JŘ	5% - JD, JŘ, BŘ	-

LESY OCHRANNÉ

01 – Mimořádně nepříznivá stanoviště: 0Z, 2Z, 3Z, 4Z, 5Z, 6Z, 4X, 4Y, 5Y, 6Y, 3J, 5J, 6L (sutě a skalnaté výchozy hornin; litozem, psefitická regozem, litický a kambický ranker)									
011	Smrkové	V, (P)	150	150-f	40	131	Dle stanovištního typu	0Z – 5%, 1Z – 70% 2Z, 5J– 60%, 3-6Z, 4-6Y – 30% 3J – 90% 4X – 80% JD, DB, BK, BŘ, LP, HB, JV, JS, JL, TS	-
013	Borové	V, (P)	150	150-f	N	-			
015	Dubové	V, (P)	150	150-f	40	131			
016	Bukové	V, (P)	150	150-f	40	131			

PLO 13 - ŠUMAVA

Přehled základních hospodářských doporučení zastoupených HS (mimo NPŠ)

KATEGORIE LESŮ HOSPODÁŘSKÝCH

(poznámka: uvedené výměry slt se vztahují pouze k části PLO, která leží mimo NPŠ)

HS	POROSTNÍ TYP	ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ					CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA	MELIORAČNÍ A ZPEVNŮJÍCÍ DŘEVINY	Geogr. nepův. dřeviny
		1	2	3	4	5			
29	Olšová stanoviště na podmáčených půdách: (potoční aluvia (5L(164ha), 3L(66ha) podmáčené poklesliny (1G-1ha,1T-11ha),								
297	olšové	(N)	90	80-100	20	81	5L:OLL 9 SM 1 JS OLŠ 3L: OLL 7 JS 3 JV SM 1T:OLL 7 SM 2 BŘ 1 DB BO JŘ 1G: OLL 9 VR 1 OS SM	90%(1G) – OLL,VR 70%(3L,5L) – OLL, JV 65%(1T) -DB,BŘ, OLL	-
1297	OL,BŘ ±kvalitní	N	80	70-90	20	71	obnovní cíl dle příslušného HS	dle příslušného HS	
3297	OL,BŘ „Z“ půdy	N	70	50-80	20	61			
51	Exponovaná stanoviště vyšších poloh: 6N(3247ha), 6A(2240ha), 6K9(381ha), 6F(440ha), 5N(353ha), 6S9(130ha), 5A(105ha), 5C(59ha), 5K9(43ha),5F(7ha), 5S9(6ha), 5M9(5ha) (půdy silně kamenité, většinou svahy-často příkré a srázné, hřebeny)								
511	smrkové běžné kvality	P(N)	120	110-130	30(40)	101	SM7, BK2, (JD,KL,LP,JS,JL)1 DG,BO,MD,BŘ	30% BK,JD,KL,JL,LP, JS,	MD 5 –10 DG +-1
1511	smrkové kvalitní,smíšené	P(N)	130	120-140	40	111	SM7, BK2, (JD,KLLP,JS,JL) 1 MD,BŘ		
513	borové, vhodné (náhorní)	N(P)	120	110-130	30	101	SM 5-6 BK 2-3 BO 1-2 JD MD KL LP BŘ		
516	bukové	P	140	130-150	40(30)	121	BK 6-9, (JD,KL,LP) 1-3, SM 0-3,JS,JL		
53	Kyselá stanoviště vyšších poloh: 6K(23932ha), 5K(1824ha), 6I(1316ha), 6M(309ha) 5M(147ha), 5I(15ha) (mírné, zvlněné svahy do 20°, půdy normální, vodou neovlivněné)								
531	smrkové	P(N,H)	120	110-130	30	101	SM 7, BK 2, JD1 1, LP,DG, BO, MD,BŘ,JŘ,KL	25% BK,JD,LP,DG	MD 5-10 DG +-1
1531	smrkové kvalitní,smíšené, semenné	P	130	120-140	30-(40)	111	SM 7, BK 2, JD 1, MD, LP, KL		
2531	smrkové rezonanční	P	160	150-170	40	141	SM 7, BK 2, JD 1		
533	borové, vhodné (náhorní)	N(H,P)	120	100-130	30	101	SM 6, BO 1-3, BK 2 JD MD,BŘ,KL		
3533	borové nevhodné	N(H)	100	90-110	30	81	SM 7, BK 2, JD1 1, LP,DG, BO,MD,BŘ,KL		
536	bukové	P(N)	140	130-150	40	121	BK 6-8, (JD,MD,LP,KL) 1, SM 2-3		
55	Živná stanoviště vyšších poloh: 6S(7645ha), 6B(1918ha), 5S(1597ha) 6D(647ha), 6H(297ha), 5B(133ha), 5U(21ha) 5H(23ha), 5W(37ha), 5D(1ha) (mírné zvlněné svahy a plošiny, půdy normální, živnější, vodou neovlivněné)								
551	smrkové	N(P,H)	120	100-130	30	101	SM 7, BK 2, JD 1 KL,JS,JL, LP,JDO,MD,JŘ,DG TŘ	25% BK,JD,KL,JL,LP JS, JDO TŘ	MD 5-10 DG +-5 JDO +-2
1551	smrkové kvalitní,smíšené, semenné	P	130	120-140	30-40	111	SM 7, BK 2, JD 1 KL,JS,JL, LP,MD		
2551	smrkové rezonanční	P	160	150-170	40	141	SM 7, BK 2, JD 1 KL,JL,LP, MD		
556	bukové	P(N)	140	130-150	40	121	BK 6-9, SM 1-3, (JD,MD,KL) 1 JS,JL,LP		
57	Oglejená stanoviště vyšších poloh: 6V(7457ha), 6O(2287ha), 6P(697ha), 5V(293ha), 5O(266ha), 5P(63ha),6Q(1ha) (mírné zvlněné plošiny a ploché úžlabiny, půdy střídavě vlhké, uléhavé)								
571	smrkové	N(P,H)	110	100-120	30	91	SM 7,JD 2,BK 1,KL,JS,JL,LP, BŘ,OS,JDO,BO,MD,OL,JŘ	25% BK,JD,JV,LP,JL JS,JDO,BŘ,OS	MD 5-10 JDO 2-5
1571	smrkové kvalitní,smíšené, semenné	P	120	110-130	30-40	101	SM 7,JD 2,BK 1,KL,JS,JL,LP, BŘ,OS, BO,MD,JŘ		
2571	smrkové rezonanční	P	160	150-170	40	141	SM 7,JD 2,BK 1,KL		
573	borové běžné kvality	N(P,H)	120	100-130	30	101	SM 6-7, BO 1-3, (JD,BK) 1, MD,BŘ,OS,JŘ		
576	bukové	P(N)	140	120-150	40	121	BK 6-8, SM 1-3, (JD,KL) 1 MD,JS,JL,LP		

Tab. č. 9. 5.: PLO 13 – ŠUMAVA: KATEGORIE LESŮ HOSPODÁŘSKÝCH

HS	POROSTNÍ TYP	ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ					CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA	MELIORAČNÍ A ZPEVNŮJÍCÍ DŘEVINY	Geogr. nepův. dřeviny
		1	2	3	4	5			
59 Podmáčená stanoviště středních a vyšších poloh: 6G(544ha) , 6V9(175ha) , 5R(23ha) , 5G(23ha) , 5V9(5 ha) (trvale zamokřené půdy v terénních pokleslinách a plochých úžlabinách)									
591	smrkové	P(N)	110	100-120	30(40)	91	SM 8 , JD 2 ,BK,KL,OL,OS, BO,BŘ,JŘ,JL	20% (5,6V9) 15% (5G,6G) BK,JD,KL, OL,OS 5% (5R) BŘ	-
1591	smrkové kvalitní,smíšené, semenné	P	120	110-130	30-40	101	SM 8 , JD 2 ,BK,KL,LP,OL,OS, BO,BŘ,JŘ,JL,JS		
71 Exponovaná stanoviště horských poloh: 7N(918ha) , 7K9(112ha) , 7F(37ha) 7S9(48ha) (kamenité svahy a hřbety, často příkré, ve vyšších polohách PLO, půdy silně kamenité, vodou neovlivněné)									
711	smrkové	P	140	120-150	40	121	SM 8 , BK 1 , JD 1 , KL, BO, JŘ, BŘ	15% BK,JD, KL,JŘ	MD +
73 Kyselá stanoviště horských poloh: 7K(6509ha) , 7M(53ha) (náhorní plošiny a svahy ve vyšších polohách PLO, půdy normální,kyselé, vodou neovlivněné)									
731	smrkové	P	140	130-150	40	121	SM 8 , BK 1 , JD 1 ,BO, JŘ, BŘ,	15% BK,JD, JŘ	MD +
75 Živná stanoviště horských poloh: 7S(1153ha) , 7B(46ha) (náhorní plošiny,svahy a ploché svahové úžlabiny ve vyšších polohách PLO, půdy normální, živnější, vodou neovlivněné)									
751	smrkové	P	130	120-150	40	111	SM 8 , BK 1 , JD 1 , JŘ, BŘ, KL	15% BK, JD, JŘ, KL	-
77 Oglejená stanoviště horských poloh: 7O(2712ha) , 7V(1159ha) , 7P(1740ha) , 8Q(7ha) , 8O(1ha) , 8V(17ha) , 8P(6ha) , 7Q(58ha) (náhorní plošiny a horská prameniště v nejvyšších polohách PLO, půdy střídavě zamokřované)									
771	smrkové	P(N,)	130	120-140	40	111	SM 8 , BK 1 , JD 1 , BO, KL, JŘ, BŘ,	10% %(7.lvs) BK,JD, JŘ ,KL, BŘ 5% (8.lvs) JD,JŘ	-
79 Podmáčená stanoviště horských poloh: 7G(2603ha) , 7R(304ha) , 7T(421ha) , 6R(281ha) , 7V9(84ha) , 8G(14ha) , 8T(5ha) (trvale zamokřené půdy v terénních pokleslinách a plochých úžlabinách v nejvyšších polohách PLO)									
791	smrkové	P(N)	130	120-140	40	111	SM 9 , JD 1 , BO, BŘ, JŘ	5% BŘ,JŘ,JD	-

Tab. č. 9. 6.: PLO 13 – ŠUMAVA:KATEGORIE LESŮ OCHRANNÝCH

Příloha č. 3: Účelové lesy ochranných pásem										
HS	POROSTNÍ TYP (současné porosty)	ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ					CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA	MELIORAČNÍ A ZPEVNŮJÍCÍ DŘEVINY	Geogr. nepův. dřeviny	
		1	2	3	4	5				
01 Mimořádně nepříznivá stanoviště: skalnaté hřbety a suťovité svahy - 6Y(720ha), 5J(505ha), 7Y(289ha), 8R (186ha), 0R(133ha), 8Y(82ha), 6L(61ha), 6Z(68ha), 7Z(60ha), 5Y(56ha), 9R(29ha), 0Z(13ha), 5Z(20ha), 0C(17ha)										
011 013 016	smrkové borové bukové	(V,P)	(150)	fyz. věk	(50) nepře tržitá	(121)	5J: BK 2-5 KL 2-3SM1-2 JD1-3 JS 0-1JL 5Y: BK 5-6 SM 1-3 (JD BO) +1 JV BŘ JŘ 6Y: SM 4-7 BK 2-5 JD 0-1 BO KL BŘ JŘ 7Y: SM 7-9 JD +1 BK 1-2 BO JV BŘ JŘ 8Y: SM 9-10 BŘ JŘ 5Z: BK 5-6 SM 1-3 (JD BO BŘ) +1 JŘ 6Z: SM 3-6 BK 2-5 BO 0-2 7Z: SM 7-8 BK 1-3 JD BO BŘ JŘ 0Z: BO 8-10 BŘ 0-1 BK 0-1 JD SM 8R: SM 8-10 (KLEČ BŘP JŘ) 0-2 9R: KLEČ 9-10 (SM BŘP) +1 6L: OLŠ 6-9 SM 1-3 JV JS (+1) 0R: BO(BL) 8-9 BŘP 0-1 KLEČ SM	70%(6L):BK,OLŠ,KL, JS,OLL,JD 60%(5J):BK,JD,BŘ 30%(5Y,6Y,5Z,6Z):BK, JD,BŘ, JŘ,JV 10%(7Z,7Y):BK,JD,BŘ, JŘ 1-5%(0R):BŘP KLEČ 0-5%(0R):BLATKA BŘP +%(9R): BŘP JŘ	-	
02 Vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace: <i>Nejvyšší polohy PLO, většinou klimaticky extrémně exponované, vodou neovlivněné –8K(391ha), 8N(89ha), 8S(33ha), 8Z(48ha)</i>										
021	smrkové	P Vúč	170	fyz. věk	(60) nepře tržitá	(140)	SM 9-10, (BK,KL,JŘ,BŘ) +1,JD	+%:BK,JD, BŘ,JŘ,KL		

PLO 14 Novohradské hory

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH DOPORUČENÍ V HS

HS	POROSTNÍ TYP (současné porosty)	ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ					CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA (alternativy)	MELIORAČNÍ A ZPEVŇUJÍCÍ DŘEVINY	Geograficky nepůvodní dřeviny
		1	2	3	4	5			
LESY HOSPODÁŘSKÉ									
51 – Exponovaná stanoviště vyšších poloh: 5N, 6N, 5Ke, 5Se, 6Se, 5F, 6F, 5A, 6A (prudké a kamenité svahy; kambizem oligotrofní, podzolovaná, rankerová, kryptopodzol rankerový, oligotrofní)									
2511	SM rezonanční	P, N	160	150-170	40	141	SM7 JD1 BK2 JV JL JS LP BK7 SM2 JD1 JV MD LP JL JS	30% - BK, JD, JV, JL, LP, JS	MD 5-10 DG +1
1511	SM kvalitní	P, N	130	110-140	40	111			
511	Smrkové	N, P	120	110-130	40	101			
513	Borové	N, (P)	120	110-130	30	101			
516	Bukové	P, N	140	120-150	40	121			
71 – Exponovaná stanoviště horských poloh: 7N (kamenité svahy a hřebeny; kryptopodzol rankerový, podzol humusový)									
711	Smrkové	P, N	140	120-150	40	121	SM8 JD1 BK1 BO JV BŘ JŘ	15% - BK, JD, JV, BŘ	MD +
43 – Kyselá stanoviště středních poloh: 5M, 5Km, 5Im (kyselá stanoviště středních poloh na svazích a plošinách; kambizem oligotrogní, podzolovaná, podzol kambický)									
431	Smrkové	H,N,P	110	100-30	30	91	SM7 JD1 BK2 BO MD LP DG BŘ BO6 SM1 DB1 BK2 MD LP JD HB BŘ	25% - BK, JD, DB, LP, HB, DG	MD 5-10 DG 4-7
433	Borové	H,N,P	100	100-130	30	91			
53 – Kyselá stanoviště vyšších poloh: 5K, 5I, 6M, 6K, 6I (kyselá stanoviště vyšších poloh na svazích a plošinách; kambizem oligotrofní, pseudoglejová, kryptopodzol oligotrofní, oglejený)									
2531	SM rezonanční	P, N	160	150-170	40	141	SM6 BK3 JD1 MD JV JL LP DG	25% - BK, JD, LP, DG	MD 5-10 DG +1
1531	SM kvalitní	P, N	120	110-140	40	101			
531	Smrkové	P,N,H	110	100-130	30	91			
533	Borové	H, N	120	100-130	30	101			
536	Bukové	P,N,H	140	120-150	40	121			
537	Listnaté nekv.	H, N	70	60-80	20	61			
73 – Kyselá stanoviště horských poloh: 7K (kyselá stanoviště horských poloh na svazích; kryptopodzol oligotrofní, podzol humusový)									
731	Smrkové	P,H,N	130	120-150	30	111	SM8 BK2 JD BO BŘ JŘ MD	15% - BK, JD, JŘ	MD +
55 – Živná stanoviště vyšších poloh: 5S, 5H, 6S, 6B, 6D (živná stanoviště vyšších poloh na svazích a plošinách; kambizem oligomezotrofní, kryptopodzol oligomezotrofní, typický)									
2551	SM rezonanční	P, N	160	150-170	40	141	SM6 BK3 JD1 MD JV LP JL DG JDO, TŘ BK7 SM2 JD1 MD JV JL LP	25% - BK, JD, JV, JL, LP, JS, JDO, TŘ	MD 5-10 DG +5 JDO +2
1551	SM kvalitní	P, N	120	110-130	30	101			
551	Smrkové	P,N,H	110	100-130	30	91			
556	Bukové	P,N	130	120-150	30	111			
75 – Živná stanoviště horských poloh: 7S (živná stanoviště horských poloh na svazích; kryptopodzol oligomezotrofní)									
751	Smrkové	P,H,N	130	120-150	30	111	SM8 BK1 JD1 BŘ JŘ JV	15% - BK, JD, JV, JŘ	-
57 – Oglejená stanoviště vyšších poloh: 5V, 5O, 5P, 6V, 6Va, 6O, 6P (střídavě zamokřovaná stanoviště na plošinách a v úžlabinách; kambizem oglejená, oligomezotrofní, pseudoglejová, typická, glej kambický, kryptopodzol pseudoglejový)									
2571	SM rezonanční	P, N	160	150-170	40	141	SM7 JD1 BK2 JV MD JS JL LP BŘ OS JDO	25% - BK, JD, LP, JV, JS, JL, HB,	MD 5-10 JDO 2-5
1571	SM kvalitní	P, N	120	100-130	30	101			

571	Smrkové	P,N,H	110	90-130	30	91	BK7 SM2 JD1 JV MD JS JL LP	JDO	
573	Borové	N, P	110	100-130	30	91			
576	Bukové	P, N	130	120-150	40	111			
577	Olšové	N	70	60-90	20	61			
77 – Oglejená stanoviště horských poloh: 7O, 7P (střídavě zamokřovaná stanoviště horských poloh; kryptopodzol pseudoglejový, kambický, pseudoglej kambický, podzolový))									
771	Smrkové	P, N	130	120-150	40	111	SM9 JD,BK1 BŘ JŘ JV	15% - BK, JD, JV, BŘ, JŘ	-
29 – Olšová stanoviště na podmáčených půdách: 5L (zaplavovaná stanoviště a obohacovaná proudící vodou; rašelinný glej, fluvizem glejová, kambická)									
291	Smrkové	N, P	90	80-100	30	71	OL7 JS2 SM1 JV BŘ OS	70% - OL, JV	-
297	Olšové	N	80	60-90	20	71			
59 – Podmáčená stanoviště středních poloh: 6G (podmáčená stanoviště na sníženinách a v úžlabinách; glej rašelinný)									
1591	SM kvalitní	P, N	110	110-130	40	91	SM8 JD2 BK BO JV OL OS BŘ	15% - BK, JD, JV, OL, OS	-
591	Smrkové	P, N	100	90-120	30	81			
597	Olšové	N	80	60-90	20	71			
79 – Podmáčená stanoviště horských poloh: 7Vg, 7T, 7G, 7R (trvale zamokřená stanoviště horských poloh; kryptopodzol pseudoglejový, glej kambický, pseudoglej podzolový, organozem oligotrofní))									
791	Smrkové	P, N	120	110-140	40	101	SM9 JD1 BO BŘ JŘ	5% - JD, JŘ, BŘ	-
LESY OCHRANNÉ									
01 – Mimořádně nepříznivá stanoviště: 5Z, 6Z, 7Z, 5Y, 6Y, 7Y, 5J; 0R, 8R, 9R (sutě a skalnaté výchozy hornin; litozem, psefitická regozem, litický a kambický ranker; organozem organická)									
011	Smrkové	V, P	150	150-f	40	131	Dle stanovištního typu	5J – 60%, 6Z,Y – 30%, 7Z,Y – 10%, 0R – 5%, 8R – 1-5%, 9R - + 5J – BK, JD, JV, JS, JL, LP 6,7Z,Y – JD, BK, JV, BŘ, JŘ 0R,8,9R – BŘ, JŘ	-
013	Borové	V, (P)	150	150-f	N	-			

PLO 15a Jihočeské pánve – Českobudějovická pánev

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH DOPORUČENÍ V HS

HS	POROSTNÍ TYP (současné porosty)	ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ					CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA (alternativy)	MELIORAČNÍ A ZPEVŇUJÍCÍ DŘEVINY	Geograf. Nepůvodní dřeviny
		1	2	3	4	5			
LESY HOSPODÁŘSKÉ									
21 – Exponovaná stanoviště nižších poloh: 2N, 2Me, 2Ke, 2C, 3C, 2A, 2Se (prudké a kamenité svahy; kambizem oligotrofní, podzolovaná, rankerová)									
211	SM nevhodné	N	100	80-110	30	81	BO6 DB3 BK LP1 MD HB JD JV JS JL BŘ	30% - BK, DB, LP, HB, JD, JV, JS, JL, BŘ, TS	MD 1-3
213	Borové	N, P	120	110-140	30	111			
215	Dubové	N, P	130	110-150	30	121			
31 – Vysýchavá stanoviště středních poloh: 3Cw (slunné expozice na vápenci; rendzina kambická)									
313	Borové	N	120	110-140	30	101	BK5 BO2 DB2 JV JS LP1	30% - BK, DB, LP, JD, JV, JS, JL, TŘ	-
315	Dubové	N, P	130	120-140	30	111	TŘ		
41 – Exponovaná stanoviště středních poloh: 3N, 3Ne, 3Ke, 4Ke, 3F, 3Se, 3De, 3A (kamenitá stanoviště a příkré svahy; kambizem oligotrofní, oligomezotrofní a rankerová)									
411	Smrkové	N, P	110	100-130	30	91	SM6 BO BK2 DB1 JD LP	30% - BK, DB, JD, LP, JV, JS, JL,	-
413	Borové	N, (P)	120	110-140	30	101	JV JS JL BŘ BO5 SM1 BK2 DB1 LP1 JD JV BŘ		
13 – Přirozená borová stanoviště: 0M, 0K, 0O, 0P, 0Q, 1M (písčité sedimenty a štěrkopískové terasy; podzol arenický, oglejený a pseudoglejový)									
1133	BO kvalitní	N,H,P	130	110-140	20	121	BO8 DB1 BŘ1 LP JD VJ	5%, 1M 15% - BK, DB, JŘ, JD, LP, DBČ, BŘ	VJ +2
133	Borové	N,H,P	110	100-130	20	101	DBČ BŘ JŘ		DBČ +-1
131	SM nevhodné	H	100	80-110	10	91			
23 – Kyselá stanoviště nižších poloh: 2M, 2K, 2I, 3M, 3Km, 3Im (kyselá stanoviště nižších poloh na svazích a plošinách; kambizem dystrická, podzolovaná, oligotrofní)									
231	SM nevhodné	H, N	100	80-110	20	91	BO6 DB2 BK1 LP1 JD MD	25% - BK, DB, LP, JD, BŘ, DG	MD 1-4
233	Borové	H,N,P	110	90-130	30	91	BŘ DG		DG +-1
234	Douglaskové	N, P	90	80-110	30	71	DB6 BK2 BO2 MD LP BŘ		
235	Dubové	N, P	130	110-150	30	111			
43 – Kyselá stanoviště středních poloh: 3K, 3I, 4K (kyselá stanoviště středních poloh na svazích a plošinách; kambizem oligotrogní, oglejená, luvizem oglejená)									
431	Smrkové	H,N,P	110	100-30	30	91	SM7 DB1 BK2 BO MD LP	25% - BK, JD, DB, LP, DG	MD 8-10
1433	BO kvalitní	P,H,N	120	110-140	30	101	DG VJ BŘ JD		DG 4-7
433	Borové	H,N,P	100	100-130	30	91	BO6 SM1 DB1 BK2 MD LP JD BŘ BK7 SM1 DB1 JD1 BO MD LP		VJ +-1
434	Douglaskové	N, P	90	80-110	30	71			
435	Dubové	N,H,P	130	110-150	30	111			
436	Bukové	P,N,H	130	120-150	40	111			
25 – Živná stanoviště nižších poloh: 2S, 2H (živná stanoviště nižších poloh na svazích a plošinách; kambizem oligomezotrofní, luvizem typická)									
251	Smrkové	H, N	100	80-110	20	91	DB6 BK LP2 BO2 SM JD	25% - BK, DB, JV, JS, LP, JD, TŘ, JDO	MD 8-10
253	Borové	H, N	110	80-120	20	101	MD1 JV JS JDO DG TŘ		DG 1-4
255	Dubové	H,N,P	160	130-200	20	151			JDO +-2
35 – Živná bazická stanoviště středních poloh: 3W (živná stanoviště na vápenci; kambizem rendzinová)									
353	Borové	N,H,P	110	100-130	30	91	BK6 DB2 BO2 JD JV LP TŘ	70% - BK, DB, JV, JS, LP, JD, TŘ	-
45 – Živná stanoviště středních poloh: 3S, 3H, 3B, 3D (živná stanoviště středních poloh na svazích a plošinách; kambizem oligomezotrofní, mezotrofní, eutrická, luvizem oglejená)									

1451	SM kvalitní	H,N,P	110	100-120	30	91	SM5 BK1 DB2 JD1 LP1 BO MD JV JS JL DG JDO DB7 BK2 LP1 MD SM JD JV JS	25% - BK, JD, DB, LP, JV, JS JL, TR, JDO	MD 8-13 DG 6-10 JDO +3
451	Smrkové	H,N,P	100	90-120	30	81			
453	Borové	H, N	100	90-120	20	91			
455	Dubové	H,N,P	130	110-140	30	111			
27 – Oglejená chudá stanoviště nižších a středních poloh: 3P, 3Q (střídavě zamokřovaná chudá stanoviště na plošinách kyselých hornin; pseudoglej typický, podzolový)									
271	SM nevhodné	H, N	100	80-110	20	91	BO7 DB2 SM1 JD BŘ MD OS VJ JDO	20% - BK, DB, BŘ, JD, OS	MD 1-4 JDO + -1 VJ + -4
1273	BO kvalitní	N, P	130	110-140	30	111			
273	Borové	H,N,P	120	100-130	30	101			
47 – Oglejená stanoviště středních poloh: 3V, 3O, 4O, 4P (střídavě zamokřovaná stanoviště na plošinách a v úžlabinách; kambizem oglejená, pseudoglej kambický, pelický, typický)									
1471	SM kvalitní	N, P	120	110-140	30	101	SM6 JD1 DB1 BK1 BO1 MD JV JS JL LP JDO BO5 SM2 JD1 DB1 BK1 MD LP BŘ DB7 BK1 LP1 SM JD BO MD	25% - BK, JD, DB, LP, JV, JS, JL, JDO	MD 2-6 JDO 2-5 DG + -2 BOČ +
471	Smrkové	N, P	110	100-130	30	91			
1473	BO kvalitní	N, P	120	110-140	30	101			
473	Borové	N, P	110	100-130	30	91			
1475	DB kvalitní	N, P	160	140-180	30	141			
19 – Lužní stanoviště: 1L, 2L (zaplavovaná stanoviště a obohacovaná proudící vodou; fluvizem kambická)									
1195	DB kvalitní	H, P	150	130-200	30	131	DB5 JS3 LP1 JV1 JL OL TP VR	15% - DB, JV, LP, JL, BB	TPK +
197	Olšové	N, H	90	70-100	20	81			
29 – Olšová stanoviště na podmačených půdách: 1T, 1G, 3L (zaplavovaná stanoviště a obohacovaná proudící vodou; rašelinný glej, fluvizem glejová, kambická)									
291	Smrkové	N, P	90	80-100	30	71	OL7 JS2 SM1 JV BŘ OS	1T – 75%, 1G - 90%, 3L – 70% OL, BŘ, JV, DB, VR	-
297	Olšové	N	80	60-90	20	71			
39 – Podmačená chudá stanoviště: 5T (plošiny s nepříznivými odtokovými poměry; podzol glejový rašelinný)									
391	SM (s BO)	N	110	90-120	30	91	BO6 SM1 JD1 DB1 BŘ1 OL OS	10% - JD, DB, BŘ, OS	VJ + -1
393	BO (se SM)	N, P	120	100-130	30	101			
59 – Podmačená stanoviště středních poloh: 3G, 4G, 4Vg, 4R (podmačená stanoviště na sníženinách a v úžlabinách; glej typický, humózní, rašelinový, organozem mezická)									
591	Smrkové	P, N	100	90-120	30	81	SM7 JD2 DB1 BK BO JV OL OS JS LP BŘ	3g,4G,3Vg – 20%, 4R – 5% JD, DB, BK, JV, LP, OL, BŘ, OS	-
593	Borové se SM	P, N	120	100-130	30	101			
597	Olšové	N	80	60-90	20	71			
LESY OCHRANĚ									
01 – Mimořádně nepříznivá stanoviště: 0Z, 1Z, 2Z, 3Z, 3J (sutě a skalnaté výchozy hornin; litozem, psefitická regozem, litický a kambický ranker)									
013	Borové	V, (P)	150	150-f	N	-	Dle stanovištního typu	0Z – 5%, 1Z – 70% 2Z – 60%, 3Z – 30% 3J – 90% JD, DB, BK, BŘ, LP, HB, JV, JS, JL, TS	-
015	Dubové	V, (P)	150	150-f	40	131			

PLO 15b Jihočeské pánve – Třeboňská pánev

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH DOPORUČENÍ V HS

HS	POROSTNÍ TYP (současné porosty)	ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ					CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA (alternativy)	MELIORAČNÍ A ZPEVNŮJÍCÍ DŘEVINY	Geograf. nepůvodní dřeviny
		1	2	3	4	5			
LESY HOSPODÁŘSKÉ									
31 – Vysychavá stanoviště středních poloh: 3Cw (slunné expozice na vápenci; rendzina kambická)									
313	Borové	N	120	110-140	30	101	BK6 BO2 DB2 SM JD JV JS LP TŘ	30% - BK, DB, LP, JD, JV, JS, JL, TŘ	-
41 – Exponovaná stanoviště středních poloh: 3N, 4N, 3Ke, 4Ke, 3C, 3F, 4F, 3Se, 4Se, 3De, 3A, 4A (kamenitá stanoviště a příkré svahy; kambizem oligotrofní, oligomezotrofní a rankerová)									
411	Smrkové	N, P	110	100-130	30	91	SM6 BO1 BK2 DB1 JD LP JV JS BŘ	30% - BK, DB, JD, LP, JV, JS, JL	
413	Borové	N, (P)	120	110-140	30	101	BO5 SM1 BK2 DB1 LP1 JD JV BŘ		
415	Dubový	P, (N)	120	110-140	30	101			
416	Bukový	P, N	130	120-150	30	111	BK8 DB2 LP SM JD		
13 – Přírozená borová stanoviště: 0M, 0K, 0O, 0P, 0Q (písčité sedimenty a štěrkopískové terasy; podzol arenický, oglejený a pseudoglejový)									
131	SM nevhodné	H	100	80-110	20	91	BO8 SM1 BŘ1 DB JD LP VJ DBČ JŘ	5% - BK, DB, JŘ, JD, LP, DBČ, BŘ	VJ +-2 DBČ +-2
1133	BO kvalitní	N,H,P	130	110-140	20	121			
133	Borové	N,H,P	120	100-130	20	111			
135	Dubové	P, N	130	110-150	20	121			
23 – Kyselá stanoviště nižších poloh: 3M, 3Km, 3Im, 4M (kyselá stanoviště nižších poloh na svazích a plošinách; kambizem dystrická, podzolovaná, oligotrofní)									
231	SM nevhodné	H	100	80-110	20	91	BO7 DB1 BK2 LP1 JD MD BŘ DG	25% - BK, DB, LP, JD, BŘ, DG	MD 1-4 DG +-1
233	Borové	H,N,P	110	90-130	30	91	DB7 BK1 BO2 MD LP BŘ		
235	Dubové	N, P	130	110-150	30	111			
43 – Kyselá stanoviště středních poloh: 3K, 3I, 4K, 4I (kyselá stanoviště středních poloh na svazích a plošinách; kambizem oligotrogní, oglejená, luvizem oglejená)									
431	Smrkové	H,N,P	110	100-30	30	91	SM7 JD1 BK2 BO MD LP DG VJ BŘ	25% - BK, JD, DB, LP, DG	MD 8-10 DG 4-7 VJ +-1
1433	BO kvalitní	P,H,N	120	110-140	30	101			
433	Borové	H,N,P	110	100-130	30	91	BO7 DB1 BK2 MD LP JD BŘ		
435	Dubové	N,H,P	120	110-150	30	101	BK7 SM1 DB1 JD1 BO MD LP		
436	Bukové	P,N,H	130	120-150	30	111			
437	Březové s OL	H, N	70	60-80	20	61			
53 – Kyselá stanoviště vyšších poloh: 5K (kyselá stanoviště středních poloh na svazích a plošinách; kambizem oligotrogní, oglejená, pseudoglejová)									
531	Smrkové	P,H,N	110	100-130	30	91	SM6 JD1 BK2 BO1 LP JV BŘ	25% - BK, LP, JD	
533	Borové	H,N,P	120	100-130	30	101	BO6 BK3 SM1 JD JV		
45 – Živná stanoviště středních poloh: 3S, 3H, 3B, 3D, 4S, 4H, 4B, 4D (živná stanoviště středních poloh na svazích a plošinách; kambizem oligomezotrofní, mezotrofní, eutrická, luvizem oglejená)									
1451	SM kvalitní	H,N,P	110	100-120	30	91	SM6 BK2 DB1 JD1 LP BO MD JV JS JL DG JDO	25% - BK, JD, DB, LP, JV, JS, JL, TŘ, JDO	MD 8-13 DG 6-10 JDO +-3
451	Smrkové	H,N,P	100	90-120	30	81	DB7 BK2 LP1 MD SM JD JV JS		
453	Borové	H, N	100	90-120	20	91	BK7 DB1 SM1 MD1 JV JS JL		
455	Dubové	H,N,P	130	110-140	30	111			
456	Bukové	N, P	120	120-140	30	101			
457	Březové s OL	H, N	70	50-90	20	61			
55 – Živná stanoviště vyšších poloh: 5S, 5H (živná stanoviště vyšších poloh na svazích a plošinách; kambizem oligomezotrofní, oglejená)									

551	Smrkové	N, P	110	90-120	30	91	SM6 JD1 BK3 JV LP JS JŘ TR	25% - BK, JV, JL, LP, JS, TR	
27 – Oglejená chudá stanoviště nižších a středních poloh: 3P, 3Q, 4Q (střídavě zamokřovaná chudá stanoviště na plošinách kyselých hornin; pseudoglej typický, podzolový)									
271	SM nevhodné	H, N	100	80-110	20	91	BO7 DB2 SM1 JD BŘ MD	20% - BK, DB, BŘ, JD, OS	MD 1-4 JDO +-1 VJ +-4
1273	BO kvalitní	N, P	130	110-140	30	111	OS VJ JDO		
273	Borové	H,N,P	120	100-130	20	111	DB6 BO3 BK,JD1 MD BŘ		
275	Dubové	N,(P,H)	130	110-140	30	111	OS		
47 – Oglejená stanoviště středních poloh: 3V, 3O, 4V, 4O, 4P (střídavě zamokřovaná stanoviště na plošinách a v úžlabinách; kambizem oglejená, pseudoglej kambický, pelický, typický)									
1471	SM kvalitní	N, P	120	110-140	40	101	SM6 JD1 DB1 BK1 BO1	25% - BK, JD, DB, LP, JV, JS, JL, JDO	MD 2-6 JDO 2-5 DG +-2 BOČ +
471	Smrkové	N, P	110	100-130	30	91	MD JV JS JL LP JDO		
1473	BO kvalitní	N, P	120	110-140	30	101	BO5 SM2 JD1 DB1 BK1		
473	Borové	N, P	110	100-130	30	91	MD LP BŘ		
1475	DB kvalitní	N, P	160	140-180	30	141	DB7 BK1 LP1 SM JD BO		
476	Bukové	P, (N)	130	120-150	30	111	MD		
477	Březové s OL	N	70	60-80	20	61	BK7 DB2 JD,LP1 MD JV JS JL		
57 – Oglejená stanoviště vyšších poloh: 5V, 5O, 5P (střídavě zamokřovaná stanoviště na plošinách a v úžlabinách; kambizem oglejená, pseudoglej kambický, typický)									
571	Smrkové	P,N	120	100-130	30	101	SM7 JD1 BK2 BO MD LP	25% - JD, BK, JV, JS, JL, LP, JDO	MD 3-7 JDO 3-7
573	Borové	N, (H)	110	100-130	30	91	JV JS JL JDO		
19 – Lužní stanoviště: 1L, 2L (zaplavovaná stanoviště a obohacovaná proudící vodou; fluvizem kambická)									
191	Smrkové	N	100	80-110	20	91	DB5 JS3 LP1 JV1 JL HB	15% - DB, JV, LP, JL, HB, BB	TPK +
193	Borové	H, (N)	100	80-110	20	91	OL TP VR		
195	Dubové	H, P	130	120-160	30	111			
197	Olšové	N, H	90	70-100	20	81			
29 – Olšová stanoviště na podmáčených půdách: 1T, 1G, 3L (zaplavovaná stanoviště a obohacovaná proudící vodou; rašelinný glej, fluvizem glejová, kambická)									
291	Smrkové	N, P	90	80-100	20	81	OL7 JS2 SM1 JV BŘ OS	1T – 75%, 1G – 90%, 3L – 70% OL, BŘ, JV, DB, VR	-
293	Borové	N	90	80-100	20	81			
297	Olšové	N	90	90-100	30	71			
39 – Podmáčená chudá stanoviště: 0G9, 0T, 4Gt, 5T, 5R (plošiny s nepříznivými odtokovými poměry; podzol glejový rašelinný)									
391	SM (s BO)	N	110	90-120	30	91	BO6 SM1 JD1 DB1 BŘ1	10% - JD, DB, BŘ, OS	VJ +-1
393	BO (se SM)	N, P	120	100-130	30	101	OL OS	20% - 4Gt	
59 – Podmáčená stanoviště středních poloh: 0G, 3G, 4G, 5G, 4Pg, 5Pg, 4R (podmáčená stanoviště na sníženinách a v úžlabinách; glej typický, humózní, rašelinový, organozem mezická)									
591	Smrkové	P, N	100	90-120	30	81	SM7 JD2 DB,BK1 BO JV	3g,4G,3Vg – 20%, 0Pg, 4R – 5% JD, DB, BK, JV, LP, OL, BŘ, OS	-
1593	BO kvalitní	N, (P)	130	100-130	30	111	OL OS JS LP BŘ		
593	Borové se SM	P, N	120	100-130	30	101	0Pg: BO7 SM2 DB1 BŘ		
595	Dubové	N, (H)	130	110-140	30	111	0G9: SM7 BO3 JD DB BŘ		
597	Olšové	N	80	60-90	20	71	OL 4R: SM10 BO JD BŘ OL		
LESY OCHRANNÉ									
01 – Mimořádně nepříznivá stanoviště: 0R, 0Rt, 0Z, 3Z, 4Z, 3J (hluboké rašeliny; organozem typická; sutě a skalnaté výchozy hornin; litozem, psefitická regozem, litický a kambický ranker)									
013	Borové (BL)	V, (P)	130	130-f	N	-	BO9 BŘ1 BL SM BL9 BO1 BŘ KLEČ	0R – 5%, 0Rt – 1-5% BŘ	-
011	Smrkové	V, N	100	100-f	20	91	Dle stanovištního typu	0Z – 5%,	-

015	Dubové	V, (P)	150	150-f	N	-		3Z, 4Z – 30% 3J – 90% JD, DB, BK, BŘ, LP, HB, JV, JS, JL, TS	
-----	--------	--------	-----	-------	---	---	--	--	--

VYSVĚTLIVKY

Porostní typ – zařazení dle současných porostních skupin se provádí podle převládající dřeviny. Není-li pro převládající dřeviny vylišen porostní typ, řadí se do příbuzného HS, a to SMX, JD, JDO, DG, MD do smrkového, BOČ, VJ do borového, tvrdé listnaté do dubového, případně bukového a měkké listnáče (zvl.BŘ, OS) do olšového HS.

Základní doporučení – hospodářský způsob: **H** – holosečný, **N** – násečný, **P** – podrovní, **V** – výběrný.

Cílová druhová skladba – ekonomicky, biologicky i funkčně optimalizované zastoupení dřevin v mýtném věku, které odpovídá přírodním podmínkám souboru, neodpovídá však současnému stavu lesa. Alternativy jsou dalšími přípustnými možnostmi volby skladby dřevin v jednotlivých HS v návaznosti na porostní typy. Údaje jsou uvedeny v desítkách procent.

Meliorační a zpevňující dřeviny – jsou uvedeny podle přílohy vyhlášky MZe č.83/1998 Sb. pro jednotlivé cílové HS.

Geograficky nepůvodní dřeviny – uvedeny jsou % maximálně přípustných podílů introdukovaných dřevin dle požadavku odboru ochrany přírody MŽP.

PLO 16 - ČESKOMORAVSKÁ VRCHOVINA

PŘEHLED HOSPODÁŘ. SOUBORŮ

255 175,70 ha

HS	POROSTNÍ TYP (současné porosty)	ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ 12345					CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA - alternativy (desítky %)	MELIORAČNÍ A ZPEVNŮJÍCÍ DŘEVINY (Přil. č.4 k vyhl.č.83/96)	geograficky nepůvodní dřeviny %
13	Přirozená borová stanoviště: OK, OM, OP, OC						suché písčité, podzolové půdy	640 ha	0,2 %
131	Smrkové /nevhod./	H (HH)	100	80-110	10	91	BO 9, /DB,BK,BŘ/ 1, SM OC:BO 8,BŘ 1, (SM, JD, DB) 1	5%-15% -DB,BK,BŘ,JŘ,JD	
133	Borové se smrkem	nP,H, N	120	110-150	20	111			
137	Listnaté ost. /bř,ak/	nH	70	40-80	20-	61			
19	Lužní stanoviště: 2L, 3U						podhorský luh a horský luh na údolních dnech s naplavenými půdami(+ -oglej.)	90 ha	+ %
191	Smrkové /nevhod./	pH	100	80-110	20	91	DB7,JS2,LP/JV,OLL,TP,HB/1, BB, OS,JL,VR,SM 3U:SM 6,KL 2,JS 1,OL1 :JS 7,KL 3 JL+,OL+,	15%:DB,LP,JL,JV,HB,BB, BŘK 3U: JD,BK,JV,JL,LP,OLL,DB	
195	Dubové	P,nN, pH	150	130-200	30-	131			
197	Jasanové a ost (listnaté)	nH,N	90	80-120	20	81			
21	Exponovaná stanoviště nižších poloh: 2N C						edaficky podmíněné (strmost svahů, kamenitost, prosýchavost mělkých půd)	61 ha	+ %
211	Smrkové nevhodné(smiš. s bo,md,db a ost.list)	nN,H	100	80-110	30	81	a)BO 6, DB/BK/ 3, /LP,HB,JV,BŘ/ 1, MD, SM b)DB 7,(BK,LP,HB,JV)3,JS,BŘ,MD,BO DB 4-10,BO 0-5,(BK,LP,HB,JV)0-5,SM,BŘ	30 % - DB,BK,LP,HB,BŘ,JD	MD 1-3
213	Borové a smíšené (sm,db,bk, a ost. List)	nN,P	120	120-150	20.	111			
215	Dubové	P,npN	130	110-150	30-	111			
217	Listnaté ost. /ak,bř, os,hb,ak aj.list. dř.)	nN	70	50-90	20	61			
23	Kyselá stanoviště nižších poloh: 2S, 2 K,S, 3-4M						minerálně slabě zásobené, prosýchavé, převážně mělké, písčité, štěrkovité půdy	360 ha	0,1 %
231	Smrkové nevhodné	nH	100	80-110	30	91	BO 7, DB 2, /BK,LP,HB) 1, MD, BŘ,(DBČ,DG) DB 8,LP 2,BO,BK,HB,MD,BŘ,(DBČ,DG)	25 %-BO –DB , BK , LP , BŘ , HB , DG , JD DB-BK,LP,HB,JD,DB	MD 1-4 DG+ -1 DBČ +1
233	Borové /smíšené se sm,md/	P,npN ,pH	110	90-130	20.	101			
27	Oglejená chudá stanoviště nižších poloh: 4-5Q, 3P						chudé hlíny; podzolové pseudogleje, glejové podzoly	598 ha	0,3 %
271	Smrkové čisté a smíš(s bo a md i db)	(n)N, (n)H	100	80-110	20.	91	BO 7, DB/JD,BK,BŘ/ 2, SM 1, MD,OL , OS(JDO)	20 % DB-DB , BŘ , JD , OS , BK BO-BK,DB,BR,JD,OS,MD	MD1-4 JDO + -1
273	Borové (s příměsí sm,md)	nN,(n H),(P)	120	100-130	30-	101			
275	Dubové /kvalitní /	(P), pN, (pH)	130	110-140	30-	111			
277	Listnaté /bř,os,ol/	nN, (nH)	70	60-90	20.	61			
29	Olšová stanoviště podmáčených půd: 1G,1T, 3L, 5L						trvale zamokřené (zbahnělé) půdy - gleje, mokřady, prameniště, aluvia, (břehové porosty)	2 513 ha	1,0 %
291	Smrkové a(smíš s bo Ol)	pN	90	80-100	20	81	OL6, JS 3, SM(VR,BŘ)1, OS,DB,JV,LP OL7-10, SM 0-3, /BŘ,JV,JS,DBL/ 0-3	90% -1G - OL,VR, 75 %-1T: OL,BŘ,DB 70 %-3L,5L - OL,JV	
297	Olšové /smíšené se sm a ost.list,/	pN	70	60-90	20	61			
297	Jasanové (s OL,SM)	N	90	80-100	20	81			
31	Vysýchavá bazická stanoviště středních poloh: 3 - 5C						svahy, hřbítky, kamenité svahy, mělčí ohrožená půda, pararendziny	438 ha	0,2 %
311	Smrkové (smíšené s bk,bř ,db)	pN	100	80-110	30-	81	BK 6-8,DB 0-3,MD 1,BO 0-2,LP 1,JV -BO 6, DB/BK/ 3, /LP,HB,JV,BŘ/ 1, MD,SM BO:BK,DB,LP,JD,HB	30 % - BK:DB,BK,LP,HB,JD,JV, BŘK,TŘ BO:BK,DB,LP,JD,HB	MD 10-15
313	Borové a smíš se sm	pN	120	110-140	30	101			
315	Dubové	pN	130	120-140	30	111			
316	Bukové	PN,P	130	120-140	40-	111			
35	Živná bazická stanoviště středních poloh: 4 W						minerálně středně zásobené, vlhkostně příznivé půdy (karbonátové)	3 ha	+ %
351	Smrkové	nN, (P), nH	90	80-100	30.	71	BK 7,DB 2,(MD ,LP ,JV) 1 .JD ,KL ,BŘK ,SM ,JS ,(JDO)	70 % - BK,DB,LP,JV,JD,JS, JL,HB BŘK,TŘ	MD 9-15 JDO 1

356	Bukové + jv,kl,lp	P,N	130	120-140	40-	111			3
39	Podmáčená chudá stanoviště : 0G,5T						chudé trvale zamokřené půdy půdy (račeliny) na plošinách a sníženinách nižších a stř. poloh	154 ha	+ %
391	Smrkové a smíš. s bo,bk	pN	110	90-120	30	91	SM 8,JD 1,OL 1,BŘ 0G-BO6-9,SM2-5,BŘ 0-2	5 % 0G;10 % 5T: DB,JD,BŘ,OS	
393	Borové s příměsí sm	P,pN	120	100-130	30	101	5T-SM0-8,OL2-10,(OS,BŘ)0-2		
41	Exponovaná stanoviště středních poloh: a/ kyselá: 3 - 4N,K9; b/ živná: 3 - 4A,F,S9,4B9, 3D7,4D4						prudké či kamenité svahy; rankerová až oligotrofní kambizem	4 184 ha	1,6 %
411	Smrkové a s příměsí s bo,md,bk	pnP, pnN	110	100-130	30	91	SM 6, /BK,DB,LP,JV/ 3, /JD,BO,MD,JS/ 1, BŘ(DG)	30%- KYS.SM:BK,LP,JD,DB,D G	MD 5- 10
413	Borové s příměsí sm	PnP pnN	120	110-140	30	101	-BO 6,(BK,LP,DB,JD)3,SM(MD,BŘ)1,JŘ -DB 4-10,SM(BO)0-6,BK(LP,JD)0- 2,BŘ,JV	KYS.BK,BO:BK,LP,JD,DB ŽIV.SM:	DG +- 3
415	Dubové	P,pN	140	120-140	30	121	-BK 4-10,SM(BO0-6,(LP,JD,JS)0-2,BŘJV	BK,JD,JV,JS,JL,HB,LP DG	
416	Bukové s příměsí db,kl,lp	P,pN	130	120-150	40-	111		ŽIV.BK A BO:	
417	Listnaté ostatní /bř,hb a db nekval/	N,pN	80	70-90	20.	71		BK,JD,JV,JS,JL,HB,LP	
43	Kyselá stanoviště středních poloh: 3 - 4K,I, 5M						minerálně slabé, propustné, převážně štěrkovité, příznivě vlhké půdy, kat..I hlinité uléhavé	19 019 ha	7,2 %
431	Smrkové	n(p)P n(p)N, n(p)H	110	100-130	40-	91	SM 7, BK 2, /LP,JD,BO,MD,DB/ 1,HB,JS,BŘ,(DG)	25 % - SM-DB , BK , LP , JD , HB , DG	MD 6- 10
1433	Kvalitní borové	nP,nN ,P	120	110-140	30	101	-:BO 7, DB/BK/ 2, /LP,SM,BŘ/ 0-1	BO a BK-DB , BK , LP , JD , HB	DG 3-5
433	Borové	P,nN, nH	110	100-130	30-	91	- DB 4-10, BO 0-6, /BK,LP,JD/ 0-2, BŘ, SM		
435	Dubové	P,pN	130	110-140	30	111	-BK 4-10, SM/BO/ 0-6, /LP,JD/ 0-2, BŘ		
436	Bukové +jv,kl,lp	P,pN	130	120-150	40-	111			
437	Listnaté ostatní /bř/	PH, pN	70	60-80	20	61			
45	Živná stanoviště středních poloh: 3 - 4S,H,B,D						minerálně středně zásobené, vlhkostně příznivé půdy, silně zabuřené, kat. S méně	17 068 ha	6,5 %
1451	Smrkové kvalitní	n(p)N, n(p)P,	110	110-120	30	91	SM 6, BK 2,JD 1, /LP,BŘ,MD,JV,DB,JS)1,OS, (JDO,DG)	25 % -SM:BK , DB , LP , JV , JD , JS , JL , HB , TR , JDO,DG	MD 8- 10
451	Smrkové s příměsí bo,md,bk,db	n(p)N n(p)P	100	90-120	30.	81	- BO 1-5, SM 1-5, BK/DB,LP/ 3, BŘ	BK:BK,DB,JD,LP,JV,JS, JL,HB,TR,JDO	DG 3-7 JDO + - 3
453	Borové s příměsí bo	nH,N, nP	110	90-120	20	101	-DB 4-10, BO 0-5, /BK,JV,LP,SM/ 0-2, BŘ -BK 4-10, SM 0-5, /DB,LP,BO/ 0-2, BŘ	DB:BK,LP,JV,JD,JS,JL, HB,TR,JDO	
455	Dubové smíšené	P,pN	130	110-140	30	111			
456	Bukové + jv,kl,lp	P,pN	130	120-150	40-	111			
457	Listnaté ostatní /bř,ol/	pN, pH	70	50-90	20.	61			
47	Oglejená stanoviště středních poloh: 3 - 4O, V, 4P						plošiny občas zamokřované; oglejené půdy, pseudoglej; potočiny/	9 023 ha	3,5 %
471	Smrkové a smíšené (bo,db,bk,md)	pN,pP	100	100-130	30.	81	SM 6, JD 1,BO 1, BK(DB,LP)1, MD 1,JS,BŘ,(DG,BOČ)	25 % - /3V,4V,3O/ - SM: JD , B K , DB , J V , JS , LP , JL , HB , JDO	MD 10- 15
473	Borové smíš. se sm	pN pH	110	100-130	30	91	-BO 2-5, SM 2-5, /DB,JD/ 2-4, BŘ -DB 3-10, /BO,SM/ 0-6, /JD,LP,BK/ 0-2	DB:JD,BK,JV,JS,LP,JL, HB	DG +-2 BOČ +
475	Dubové	pP, (pH)	130	110-130	30-	111	-BK 3-10, SM 0-5, /DB,LP,BO/ 0-1, BŘ - OL 1-6, /BO,SM/ 3-5, /DBL,JD,LP,OS/ 2-4	BK: JD , BK , DB , JV , JS , LP , JL , HB -4O,4P/SM: JD , BK , DB , LP , OS , JDO	
476	Bukové	P,pN	130	120-150	40-	111		BO: JD,BK,DB,LP,OS,BŘ	
477	Listnaté /olšové/ + bř	N,H	70	60-80	20	61		DB: JD,BK,LP	
51	Exponovaná stanoviště vyšších poloh: A/ kyselá: 5 - 6N,K9; b/ živná: 5 - 6A,F,5S9,5B9, 5D4 ,5U						prudké či kamenité svahy, sutě; kambizem - rankerová	9 261 ha	3,5 %
511	Smrkové a smíšené(bo,bk,md)	pnP, pnN	120	110-140	40-	101	SM 6, BK 2, KL 1, (MD , JD , LP) 1, BO , JL , BŘ ,JŘ ,JS , (DG)	30 % - KYS.:BK:BK,JD,JV,LP, DG	MD 4-7 DG +- 1
513	Borové	(n)N, P	120	110-130	30.	101	-SM 7,JD 1,BK 2,BO,MD,JV,JS,LP,DG - BO 3-4, SM 2-4, /BK,JD,LP,KL/ 3	ŽIV.SM.: BK , JD , JV , LP , DG	
3513	Rozlámané BOR v „Z“,nekval. BO a OL	H(N)	70	-	20	61	-BK 4-10, SM 0-6, /JV,JD,LP,JS,JL/ 0-6, BO	BK: BK , JD , JV , LP,DG 5U:BK , JD , JV , JL , LP	
516	Bukové + jv,kl,lp	nP,nN	140	120-150	40-	121			
517	Listnaté ostatní /bř/	N	70	60-80	20	61			

53	Kyselá stanoviště vyšších poloh: 5 - 6K,I,6M						vlhkostně příznivé, minerálně slabě zásobené,šterkovité až kamenité půdy						77 960 ha	29,7 %
2531	Smrkové rezonanční	pP,pN	150	150-170	40	131	SM 7, BK 2, /BO,JD,KL ,MD/ 1, LP, (DG) -SM7,JD 1,BK 2,BO,MD,JV,JS,LP,DG - BO 2-5, SM 3-7, /BK,JD,/ 2, BŘ -BK 4-10, SM 0-6, /,JD,LP,BO/ 0-6, MD, BŘ	25 % - BK,JD,LP,DG	MD 4-7 DG 1-4					
1531	Smrkové kvalitní	nP,nN	120	110-140	40	101								
531	Smrkové smíšené s (bo, md,bk)	nP,nN ,nH	110	100-130	40-	91								
533	Borové smíš. se sm	nP,nN ,nH	120	100-130	30	101								
3533	Rozlámané BOR v „Z“,nekval. BO a OL	H(N)	70	-	20	61								
536	Bukové + kl,lp(smíš se sm)	nP,nN ,nH	140	120-150	40	121								
537	Listnaté ostatní /bř/	H ,pN	70	60-80	20.	61								
55	Živná stanoviště vyšších poloh: 5 - 6S,H,B,D						středně bohaté až bohaté hlinité až slabě šterkovité půdy						59 675 ha	22,7 %
2551	Smrkové rezonanční	pnN, pnP	150	150-170	40	131	SM 7, BK2 , (KL , JD , ,MD) 1 , JV , LP , JS , JL , JŘ , (DG , JDO) -SM 2-3, JD 2-4,BK 4-6,JV0-1,JL +,LP0-1, -BO 1, SM 6, BK 2, MD 1, BŘ -SM 7,JD 1,BK 2,BO,MD,JV,JS,LP,DG -BK 4-10, SM 0-6, /KL,JD,LP,JS,JL/ 0-6 , BŘ	25 % - SM:BK , JD , LP , JS , JV , JL , JDO , TŘ BK: BK , JD , LP , JS , JV , JL , JDO	MD 5-9 DG 3-5 JDO + - 2					
1551	Smrkové kvalitní	pnN, pnP	120	110-130	40	101								
551	Smrkové	nN,nP ,nH	110	100-130	40-	91								
552	Jedlové a smíšené	P(pN)	120	110-140	40	101								
553	Borové smíš. se (sm,md,bk)	nN, nH	110	90-120	30	91								
3553	Rozlámané BOR v „Z“,nekval. BO a OL	H(N)	70	-	20	61								
556	Bukové + kl,lp	P,pN	140	120-150	40-	121								
557	Listnaté ostatní /bř/	PH, (pN)	70	60-80	20.	61								
57	Oglejená stanoviště vyšších poloh: 5 - 6P,O,V ,6Q						střídavě zamokřené uléhavé půdy, oglejené, pseudogleje						53 087 ha	20,2 %
2571	Smrkové rezonanční	PN, pP	150	150-170	40	131	SM 7 , JD 2 , (JV , LP , BK , JL , BO , JS , MD , OL) 1 (JDO) -SM 7,JD 1,BK 2,BO,MD,JV,JS,LP,DG -BO 3-4/, SM 4, /BK,LP,BŘ/ 2, MD 1 -BK 4-10, SM 0-6, /JV,JD,LP,JS,JL/ 0-6 -OL 2-5, SM 3-6, /JD,LP,BŘ,OS/ 2	25 % - /5V,6V/ --JD , BK , JV , JS , JDO , LP, JL - /5-6O,P,Q, / - JD , BK , BŘ , OS , JDO	MD 8- 15 JDO + - 3					
1571	Smrkové kvalitní	pN, pP	120	100-130	40	101								
571	Smrkové a smíš. s (bo,md a oost.list)	pP,pN	110	100- 130	40-	91								
573	Borové	pN,pP	110	100-130	30-	91								
3573	Rozlámané BOR v „Z“,nekval. BO a OL	H(N)	70	-	20	61								
576	Bukové + kl,lp,jl	P,N	140	120-150	40	121								
577	Listnaté /sm,ol a ost. list/	pN, (pH)	70	60-90	20	61								
59	Podmáčená stanoviště středních a vyšších poloh: 0G9, 4- 6G, 3 - 4V9, 4-5R						Humózní gleje a semigleje, (R - rašelina), poklesliny se stagnující vodou; gleje, rašelinná půda						4 887 ha	1,9 %
591	Smrkové a smíš (jd,bo,md,bk,	pP,pN	110	100- 130	40-	91	SM 8, JD 1, /DB , LP , OL , JS , BK , JV , BŘ , BO / 1 - BO 1-4, SM 4-7, /JD,DB,OL,OS/ 2 - OL 2-10, SM 0-8, /OS,BŘ/ 0-2	5-20 % :3-4G,V-SM: BK , DB , LP JD , OLL , JV , OS DB: BK , DB , LP , JD , JV :R - BŘ,JD 0G9 5% : JD , DB , BŘ , OLL , OS						
593	Borové smíš.	PN, pP	120	100-130	30.	101								
597	Listnaté /ol,sm,md bk, a ost. list.)/	pN, (pH)	80	60-90	20	71								
77	Oglejená stanoviště horských poloh: 7P ,7V						Střídavě(mozaikovitě i trvale) zamokřené půdy, na plošinách a mírných sklonech značně ulehle, špatně propustné						173 ha	+ %
771	Smrkové a smíš. (bo a ost.)	(p)P, (pN)	110	100- 120	40-	91	SM 7,JD 2,(BO,BK,JV,BŘ,JŘ ,JS,OL)1 -bo-1-4,sm 1-9,bk 1-2,bř +,jř +jv +	10 % BK, JD, JV, BŘ, JŘ						
79	Podmáčená stanoviště horských poloh: 7 T,G,6-7R						Poklesliny náhorních a podsvahových plošin poblíž potoků a prameništ, poklesliny se stagnující vodou, gleje, (R - rašelina)						2 266 ha	0,9 %
791	Smrkové	pP,pN	110	110-140	40-	91	SM7-8, JD1-2,(BO,BŘ,JŘ)1,OL -BO 1-4,SM 1-9,OL 0-1,BŘ +,JŘ +,JD +, - OL 2-10, SM 0-8, /OS,BŘ/ 0-2, JŘ	5 %- T,G -jd,jř - R - bř , jř, jd						
797	Listnaté /olšové/ + bř	pN,H	80	60-90	20	71								
01	Mimořádně nepříznivá stanoviště: 0Z,0R,1-5Z, 3-6Y, 3J, 5J						/srázy, skalnaté svahy, sutě, hřbety s mělkou půdou; litozem, ranker, rašelina/						1 219 ha	0,5 %

011	Smrkové	N	- 150	150 - f	∞	--	podle SLT, BO6,DB2,BK1,SM1,BŘ,LP	0Z -5%-BK , BŘ , DB , JD 1Z -70%-DB , HB , LP , BŘ , BRK , MK 2Z -60% -DB , BK , HB , LP , BŘ 3-4Z -30% DB , BK , JD , BŘ 5ZY,6Y -30%- DB , BK , BŘ , JŘ , JV 3-4Y -30%-BK , DB , JD , BŘ 0R - 5%- BŘP, BL 6Y :30%:BK , JD , BŘ , JŘ , JV 3J :90%-DB , BK , JV , LP , HB , JD , JS , JL , BRK , MK , TS 5J :60%:BK , JV , JD , JL , LP , JS
013	Borové /smíš./	V,P,N	150	150 - f	∞	--	-BO 0-2 , BK 1-6 , DB 0-3 , BO 0-2 , BŘ0-1,JV 0- 3 , JS , LP, SM	
015	Dubové/smíš./,bb,hb	V,P,N	150	150 - f	∞	--	- DB2-8 , JV1-3 , LP0-2, BŘ0-1, BK1-4 , SM , JD ,	
016	Bukové/smíš./,jv,lp,js,jl	V,P,N	150	150 - f	∞	--	0R -BO8-9,SM0-1, BL 0-1, BŘ 0-1	

VYSVĚTLIVKY:

porostní typ: zařazení dle současných porostních skupin podle převládající dřeviny; porosty s převahou md,jd,jdo,dg se zařazují do sm; porosty s převahou vj, boč do borových; porosty lp, jv, kl, jl do bukových; dbč do dubových; ostatní listnáče do porostního typu listnaté ostatní;

- základní doporučení:

1- hospodářský způsob: H - holosečný, P- podrovní, N - násečný, V - výběrný

2- doporučené obmýtí /detaily, odchylky a další doporučení jsou uvedeny v jednotlivých HS/

3- rozsah přípustného obmýtí

4- obnovní doba

5- počátek obnovy

-cílová druhová skladba + alternativy: ekonomicky, biologicky i funkčně optimalizované zastoupení dřevin v mýtném věku, které odpovídá přírodním podmínkám souboru. Neodpovídá současnému stavu lesů. Je uvedena v desítkách procent. Jsou uvedeny všechny skladby podle základních dřevin cílového souboru. a zároveň poukazují na možnost čistých porostů v případě bk a db. Porosty db a bk by se měly z celospolečenského hlediska obnovovat opět na db a bk. Alternativy pak ukazují další přípustné možnosti volby skladby dřevin v jednotlivých hospodářských souborech v návaznosti na porostní typy. /detaily, odchylky a další doporučení jsou uvedeny v jednotlivých rámcových směrnících HS

Jedná se o souhrnný modelový přehled celé oblasti. Odchylky a další detailní doporučení včetně funkcí jsou rozvedeny ve vlastních rámcových směrnících hospodaření dle jednotlivých hospodářských souborů..

-meliorační a zpevňující dřeviny: uvedeny minimální podíly dle přílohy vyhlášky č.83/1996 Sb. pro jednotlivé cílové HS

PLO 17 - POLABÍ

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH DOPORUČENÍ HS PLO 17

102 481 ha

HS	POROSTNÍ TYP (současné porosty)	ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ 12345					CÍLOVÁ DŘEVINNÁ SKLADBA - alternativy /desítky %/	MELIORAČNÍ A ZPEVNŮJÍCÍ DŘEVINY (Přil. č.4 k vyhl.č.83/96)	geograficky nepřírodnostní ny %
13	Přírozená borová stanoviště: 1M, 0K,0M; 0P,0O /šterkopískové terasy, duny; písčité, podzolové půdy/							16 209 ha - 15,8% (16 356 ha - 15,4%)*	
133	borové /smíšené/ + vj	P,N,H	120	110-140	20	111	BO 8, DB 1, (BŘ,SM) 1, MD DB 4-6, BO 4-6, SM, BŘ	5 % - /0K,0M,0P,0O/- DB,BK,BŘ,JŘ,JD,DBČ 15 % - /1M/- DB,BŘ,LP,JD,DBČ,HB	MD 1-3 DBČ+-1
131	smrkové /nevhodné /	H,N	100	80-110	20	91			
135	dubové	P,N	130	110-160	30	111			
137	listnaté ostatní(ak, bř)	H,N	60	40-80	20	51			
19	Lužní stanoviště: 1 - 2L, 1U, 3U / aluvia nížin a pahorkatin, fluvizem, glej /							4 357 ha - 4,2% (4 904 ha - 4,6%)*	
195	dubové	H,N,P	150	130-200	20	141	DB 7, JS 2, (LP,JV,JL,OL,TP,HB) 1,SM /1U/: TP 10, JS, OL	15 % - DB,LP, JL,JV,HB, BB,břek; - 3U + BK,JD - 1U + OL,VR,OS	TPX 1-5
197	smíšené /js,ol,sm,hb/	N	90	80-120	20	81			
198	topolové	H	40	20-40	10	36			
21	Exponovaná stanoviště nižších poloh: 1 - 2C, 1 - 3A; 2S9, 3F / hřbítky, svahy; mělké ohrožené půdy/							2 325 ha - 2,3% (2 671 ha - 2,5%)*	
213	borové /smíšené/	P,N	120	110-140	20	111	BO 6, DB 2, (LP,JV,BK)1, (HB,BŘ)1, SM /3A,F/: SM 2-4, (BO,DB) 4-6, (BK,LP,HB) 3-4 DB 7-10, (LP,HB,BK) 0-2, (BO,SM) 0-1 /3A,F/: BK 4-10, (LP,HB,DB) 0-3, (BO,SM) 0-1	30 % - /1-2C/ - DB,BK,LP,HB,JD,BŘ /1-3A/ - +JV,JS,břek,BB,tis,JL /3F/ - +DG	MD 1-3 BOČ+
211	smrkové /nevhodné/	N	100	80-110	30	81			
215	dubové	P,N	140	110-150	30	121			
216	bukové + lp,jv	P,N	140	110-150	40	121			
217	listnaté ost.	N	60	50-90	20	51			
210	akátové	N	80		20	71			
23	Kyselá stanoviště nižších poloh: 1 - 2K,I; 1S1,1S5,1S6,1S7,1S8, 2S, 2M, 3K5, 3I4 /chudé překryvy, šterkopísky, pískovce; arenická kambizem, luvizem, podzol/							22 039 ha - 21,5% (22 282 ha - 21,0%)*	
233	borové /smíšené/	H,P,N	120	90-130	20	111	BO 7, DB 2, (BK,LP,BŘ,SM,HB) 1 /2S,I,3K5,3I4/: SM 2-4, BO 4-6, (BK,LP,HB) 3-4 DB 4-10, BO 0-6, (BK,LP,HB,SM) 0-4 BK 4-10, BO 0-6, (DB,LP,HB,SM) 0-4	25 % - DB,BK,LP,BŘ,HB, JD,DG	MD 1-3 DG+-1 DBČ+
231	smrkové	H,N,P	100	80-110	20	91			
235	dubové	P,N	140	110-150	30	121			
236	bukové + lp	P,N	140	120-150	40	121			
237	listnaté /ak,hb,bř,os/	N,H	70	50-90	20	61			
25	Živná stanoviště nižších poloh: 1 - 2H,B,D,O,V; 1S2,1S4 /slínovce, sprašové a písčité překryvy; pararendzina, luvizem, hnědozem, kambizem, pseudoglej/							34 916 ha - 34,1% (36 900 ha - 34,6%)*	
255a	dubové /kvalitní /	P,N,H	160	130-200	30	141	DB 8, (LP,BK,HB,JV,JS,JD) 2,MD,SM,OL,BO /2H,D/: SM 1-3, BO 1-3, (DB,BK,LP) 4-8 /1S,2H/: BO 1-3, SM 1-3, (DB,BK,LP) 4-8 /2H,B,D/: BK 4-10, BO(SM) 0-4, (DB,LP,HB) 0-5	20 % - DB,BK,LP,HB,JV,JS,JL, JD,JDO,TŘ,BB,břek	MD 1-3 DG+-1 JDO+-1
255b	dubové /průměrné /	P,N,H	120	100-130	30	101			
251	smrkové	H,N	100	80-110	20	91			
253	borové	H,N	110	80-120	20	101			
256	bukové	P,N	140	120-150	40	121			
257	smíšené /nekvalitní /	H,N	70	50-90	20	61			
258	topolové	H	40	20-40	10	36			
27	Oglejovaná chudá stanoviště nižších poloh: 1 - 3P,Q; 2T,0G,4Q /šterkopískové terasové překryvy na křídovém podloží; podzolový pseudoglej, glejový podzol, glej/								
273	borové	P,N,H	120	110-130	30	101	BO 7, (DB,BŘ,BK) 2, (SM,JD) 1, OL,LP SM 2-4, (DB,JD,BK,BŘ) 2, BO 4-6 DB 4-10, BO 0-4, (SM,LP,JD) 0-2 BK 4-10, BO(SM) 0-4, (DB,LP,HB) 0-5	20% -/1-3P,Q,4Q/ - DB,BŘ,JD,OS,BK 10% - /2T/ - DB,JD,BŘ,OS 5% - /0G/ -DB,OL,JD,BŘ,OS	MD 1-5 JDO+-2 DG+-2 DBČ+-1
274	vejmutovkové	H,N	80	70-90	20	71			
271	smrkové	H,N	100	80-110	30	81			
275	dubové /kvalitní /	P,N,H	140	110-140	30	121			
276	bukové	P,N,H	140	120-150	30	121			
277	listnaté ost. /bř,os,ol/	H,N	70	60-90	20	61			
29	Olšová stanoviště podmačených půd: 1G,1T, 3L /potoční aluvia, tůňe, prameniště; glej, fluvizem/								
297	olšové /jasanové/	N	90	60-90	20	81	OL 6, JS 3, (SM,VR,BŘ) 1, OS OL 7-10, SM 0-3,(BŘ,JV,DBL) 0-3 TP 10	90 % - 1G-OL,VR 70 % - 3L-OL,JV 75 % - 1T-OL,BŘ,DB	TPX 1-5
291	smrkové	N	90	80-100	20	81			
298	topolové	N,H	40	20-40	10	36			
43	Kyselá stanoviště středních poloh: 3K,I (mimo 3K5 a 3I4) /šterkopískové terasové překryvy a jiné chudé překryvy, arenická oligotrofní kambizem, luvizem /							1 392 ha – 1,3% (176 ha – 0,2%)*	
431	smrkové	N,P,H	110	100-130	30	91	(BO,SM) 7, BK(DB) 2, (LP,JD,MD)1, BŘ DB 4-10, BO 0-6, (BK,JD,LP) 0-2, SM,HB BK 4-10, (BO,SM) 0-6, (LP,DB) 0-2, JD, BŘ	25 % - DB,BK,LP,JD,HB,DG	MD 5-10 DG+-3 JDO+
433	borové	P,N,H	120	100-130	30	101			
435	dubové	P,N	140	110-140	30	121			
436	bukové +jv,kl,lp	P,N	140	120-150	40	121			
437	listnaté ostatní /bř/	N,H	70	60-80	20	61			

45	Živná stanoviště středních poloh: 3S,H,B,D <i>/štěrkopisky, opuky, bohaté překryvy; oligotrofní až eutrofní kambizem, luvizem/</i>						539 ha – 0,5% (518 ha – 0,5%)*		
451	smrkové	N,H,P	100	100-120	30	81	SM 7, BK(DB) 2, (LP,JV,JS,JD,MD)1, BO	25 % - BK,DB,LP,JV,JD,JS,JL, HB,TR,JDO	MD 5-10 DG+-3 JDO+
453	borové	H,N	110	90-120	20	101	/3S/: BO 1-5, SM 1-5, BK(DB,LP) 3		
455	dubové	P,N,H	140	110-180	30	121	DB 4-10, BO 0-5, (BK,KL,LP,SM) 0-2		
456	bukové + jv,kl,lp	P,N	140	120-150	40	121	BK 4-10, BO 0-5, (DB,LP,SM) 0-2		
457	listnaté ostatní /bř,ol/	N,H	70	50-90	20	61			
47	Oglejená stanoviště středních poloh: 3O; 3V; (3P) <i>/plošiny občas zamokřované; oglejené půdy, pseudoglej/</i>						117 ha - 0,1% (212 ha - 0,2%)*		
471	smrkové	P,N,H	110	110-130	30	91	SM 7, (BK,DB,LP,JD) 2, (JS,BŘ,BO,MD) 1	25 % - JD,BK,DBL,JV, JS, JDO,LP,JL,HB	MD 1-5 DG+-2 JDO+-2
59	Podmáčená stanoviště: 2-4G; 4R <i>/poklesliny se stagnující vodou; glej, organozem/</i>						366 ha - 0,4% (1 022 ha - 1,0%)*		
591	smrkové + bo /ekotyp/	P,N	100	90-120	30	81	SM 6, (JD,OL) 2, (DBL,OS,BŘ,BO) 2	5 % -/4R/-JD,BŘ,OL,DBL,OS	---
595	dubové	P,N	140	110-140	30	121	/2-4G/: DBL 5-10, (JD,BO,SM,OL,OS) 0-5, BŘ	20% -/2-4G/- JD,OL,JV,DBL,OS,LP,BK	
597	listnaté ost. /ol,os,bř /	N	80	60-90	20	71	OL 3-10, SM 0-3, (BŘ,JV,DBL) 0-3		
01	Mimořádně nepříznivá stanoviště: 0Z; 1Z; 1J, 3J; 1 - 2X ; 3Y <i>/srázy, skalnaté svahy, sutě, hřbety s mělkou půdou; litozem, regozem, ranker, pararendzina/</i>						612 ha - 0,6% (694 ha - 0,7%)*		
016	javorové + bk /1-3J/	V,P	150	--	40+	131	JV 3, DB 3, (HB,BK,LP,JS,JL) 4,BO,SM	5% - /OZ/- BK, DB, JD, BŘ	---
013	borové /smíšené/ 0Z	V,P	150	--	40+	131	BO 8, DB 1, BŘ 1, BK	70% - /1Z/- DB, HB, LP, BŘ, břek, muk	
015	dubové /smíšené/ /1-2X,1Z/	V,P	150	--	40+	131	DB 7, BO 2, HB 1, BK, LP, JL, BB, břek, muk, tis	90% - /1-2X/- DB, BŘ, HB, LP, JV, JS, JL, BB, muk, břek	
010	akátové	N	80	--	20	71	Dle SLT	95% - /1J,3J/- DB, JS, JV, BK, LP, HB, JL, BB, tis, muk, břek	
								30% - /3Y/- BK,DB,JD,BŘ	

* plošné údaje cílových hospodářských souborů uvedené v závorce jsou z digitální vrstvy CIHO agregované z typologické mapy revidované k datu OPRL (k r. 2000), zatímco první plošné údaje jsou agregované ze SLT uvedených v porostních skupinách platného LHP (k r. 1999) dle zařazovací tabulky (Metodika OPRL MACKŮ 1996)

VYSVĚTLIVKY:

- porostní typ: zařazení dle současných porostních skupin podle převládající dřeviny; porosty s převahou **MD,JD,JDO,DG** se zařazují do sm; porosty **LP,JV,KL,JL** do bukových; **DBČ** do dubových; **ostatní listnáče** do porostního typu listnaté ostatní;

- základní doporučení: 1- hospodářský způsob: **H - holosečný, P- podrovní, N - násečný, V - výběrný**
2- doporučené obmýty /detaily, odchylky a další doporučení jsou uvedeny v jednotlivých HS/
3- rozsah doporučeného obmýty
4- obnovní doba
5- počátek obnovy

-cílová druhová skladba + alternativy: ekonomicky, biologicky i funkčně optimalizované zastoupení dřevin v mýtném věku, které odpovídá přírodním podmínkám souboru. Neodpovídá současnému stavu lesů. **Je uvedena v desítkách procent.** Jsou uvedeny všechny skladby podle základních dřevin cílového souboru. a zároveň poukazují na možnost čistých porostů v případě bk a db. Porosty db a bk by se měly z celospolečenského hlediska obnovovat opět na db a bk. Alternativy pak ukazují další přípustné možnosti volby skladby dřevin v jednotlivých hospodářských souborech v návaznosti na porostní typy.

-meliorační a zpevňující dřeviny (stanoviště vhodné dřeviny): uvedeny **minimální podíly** dle přílohy vyhlášky MZe č.83/1996 Sb. pro jednotlivé cílové HS

-geograficky nepůvodní dřeviny: v % **maximální přípustné podíly** introdukovaných dřevin dle požadavku odboru ochrany přírody MŽP

Poznámka: Jedná se o souhrnný modelový přehled celé oblasti. Odchylky a další detailní doporučení včetně funkcí budou rozvedeny ve vlastních rámcových směrnicích hospodaření dle jednotlivých hospodářských souborů. Uvedené výměry cílových HS jsou podle současných platných LHP (k roku 1999) v dané oblasti.

PLO 18 - SEVEROČESKÁ PÍSKOVCOVÁ PLOŠINA A ČESKÝ RÁJ

Přehled základních hospodářských doporučení zastoupených HS

HS	POROSTNÍ TYP (současné porosty)	ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ					CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA - alternativy /desítky %/	zákl. meliorač. a zpevňující dřeviny (Přil. č.4 k vyhl. č.83/96)	sníž. % MZD	geograficky nepůvodní dřeviny %	
		1	2	3	4	5					
13	Přírozená borová stanoviště : 0M, 0K, 0N • 0O, 0P • 1M křídové pískovce, čtvrtohorní štěrkopisky v okraji oblasti → LO 17 (slt 1M)										36 229 ha
131	smrkové	N	110	30	91	2+5	0N : SM3-7,BO1-4,BK1-2,JD+0.5,BŘ 0O,0P : SM1-3,BO6-8,DB+2,BŘ+1,JD+0.5	BO,SM	0N-10%:BK,JD,BŘ 0O,0P- 10%:DB,JD,BŘ,(BK)	10%	MD 2% DG 1% JDO + DBČ 2%
133	borové	H	120	20	111	2+5	0M,0K : BO8-9.5,(BK,DB)+2,BŘ+0.5,DBČ-0.2 1M : BO7-8.5,DB 0.5-3,BŘ+1,(HB,LP)+0.5	BO	0M- 5 % : DB,BŘ,(BK) 0K -10 % : BK,DB,BŘ 1M- 10%:DB,BŘ,HB,LP	5% 10% 10%	
137	březové	H,N	70	20	61	2+5					
19	Lužní stanoviště : 2L, 3U potočiny a nivy řek s původními společenstvy tvrdých listnáčů										507 ha
191	smrkové	H,N	100	20	91	2+5	2L: DB4-6,JV1,JS2-3,LP-1,JP-0.5,SM-0.5,OL-1 3U:JS3-5,JV2,BK+3,(DB,LP,JP,OL)+2,SM-5	DB	15%:LP,JV,JP,HB,DB	15%	--
195	DB a tvrdé listnáče	Hp	150	30	131	2+5		JS,DB	15%:BK,JV,JP,LP,JD, OL,DB	15%	
196	javoro-jasanové	N	90	20	81	2+5					
21	Exponovaná stanoviště nižších poloh : 2N, 2K9, 2S9 • 3M9 • 1C, 2C • 2A, 2H9 (příkré až srázné svahy • kambizemě ± rankerové, oligotrofní až mesotrofní)										2784 ha
213	borové	N	120	30	101	2+6	2N, 2K9, 2S9 : BO6-7,DB2,BK(LP)1-2,MD-0.2 3M9 : BO7,(DB,BK)3,BŘ	BO DB	30% : BK,DB,HB,LP,BŘ	30%	MD 2%
215	dubové	P,pN	130	30	111	2+6	1C,2C : BO0-7,DB2-8,(LP,BK)+2,HB+1 2A : DB5,(BK,LP)3,JV2,JS,HB 2H9: DB6-8,BK-2,HB-1,LP+1,JV,MD-0.2,BO-2	BO DB	30 % : BK,DB,LP, JV,JS,HB,BŘK,BB	30%	
217	březové, akátové	N	70	20	61	2+6	DB porosty obnovovat opět → DB AK pařeziny se připouští zmlazovat od pařezu				
23	Kyselá stanoviště nižších poloh : 1K, 2K (mimo 2K9), 2I, 2S6 • 2M,3M (mimo 3M9), 4M (plošiny, mírné až střední svahy • oligotrofní kambizemě, luvizemě /2I/)										5961 ha
231	smrkové	nH	100	20	91	2+5	BO5-7,DB1-3,BK-3,HB-1,LP-1,MD-0.5,BŘ	BO	25 % : BK,DB,LP,HB,JD,BŘ	25%	MD 5%
233	borové (modřínové)	nH	110	20	101	2+5	DB porosty obnovovat opět → DB				
235	dubové	P,N	130	30	111	2+6		DB	25 % : BK,DB,LP,HB,JD		
237	březové	nH	70	20	61	2+5					
25	Živná stanoviště nižších poloh : 1H, 2H (mimo 2H9), 1B, 2B, 1D, 2D, 1S, 2S1, 1V, 2V, 1O, 2O (plošiny, mírné až střední svahy • hnědozemě, mesotrofní až eutrické kambizemě částečně oglejené)										2800 ha
251	smrkové	nH	100	20	91	2+6	DB6-8,BK-2,HB-1,JV-1,JS-2,LP+1.5,MD-0.5	DB	20 % : BK,JD,LP,JV, JS,JP,DB,JDO	20%	MD 5%
253	borové (modřínové)	nH	110	20	101	2+6					
255	dubové a tvrdé listn.	P,N	150	30	131	2+6					
257	březové	nH	70	20	61	2+6					
27	Oglejená chudá stanoviště nižších a středních poloh : a) 1P, 2P, 1Q, 2Q • b) 3P, 3Q, 4Q (plošiny, velmi mírné svahy, poklesliny • pseudoglejové kambizemě, pseudogleje)										348 ha
273	borové	N,P	120	30	101	2+5	BO6-8,DB+3,(BŘ,OS)1-2,(BK,JD)-1	BO	20% : BK,DB,JD,BŘ,OS	20%	--
275	dubové	pN	130	30	111	2+6	DB por. obnovovat opět → DB + cenné list.	DB			
277	březové (olšové, OS)	N	70	20	61	2+5					
29	Olšová stanoviště na podmačených půdách : 1T, 1G, 3L (potočiny, prameniště)										509 ha
296	JS a tvrdé listnáče	pN	90	20	81	2+5	3L : OL7JS3,JV,SM	OL,JS	3L - 70 % : OL,JV	70%	--
297	olšové (s jasanem), březové	pN	90	20	81	2+5	1T : OL5-6,BŘ2,SM2-3 • 1G : OL10, keř.vrby	OL	1T - 70 % : OL,BŘ 1G - 70 % : OL		
39	Chudá podmačená stanoviště nižších až vyšších poloh : 0T, 2T • 0G1, 0G3 (pískovce, rybníční pánve a niva Ploučnice, zamokřené ploché poklesliny • gleje ± podzolové, ± organozemní)										440 ha
391	smrkové	P,N	110	30	91	2+6	0T : BO8-9.5, BŘ0.5-2	BO	5% : DB,JD,BŘ,OS	5%	--
393	borové	P,N	120	30	101	2+6	2T : BO8-9.5, BŘ0.5-2,SM				
397	březové	N	70	20	61	2+6	0G : BO4-6,SM4-6,BŘ 0.5				
41	Exponovaná stanoviště středních poloh : a) 3K9 *, 3N * • 3S9 • 4K9, 4N, 4S9 • 3F, 4F b) 3A • 4A • 3B9, 3H9, 4B9 c) 3C, 4C (příkré až srázné svahy • kambizemě ± rankerové, oligotrofní až mesotrofní)										2877 ha
411	smrkové (modřínové)	pN	110	30	91	2+6	a) SM(BO*)5-7,BK2-3,LP,DB,JD/-1,MD-0.5	SM	30 % : BK,JD,LP,DB	15%	MD 5%
413	borové	N	120	30	101	2+6	b) 3A,4A,3B9,3H9 : SM-6,BK4 -7,DB+2,JV+- 2, LP+1,JD	BO BK	30 % : BK,JD,JV,JS, JP,LP,DB		DG 2%
416	bukové (DB, tvrdé listnáče)	P,pN (150)	130	40	111 (131)	2+6	c) 3C,4C : BK7-9,DB+2,LP+1,JV+1,JD+1				
417	březové	N	70	20	61	2+6	BK porosty obnovovat opět → BK				
43	Kyselá stanoviště středních poloh : 3K (mimo 3K9), 3I, 3S8 • 4K (mimo 4K9), 4I, 4S5, 4S6 (plošiny, mírné až střední svahy • oligotrofní kambizemě)										14179 ha
431	smrkové (modřínové)	N,nH	110	30	91	2+5	SM(BO)5-7,BK2-3,LP,DB,JD/-1,MD-1,DG-0.5	SM	25 % : BK,JD,LP,DB	10%	MD 10%
433	borové	nH	110	20	101	2+5	BK porosty obnovovat opět → BK	BO			DG 5%

436	bukové (DB)	P,pN	130 (150)	40	111 (131)	2+6		BK				
437	březové	N,nH	70	20	61	2+5						
45 Živná stanoviště středních poloh : 3S1, 3S2, 3S6, 3B (mimo 3B9), 3H (mimo 3H9), 3D • 4S1, 4B (mimo 4B9), 4W, 4H, 4D (plošiny, mírné až střední svahy • mesotrofní až eutrické kambizemě) 4408 ha												
451	smrkové (modřínové)	N,nH	100	30	81	2+5	SM5-7,BK2-3,,/LP,DB,JD,JV/-1, JDO-0.2,MD-1	SM	25 % : BK,JD,LP,JV,	10 %	MD 10%	
453	borové	nH	110	30	91	2+5	(DG-0.5)	BK	JS,JL,DB,JDO		DG 5%	
456	BK (DB, tvrdé listn.)	P,pN	130 (150)	40	111 (131)	2+6					JDO 2%	
457	březové	N,nH	70	20	61	2+5	BK porosty obnovovat opět → BK					
47 Oglejená stanoviště středních poloh : a) 3V, 4V • 3O b) 4O, 4P (plošiny, velmi mírné svahy, poklesliny • oglejené až pseudoglejové kambizemě, pseudogleje) 2467 ha												
471	smrkové	pN,P	110	30	91	2+5	SM5-7,BK2-3,,/LP,DB,JD/-2,MD-0.5,JDO -0.2	SM	a)25 % : BK,JD,LP,DB	10 %	MD 5%	
475	DB (BK, tvrdé listn.)	P,N	150	40	131	2+6		BK	JV,JS,JL		JDO 2%	
477	březové (olšové)	N	70	20	61	2+5	DB por. obnovovat opět → DB + cenné list.	(DB)	b)25 %:BK,JD,LP,DB			
51 Exponovaná stanoviště vyšších poloh : a) 5N b) 5A c) 5U (kamenité svahy, oligotrofní až mezotrofní kambizemě rankerové) 136 ha												
511	smrkové (modřínové)	Np	120	30	101	2+6	a) 5N : SM6-7,BK2-3,,/JD,JV,/+1,MD-0.5	SM	30 % : BK,JD,JV,LP	15 %	MD 5%	
516	bukové	P,pN	130 (150)	40	111 (131)	2+6	b) SM5-7,BK2-3,JV1-2,,/LP,JD,JL,JS/-2,MD-0.5	BK	30 % : dtto + JS,JL		DG 2%	
517	březové	N	70	20	61	2+6	c) 5U : SM+5,BK1-4,JV1-3,JS1-3,JD,JL,LP,OL	JV,JS	30 % : dtto + JL			
							BK porosty obnovovat opět → BK + cenné list					
53 Kyselá stanoviště vyšších poloh : 5K, 5S6 , (6S4) (plošiny a mírné až střední svahy • oligotrofní kambizemě) 242 ha												
531	smrkové (modřínové)	nH, pN	120	30	101	2+5	SM6-7,BK2-3, JD-1,BO,MD-1,DG-0.5	SM	25 % : BK,JD,LP	10 %	MD 10%	
536	bukové	P,pN	130 (150)	40	111 (131)	2+6		BK			DG 5%	
537	březové	N	70	20	61	2+5	BK porosty obnovovat opět → BK					
55 Živná stanoviště vyšších poloh : 5S1, 5B, 5D (plošiny a mírné až střední svahy • mezotrofní až eutrické kambizemě) 58 ha												
551	smrkové (modřínové)	nH, pN	110	30	91	2+5	SM6-7,BK2-3,JD-1,JV-1,MD-1,JDO-0.2	SM	25 % : BK,JD,JV,JL,	10 %	MD 10%	
556	bukové	P,pN	130 (150)	40	111 (131)	2+6	BK porosty obnovovat opět → BK + cenné list.	BK	LP,JS,JDO		JDO 2%	
557	březové	N	70	20	61	2+5						
57 Oglejená stanoviště vyšších poloh : 5V • 5O, 5P, 6P • 5Q (konkávní svahy, úžlabiny, poklesliny) 114 ha												
571	smrkové (modřínové)	(p)N	110 (-120)	30 (-101)	91	2+6	5V,5O,5P,6P : SM6-7.5,BK2-3,JD+1,JDO-0.2	SM, BO	25 % - 5O,5P,6O,6P : BK,JD,JDO,BŘ,OS	10 %	MD 5%	
577	březové (olšové)	N	70	20	61	2+6	5Q : SM6-7.5,BO+2,BK1-2,JD+1,JDO-0.2, (BŘ,OS)-1		5V: BK,JD,JV,JS,JL, LP,JDO		JDO 2%	
59 Podmáčená stanoviště středních a vyšších poloh : 4G • 5G, 6G • 0G9 • 4R, 5R (gleje, rašeliny) 321 ha												
591	smrkové	P,N	110	30	91	2+6	4G : SM 8-8.5,(BK,JD,DB,LP,OL)1.5-2	SM	4G: 15 % : BK,JD,DB JV,LP,OL	10 %	--	
597	olšové (březové)	N	80	20	71	2+6	5G,6G : SM8-9,OL1-2,JD,BK		5G, 6G : 10 % : BK, JD,OL	10 %		
							0G9 : SM7-8,B01-2,(BŘ,OL,OS)0.5		0G9 : 5 % : BŘ,OL,JD,DB,OS	5 %		
							4R : SM8-9,OL1-2,BŘ+1,JD		4R, 5R : 5 % : BŘ,OL			
							5R : SM6-7,B02-3,OL1,BŘ+1					
01b Mimořádně nepříznivá stanoviště - reliktní bor (OZ) ; roklínový bor (OY) • (pískovcové skály) 3452 ha												
1011	smrkové	V	150-f	∞	-	2+6	0Z : BO9-9.5,BŘ0.5-1,DB	BO	5 % : BŘ,DB,BK,JD	5%	--	
1013	borové	V	150-f	∞	-	2+6	0Y1 : BO3-4,SM3-5,BK1-3,JD+1,BŘ	BO,SM	5 % : BK,BŘ,JD,DB	5%		
1017	březové	pN	80	30	61	2+6	0Y3 : BO7,BK2,DB1,BŘ					
01d Mimořádně nepříznivá stanoviště - dřínová doubrava (1X) • - zakrslá doubrava (1Z) 242 ha												
01e (kamenité a skalnaté svahy, hřbítiky) - zakrslá buková doubrava (2Z) • - skeletová buková doubrava (2Y)												
3013	borové	V	150-f	∞	-	2+6	1X : DB5-10,LP+2,HB+1,BB+2,břek+1	DB	90% : DB,HB,LP,BB, BŘK,BŘ,JV,JS,JL	90 %	--	
3015	dubové aj.	V	150-f	∞	-	2+6	1Z : DB8-10,BŘ+1,HB+1,LP+1,muk+,břek+		70% : DB,HB,LP,BŘ	70 %		
3017	březové, akátové	pN	80	30	61	2+6	2Z, 2Y : DB8-10,BK+2,HB+,BB+,LP+		60% : BK,DB,LP,HB, BŘ	60%		
01f Mimořádně nepříznivá stanoviště - zakrslá dubová bučina (3Z) ; skeletová dubová bučina (3Y) (kamenité a skalnaté svahy, hřbítiky) 357 ha												
4011	smrkové	V,P	150-f	∞	-	2+6	3Z,3Y: BK2-9,DB1-3,JD,BŘ/+1,BO+5	BK	30 % : BK,DB,JD,BŘ	30%	--	
4013	borové	V	150-f	∞	-	2+6	4Z,4Y: BK8-10,/DB,JD,JV/+2, /BŘ,JŘ/+1					
4016	bukové (dubové aj.)	V	150-f	∞	-	2+6						
4017	březové	pN	80	30	61	2+6	BK porosty obnovovat opět → BK					

HS	POROSTNÍ TYP (současné porosty)	ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ					CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA - alternativy /desítky %/	zákl. meliorač. a zpevňující		sníž.	geograficky
		1	2	3	4	5		dřeviny (Přil. č.4 k vyhl. č.83/96)	% MZD	nepůvodní dřeviny %	
01i Mimořádně nepříznivá stanoviště - habrová javořina (1J) 153 ha											
01j - lipová javořina (3J)											
01k (sutě) - suťová jl-js javořina (5J)											
6011	smrkové	V,P	150-f	∞	-	2+6	1J : DB1-3,LP1-2,JV2-3,HB1-2,JL+-1,BB+-1, JS,břek, třešeň	DB,JV	95% : DB,JV,HB,LP, JL,JS,BŘK,MK,BB	95 %	--
6016	bukové (dubové a cenné listn.)	V	150-f	∞	-	2+6	3J : BK2-5,DB+-1,LP2-3,JV2-3,HB,JD,JL/+-1	BK,JV	90 % : BK,JV,LP,DB, JD,HB,JS,JL	90 %	
6017	březové	pN	80	30	61	2+6	5J : BK3-5,JV3-5,JD,JL,LP,JS/+-2,SM	BK,JV	60 % : BK,JV,JD,JL, LP,JS	60 %	
01m Mimořádně nepříznivá stanoviště - rašelinný bor (0R) 333 ha (rašeliny v pískovcovém obvodu, rybníční pánve)											
9011	smrkové	N	130-f	30-∞	(111)	2+5	0R : BO9.5,BŘ0.5,SM,OL	BO	5 % : BŘP	5%	--
9013	borové	P	130-f	40-∞	(111)	2+5					
9017	březové	N	80	30	61	2+5					

Vysvětlivky

- základní doporučení
 - 1 - hospodářský způsob
 - 2 - doporučené obmýty
 - 3 - obnovní doba
 - 4 - počátek obnovy
 - 5 - doba zajištění kultur od vzniku holiny
- sníž. % MZD - průměrně snížený podíl melioračních a zpevňujících dřevin pro holiny vzniklé v důsledku nahodilých těžeb (vyhl.č.85/1996, §10)

Poznámky :

- Opatření (úprava cílové druhové skladby) diferencovaná podle *funkčního zaměření a zonace* jsou uvedena v podrobných rámcových směrnících hospodaření. V porostech, v nichž se uplatňují zájmy ochrany přírody a ÚSES, je průměrně upravena druhová skladba (→ přirozená druhová skladba) a průměrně prodlouženo obmýty (o 10 - 20 let).
- Uvedený *maximální podíl geograficky nepůvodních druhů* lesních dřevin zastoupených v cílové skladbě je dán závazným stanoviskem Ministerstva životního prostředí ČR. Pokud bude schválen bude platný pouze mimo CHKO. V zasahujících CHKO se podle poskytnutých Plánů péče nepřipouští použití douglasky, jedle obrovské a dubu červeného. Použití dalších dřevin je stanoveno takto :
 - v CHKO Lužické hory se připouští použití modřínu do 5 % v HS 43, 45, 51, 53, 55
 - v CHKO Kokořínsko se připouští v HS 21 výmladkové hospodaření ve stávajících akátových porostech (AK 100) a to i v I. a II.zóně !!. Použití modřínu se v I.zóně nepřipouští, jinak nejvýše dle maximálního podílu uvedeného v závazném stanovisku MŽP.
 - v CHKO Český ráj se připouští v III. a IV.zóně CHKO v HS 13 **příměs** modřínu, jedle obrovské a douglasky a v HS 41, 43, 45, 51, 55 **malé zastoupení** modřínu. Vzhledem k tomu, že HS 13 je v plánu péče o CHKO vymezen široce a omezení geograficky nepůvodních dřevin je vyjádřeno obecně, doporučujeme vycházet ze závazného stanoviska MŽP.
- Počátek obnovy v porostech mladších než 80 let lesní zákon zakazuje (*zákon č.289/1995 Sb., §33, odst.4*). V odůvodněných případech může orgán státní správy při schvalování plánu, nebo při zpracování osnovy, nebo na žádost vlastníka povolit výjimku z tohoto zákazu. V březových, topolových a jiných porostech, jak je uvedeno v tomto přehledu, je tento požadavek odůvodněný.
- Holina musí být zalesněna do dvou let a lesní porosty na ní zajištěny do sedmi let od jejího vzniku. Ve výše uvedených HS je požadavek na delší dobu zajištění kultur odůvodněný. Delší doba zajištění kultur než sedm let od vzniku holiny podléhá schválení orgánem státní správy při schvalování plánu, nebo zpracování osnovy, nebo na žádost vlastníka lesa (*zákon č.289/1995 Sb., §31, odst.6*).
- Pro holiny vzniklé v důsledku nahodilých těžeb, které svojí šíří, nebo velikostí přesahují velikost seče doporučenou rámcovými směrnícemi pro příslušný hospodářský soubor, je v rámcových směrnících /a v tomto přehledu/ stanoven podíl melioračních a zpevňujících dřevin průměrně snížený (*vyhl.č.84/1996 Sb., §10, odst.3*).
- Dubové porosty se doporučuje obnovovat na DB s příměsí dalších dřevin přirozené druhové skladby.
- Bukové porosty se doporučuje obnovovat na BK s příměsí dalších dřevin přirozené druhové skladby. Obmýty buku se doporučuje v hospodářském lese 130 let, při větším rozsahu bukových porostů a jejich výrazně nevyrovnané věkové struktuře lze použít až 150 leté obmýty (ztráty na kvalitě produkce)
- V borových porostech s vysokým podílem cenných listnáčů (dubu, buku), nesnižovat při obnově podíl těchto dřevin (DB, BK) pod současné zastoupení.
- Ve smrkových porostech s vysokým podílem cenných listnáčů (buku), nesnižovat při obnově podíl těchto dřevin (BK) pod současné zastoupení.

PLO 19 LUŽICKÁ PÍSKOVCOVÁ VRCHOVINA

Přehled základních hospodářských doporučení zastoupených HS

HS	POROSTNÍ TYP (současné porosty)	ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ					CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA - alternativy /desítky %/	zákl. meliorač. a zpevňující		sníž. % MZD	Regionálně Nepůvodní dřeviny %	
		1	2	3	4	5		dřeviny (Přil. č.4 k vyhl. č.83/96)				
13 Přirozená borová stanoviště : 0M, 0K, 0N • 0P, 0Q (křídové pískovce • plošiny, mírné až střední svahy, hřbítky /0M/, poklesliny /0P, 0Q/, inverzní údolí /0N/)												10 282 ha
131	smrkové	N	110	30	91	2+5	0N : SM5-7,BO1-3,BK1-2,JD+0.5,BŘ 0P,0Q : SM1-3,BO6-8,DB+2,BŘ+1,JD+0.5	BO, SM	0N-10%:BK,JD,BŘ 0P,0Q- 10%:DB,JD,BŘ,(BK)	10%	--	
133	borové	H,N*	120	20	111	2+5	0M,0K : BO8-9.5,(BK,DB)+-2,BŘ+0.5	BO	0M- 5 % : DB,BŘ,(BK)	5%		
137	březové	H,N	70	20	61	2+5	* 0K8, 0K9 - hospodářský způsob násečný		0K -10 % : BK,DB,BR	10%		
21 Exponovaná stanoviště nižších poloh : 2C (příkré až srázné svahy • kambizemě ± rankerové, mesotrofní)												5 ha
213	borové	N	120	30	101	2+6	2C : BO0-7,DB2-8,(LP,BK)+-2,HB+1	BO, DB	30% : BK,DB,HB,LP,BŘ	30%	--	
215	dubové	P,pN	130	30	111	2+6	DB porosty obnovovat opět → DB					
217	březové	N	70	20	61	2+6						
23 Kyselá stanoviště nižších poloh : 2K plošiny, mírné až střední svahy • oligotrofní kambizemě												4 ha
233	borové (modřínové)	nH	110	20	101	2+5	BO5-7,DB1-3,BK-3,HB-1,LP-1, BŘ		25 % : BK,DB,LP,HB,JD,BŘ	25%	--	
235	dubové	P,N	130	30	111	2+6	DB porosty obnovovat opět → DB	BO				
237	březové	nH	70	20	61	2+5		DB	BK,DB,LP,HB,JD			
25 Živná stanoviště nižších poloh : 2B (střední svahy • mesotrofní kambizemě)												2 ha
255	dubové a tvrdé listn.	P,N	150	30	131	2+6	DB6-8,BK-2,HB-1,JV-1,JS-2,LP+-1.5	DB	20 % : BK,JD,LP,JV, JS,JL,DB	20%	--	
257	březové	nH	70	20	61	2+6						
27 Oglejená chudá stanoviště nižších a středních poloh : 4Q (plošiny, poklesliny • pseudogleje)												16 ha
273	borové	N,P	120	30	101	2+5	BO6-8,DB+-3,(BŘ,OS)1-2,(BK,JD)-1	BO	20% : BK,DB,JD,BŘ,OS	20%	--	
277	březové (olšové, OS)	N	70	20	61	2+5						
29 Olšová stanoviště na podmačených půdách : 1T, 1G, 3L, 5L • 3U (potočiny, prameniště • spádově nevyrovnané potočiny, původně se společenstvy tvrdých listnáčů/3U/)												106 ha
291	smrkové	N	100	20	91	2+5	3U:JS3-5,JV2,BK+-3,(DB,LP,JL,OL)+,SM-5	JS, DB	3U - 15%:BK,JV,JL, LP,JD,OL,DB	15%	--	
296	JS a tvrdé listnáče	pN	90	20	81	2+5	3L, 5L : OL7,JS1-3,JV,SM+-2	OL,JS	3L,5L - 70 % : OL,JV	70%		
297	olšové (s jasanem), březové	pN	90	20	81	2+5	1T : OL5-6,BŘ2,SM2-3 • 1G : OL10, keř.vrby	OL	1T - 70 % : OL,BŘ 1G - 70 % : OL			
39 Chudá podmačená stanoviště nižších až vyšších poloh : 0T • 0G1, 0G3 (pískovce, zamokřené ploché poklesliny • gleje ± podzolové, ± organozemní)												84 ha
391	smrkové	P,N	110	30	91	2+6	0T : BO8-9.5, BŘ0.5-2	BO	5% : DB,JD,BŘ,OS	5%	--	
393	borové	P,N	120	30	101	2+6	0G : BO4-6,SM4-6,BŘ 0.5					
397	březové	N	70	20	61	2+6						
41 Exponovaná stanoviště středních poloh : a) 3N • 4N b) 3A • 4A c) 3C (příkré až srázné svahy • kambizemě ± rankerové, oligotrofní až mesotrofní)												496 ha
411	smrkové (modřínové)	pN	110	30	91	2+6	a) SM(BO*)5-7,BK2-3,/LP,DB,JD/-1,MD-1	SM	30 % : BK,JD,LP,DB	15%	MD 10%	
413	borové	N	120	30	101	2+6	b) 3A,4A : SM--6,BK4 -7,DB+-2,JV+-2,LP-1,JD	BO	30 % : BK,JD,JV,JS, JL,LP,DB			
416	bukové (DB, tvrdé listnáče)	P,pN (150)	130	40	111 (131)	2+6	c) 3C : BK7,DB2,LP+-1,JV+-1,JD+-1	BK				
417	březové	N	70	20	61	2+6	BK porosty obnovovat opět → BK					
43 Kyselá stanoviště středních poloh : 3K, 3l, 3S8 • 4K , 4l, 4S5 (plošiny, mírné až střední svahy • oligotrofní kambizemě, luvizemě)												2794 ha
431	smrkové (modřínové)	N,nH	110	30	91	2+5	SM(BO)5-7,BK2-3,/LP,DB,JD/-1,MD-1	SM	25 % : BK,JD,LP,DB	10%	MD 10%	
433	borové	nH	110	20	101	2+5	BK porosty obnovovat opět → BK	BO				
436	bukové (DB)	P,pN (150)	130	40	111 (131)	2+6		BK				
437	březové	N,nH	70	20	61	2+5						
45 Živná stanoviště středních poloh : 3S1, 3B, 3H, 3D • 4S4, 4B (plošiny, mírné až střední svahy • mesotrofní až eutrické kambizemě)												292 ha
451	smrkové (modřínové)	N,nH	100	30	81	2+5	SM5-7,BK2-3,/LP,DB,JD,JV/-1,MD-1	SM	25 % : BK,JD,LP,JV,	10 %	MD 10%	

453	borové	nH	110	30	91	2+5		BK	JS,JL,DB,JDO		
456	BK (DB, tvrdé listn.)	P,pN	130 (150)	40	111 (131)	2+6		DB			
457	březové	N,nH	70	20	61	2+5	BK porosty obnovovat opět → BK				
47 Oglejená stanoviště středních poloh : a) 3V • 3O b) 4O, 4P 321 ha (plošiny, velmi mírné svahy, poklesliny • oglejené až pseudoglejové kambizemě, pseudogleje)											
471	smrkové	pN,P	110	30	91	2+5	SM5-7,BK2-/LP,DB,JD/-2,MD-0.5	SM	a)25 %: BK,JD,LP,DB	10 %	MD 5%
473	borové	pN,P	120	30	101	2+5	4P : BO(SM)5-7, MD-0.5,DB0.5-2,BK-1,JD-0.5	BK	JV,JS,JL		
475	DB (BK, tvrdé listn.)	P,N	150	40	131	2+6		DB	b)25 %:BK,JD,LP,DB		
477	březové (olšové)	N	70	20	61	2+5	DB porosty obnovovat opět → DB + cenné list.	(BO)			
51 Exponovaná stanoviště vyšších poloh : a) 5N, 6N b) 5C • 5A, 6A 1019 ha c) 5U (kamenité svahy, oligotrofní až mezotrofní kambizemě rankerové)											
511	smrkové (modřínové)	pN	120	30	101	2+6	a) : SM6-7,BK2-3,/JD,JV,/+1,MD-1 b): SM5-7,BK2-3,JV1-2,/LP,JD,JL,JS/+2,MD-1 5C : BK7-10,(JD,JV,LP)+3	SM BK	30 % : BK,JD,JV,LP 30 % : dtto + JS,JL	15 %	MD 20%
516	bukové	P,pN	130 (150)	40	111 (131)	2+6	c) 5U :SM+5,BK1-4,JV1-3,JS1-3,JD,JL,LP,OL	JV, JS	30 % : dtto + JL		
517	březové	N	70	20	61	2+6	BK porosty obnovovat opět → BK + cenné list.				
53 Kyselá stanoviště vyšších poloh : 5K, 5I • 6M, 6K, 6I 10669 ha (plošiny a mírné až střední svahy • oligotrofní kambizemě, kryptopodzoly /6K/ až podzoly /6M,č.5K,č.6K/, luvizemě /5I, 6I/)											
531	smrkové (modřínové)	pN, nH	120	30	101	2+5	SM6-7,BK2-3,JD-1,MD-1,BO	SM BK	25 % : BK,JD,LP	10 %	MD 20% (DG +)
536	bukové	P,pN	130 (150)	40	111 (131)	2+6	5K7,5K8,6M,6K8,6K9 : SM4-5,BO1-2,BK2-3, JD-1,MD-1				
537	březové	N	70	20	61	2+5	BK porosty obnovovat opět → BK				
55 Živná stanoviště vyšších poloh : 5S, 5B, 5H, 5D • 6S 4167 ha (plošiny a mírné až střední svahy • mezotrofní až eutrické kambizemě, 6.lvs - kryptopodzoly)											
551	smrkové (modřínové)	nH,N	110	30	91	2+5	SM6-7,BK2-3,JD-1,JV-1,MD-1	SM	25 % : BK,JD,JV,JL,	10 %	MD 20% (DG +)
556	bukové	P,pN	130 (150)	40	111 (131)	2+6	BK porosty obnovovat opět → BK + cenné list.	BK	LP,JS,JDO		(JDO +)
557	březové	N	70	20	61	2+5					
57 Oglejená stanoviště vyšších poloh : 5V, 5O, 5P, 5Q • 6V, 6O, 6P, 6Q • 7V, 7O, 7P 1760 ha (konkávní svahy, úžlabiny, poklesliny)											
571	smrkové (modřínové)	(p)N	110 (-120)	30	91 (-101)	2+6	5. a 6. lvs : SM6-7.5,BK2-3,JD+1,(JDO-0.5) 5V,6V : dtto,(JV,JS)-1,OL	SM, BO	25 % - 5O,5P,6O,6P : BK,JD,JDO,BŘ,OS 5V,6V : BK,JD,JV,JS, JL,LP,JDO, BŘ,OL	10 %	MD 10% (JDO 5%)
577	březové (olšové)	N	70	20	61	2+6	7.lvs : SM8-9,(BK,JD,JV)1-2,BŘ-1	SM	10% - BK,JD,JV,BŘ	10 %	
59 Podmáčená stanoviště středních a vyšších poloh : 0G8, 0G9 • 5G, 6G • 4R, 5R, 6R • 7G, 7T, 7R 1255 ha (gleje, rašeliny)											
591	smrkové smrkové s borovicí	P,N	110	30	91	2+6	5G,6G : SM8-9,OL1-2,JD,BK	SM	5G, 6G : 10 % : BK, JD,OL	10 %	--
597	olšové (březové)	N	80	20	71	2+6	0G8,0G9 : SM7-8,B01-2,(BŘ,OL,OS)0.5 4R : SM8-9,OL1-2,BŘ+1,JD 5R : SM6-7,B02-3,OL1,BŘ+1 6R : SM9-9.5,(BŘ,OL)0.5-1 7G,7T,7R : SM9.5,(JD,JŘ,BŘ)0.5		0G8, 0G9 : 5 % : BŘ,OL,JD,DB,OS 4R,5R,6R : 5% : BŘ,OL 7G,7T,7R : 5% : JD,BŘ,JŘ	5 %	
01b Mimořádně nepříznivá stanoviště - reliktní bor (0Z) ; roklínový bor (0Y) 2544 ha (pískovcové skály)											
1011	smrkové	V	150-f	∞	-	2+6	0Z : BO9-9.5,BŘ0.5-1,DB	BO	5 % : BŘ,DB,BK,JD	5%	--
1013	borové	V	150-f	∞	-	2+6	0Y1 : BO3-4,SM3-5,BK1-3,JD+1,BŘ	BO,	5 % : BK,BŘ,JD,DB	5%	
1017	březové	pN	80	30	61	2+6	0Y3 : BO7,BK2,DB1,BŘ 0Y4 : BO5,BK3,SM2,BŘ	SM			
01f Mimořádně nepříznivá stanoviště - zakrslá dubová bučina (3Z) ; skeletová dubová bučina (3Y) 626 ha 01g - zakrslá bučina (4Z) ; - zakrslá jedlová bučina (5Z), skeletová jedlová bučina (5Y) - zakrslá smrková bučina (6Z), skeletová smrková bučina (6Y) (kamenité a skalnaté svahy, hřbítky)											
4011	smrkové	V,P	150-f	∞	-	2+6	3Z,3Y,4Z : BK6-9,DB1-3,/JD,BŘ,JŘ,JV/+1	BK	30 % : BK,DB,JD,BŘ	30%	--
4013	borové	V	150-f	∞	-	2+6	5Z,5Y,6Z,6Y : SM+6,BK4-9,JV-1,JD-1,BŘ,JŘ	BK, SM	30 % : BK,JV,JD,BŘ, JŘ	30 %	
4016	bukové (dubové aj.)	V	150-f	∞	-	2+6					

4017	březové	pN	80	30	61	2+6	BK porosty obnovovat opět → BK				
01j	Mimořádně nepříznivá stanoviště - lipová javořina (3J)										88 ha
01k	(sutě)										
6011	smrkové	V,P	150-f	∞	-	2+6	3J : BK2-5,DB+-1,LP2-3,JV2-3,HB,JD,JL/+1	BK, JV	90 % : BK,JV,LP,DB, JD,HB,JS,JL	90 %	
6016	bukové (dubové a cenné listn.)	V	150-f	∞	-	2+6	5J : BK3-5,JV3-5,JD,JL,LP,JS/+2,SM	BK, JV	60 % : BK,JV,JD,JL, LP,JS	60 %	
6017	březové	pN	80	30	61	2+6					

PLO 20 - Lužická pahorkatina

Přehled základních hospodářských doporučení zastoupených HS

HS	POROSTNÍ TYP (současné porosty)	ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ					CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA - alternativy /desítky %/	zákl. dřeviny (Přil. č.4 k vyhl. č.83/96)	meliorač. a zpevňující %	sníž. % MZD	regionálně nepůvodní dřeviny %
		1	2	3	4	5					
13 Přirozená borová stanoviště : 0M, 0K, 0N • 0O 668 ha (třetihorní a čtvrtohorní šterkopísky a křídové pískovce v okrají oblasti → LO 19)											
131	smrkové	N	110	30	91	2+5	0N : SM5-7,BO1-3,BK1-2,JD+0.5,BŘ 0O : SM1-3,BO6-8,DB+-2,BŘ+-1,JD+-0.5	BO,SM	0N-10%:BK,JD,BŘ 0O-10%:DB,JD,BŘ	10%	--
133	borové	H	120	20	111	2+5	0M,0K : BO8-9.5,(BK,DB)+-2,BŘ+-0.5	BO	0M- 5 %: DB,BŘ,(BK) 0K -10 % : BK,DB,BR	5% 10%	
19 Lužní stanoviště : 2L 37 ha (niva Smědé a větších potoků)											
195	DB a tvrdé listnáče	Hp	150	30	131	2+5	DB4-6,JV1,JS2-3,LP+-1,JL-0.5,SM-0.5,OL+-1	DB	15%:LP,JV,JL,HB,DB	15%	--
29 Olšová stanoviště na podmáčených půdách : 1T, 1G, 3L • 3U 360 ha (potočiny, prameniště)											
291	smrkové	N	100	20	91	2+5	3U : SM5,JS3,JV2,BK	JS+DB	3U - 15 % : BK,DB, LP,JV,OL,JL,JD	15%	--
296	JV,JS a tvrdé listnáče	pN	90	20	81	2+5	alt.: JS5,BK3,JV2,OL,DB,LP,JL				
297	olšové (s jasanem), březové	pN	90	20	81	2+5	1T : OL5-6,BŘ2,SM2-3 • 1G : OL10, keř.vrby 3L : OL7JS3,JV,SM	OL OL,JS	1T - 70 % : OL,BŘ 1G - 70 % : OL 3L - 70 % : OL,JV	70%	
41 Exponovaná stanoviště středních poloh : a) 3K9 *, 3N * • 4N, 4S9 • 3F • 4F 261 ha b) 3A • 4A c) 3C (příkré až srázné svahy • kambizemě ± rankerové, oligotrofní až mesotrofní)											
411	smrkové (modřínové)	pN	110	30	91	2+6	a) SM(BO*)5-7,BK2-3,/LP,DB,JD/-1,MD-1	SM, BO	30 % : BK,JD,LP,DB	15%	MD 10%
413	borové	N	120	30	101	2+6					
415	dubové (BK, tvrdé listnáče)	P,pN	150	40	131	2+6	b) 3A,4A : BK 5-7,DB+-2,JV+-2,LP+-1,JD c) 3C : BK7-9,DB+-2,LP+-1,JV+-1,JD+-1	BK	30 % : BK,JD,JV,JS, JL,LP,DB		
417	březové	N	70	20	61	2+6	BK porosty obnovovat opět → BK				
43 Kyselá stanoviště středních poloh : 3M, 3K (mimo 3K9), 3I, 3S8 • 4K, 4I, 4S5 7854 ha (plošiny, mírné až střední svahy • oligotrofní kambizemě)											
431	smrkové (modřínové)	N,nH	110	30	91	2+5	SM(BO)5-7,BK2-3,,/LP,DB,JD/-1,MD-1	SM	25 % : BK,JD,LP,DB,	10%	MD 10%
433	borové	nH	110	20	101	2+5	BK porosty obnovovat opět → BK	BO			
436	bukové (DB)	P,N	150	40	131	2+6		BK			
437	březové	N,nH	70	20	61	2+5					
45 Živná stanoviště středních poloh : 3S1, 3S2, 3B, 3H, 3D • 4S1, 4B3, 4H, 4D 1155 ha (plošiny, mírné až střední svahy • mesotrofní až eutrické kambizemě)											
451	smrkové (modřínové)	N,nH	100	30	81	2+5	SM5-7,BK2-3,,/LP,DB,JD,JV/-1, JDO 0.2,MD-1	SM	25 % : BK,JD,LP,JV, JS,JL,DB,JDO	10%	MD 10% JDO 2%
456	BK (DB, tvrdé listn.)	P,N	150	40	131	2+6		BK			
457	březové	N,nH	70	20	61	2+5	BK porosty obnovovat opět → BK				
47 Oglejená stanoviště středních poloh : a) 3V, 4V • 3O b) 4O, 4P 806 ha (plošiny, velmi mírné svahy, poklesliny • oglejené až pseudoglejové kambizemě, pseudogleje)											
471	smrkové	pN,P	110	30	91	2+5	SM5-7,BK2-/LP,DB,JD/-2,MD-0.5,JDO -0.5	SM	a)25 %: BK,JD,LP,DB JV,JS,JL	10%	MD 5% JDO5%
475	DB (BK, tvrdé listn.)	P,N	150	40	131	2+6	DB por. obnovovat opět → DB + cenné list.	BK			
477	březové (olšové)	N	70	20	61	2+5		(DB)	b)25 %:BK,JD,LP,DB		
51 Exponovaná stanoviště vyšších poloh : a) 5N b) 5F, 5A 96 ha c) 5U d) 5C (kamenité svahy, oligotrofní až mezotrofní kambizemě rankerové)											
511	smrkové (modřínové)	Np	120	30	101	2+6	a) 5N : SM6-7,BK2-3,/JD,JV,+1,MD-1 b):SM5-7,BK2-3,JV1-2,/LP,JD,JL,JS/+2,MD-1	SM BK	30 % : BK,JD,JV,LP 30 % : dtto + JS,JL	15%	MD 10%
516	bukové	nP	150	40	131	2+6	c) 5U : SM+5,BK1-4,JV1-3,JS1-3,JD,JL,LP,OL	JV,JS	30 % : dtto + JL		
517	březové	N	70	20	61	2+6	d) 5C : SM 0-6,BK3-8,LP+0.5,MD-1,JV,JS,JD BK porosty obnovovat opět → BK + cenné list	SM BK	30% : BK,LP,JD,JV		
53 Kyselá stanoviště vyšších poloh : 5K, 5I 1332 ha (plošiny a mírné až střední svahy • oligotrofní kambizemě)											
531	smrkové (modřínové)	nH	120	30	101	2+5	SM6-7,BK2-3, JD-1,MD1,BO,DG-0.2	SM	25 % : BK,JD,LP	10%	MD 10% DG 2%
536	bukové	P,N	150	40	131	2+6	BK porosty obnovovat opět → BK	BK			
537	březové	N	70	20	61	2+5					
55 Živná stanoviště vyšších poloh : 5S, 5B, 5H, 5D 1622 ha (plošiny a mírné až střední svahy • oligo-mezotrofní až mezotrofní kambizemě)											
551	smrkové (modřínové)	nH	110	30	91	2+5	SM6-7,BK2-3,JD-1,JV-1,MD1,DG-0.2,JDO-0.2	SM	25 % : BK,JD,JV,JL, LP,JS,JDO	10%	MD 10% DG 2% JDO 2%
556	bukové	P,N	150	40	131	2+6	BK porosty obnovovat opět → BK + cenné list.	BK			
557	březové	N	70	20	61	2+5					

HS	POROSTNÍ TYP (současné porosty)	ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ					CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA - alternativy /desítky %/	zákl. dřeviny (Přil. č.4 k vyhl. č.83/96)	meliorač. a zpevňující % MZD	sníž. % MZD	regionálně nepůvodní dřeviny %
		1	2	3	4	5					
57 Oglejená stanoviště vyšších poloh : 5V • 5O, 5P, 6O, 6P (konkávní svahy, úžlabiny, poklesliny) 2027 ha											
571	smrkové (modřínové) smrkové s borovicí	(p)N	110 (-120)	30	91 (-101)	2+6	5O,5P,6O,6P : SM6-7.5,BK2-3,JD+-1,JDO-0.5 5P2,6P3: SM5,BO2.5,BK1,JD(O)-1, (BŘ,OS)-2	SM, BO	25 % - 5O,5P,6O,6P : BK,JD,JDO,BŘ,OS	10%	JD0 5%
577	březové (olšové)	N	70	20	61	2+6	5V : SM5-7,BK2-3,JD+-1,JV+-1,JDO-0.5	SM BK	5V : BK,JD,JDO,JV, JS,JL		
59 Podmáčená stanoviště středních a vyšších poloh : 4G • 5G, 6G • 6R • 6T (gleje, rašeliny) 826 ha											
591	smrkové smrkové s borovicí	P,N	110	30	91	2+6	4G : SM 8-8.5,/BK,JD,DB,LP,OL/1.5-2	SM SM, BO	4G: 15 % : BK,JD,DB JV,LP,OL	10%	--
597	olšové (březové)	N	80	20	71	2+6	5G,6G : SM8-9,OL1-2,JD,BK		5G, 6G : 10 % : BK, JD,OL	10%	
							6R : SM7-9.5,BŘ-0.5,JD-0.5,OL-2 6T : SM7,BO2-2.5, BŘ-0.5,JD-0.5		6R,6T : 5% : BŘ,JD	5%	
01f Mimořádně nepříznivá stanoviště - zakrslá dubová bučina (3Z) ; zakrslá bučina (4Z) - zakrslá jedlová bučina (5Z) 46 ha											
01g (kamenité a skalnaté svahy, hřbítky)											
4011	smrkové	V,P	150-f	∞	-	2+6	3Z•4Z : BK7-9,DB+-2,/JD,BŘ,JŘ,JV/+1	BK BK,SM	30 % : BK,DB,JD,BŘ	30%	--
4013	borové	V	150-f	∞	-	2+6	5Z : BK9-10,BŘ--1,SM,JD		30 % : BK,JV,JD,BŘ, JŘ	30 %	
4016	bukové (dubové aj.)	V	150-f	∞	-	2+6	BK porosty obnovovat opět → BK				
4017	březové	pN	80	30	61	2+6					
01j Mimořádně nepříznivá stanoviště - lipová javorina (3J) - suťová jl-js javorina (5J) 16 ha											
01k (sutě)											
7011	smrkové	V,P	150-f	∞	-	2+6	3J : BK2-5,DB+-1,LP2-3,JV2-3,/HB,JD,JL/+1	BK,JV	90 % : BK,JV,LP,DB, JD,HB,JS,JL	90%	--
7016	bukové (dubové a cenné listn.)	V	150-f	∞	-	2+6	5J : BK3-5,JV3-5,/JD,JL,LP,JS/+2,SM	BK,JV	60 % : BK,JV,JD,JL, LP,JS	60 %	
7017	březové	pN	80	30	61	2+6					

Vysvětlivky

- základní doporučení **1** - hospodářský způsob
- 2** - doporučené obmýty
- 3** - obnovní doba
- 4** - počátek obnovy
- 5** - doba zajištění kultur od vzniku holiny
- sníž. % MZD** - přiměřeně snížený podíl melioračních a zpevňujících dřevin pro holiny vzniklé v důsledku nahodilých těžeb (vyhl.č.85/1996, §10)

Poznámky :

- Opatření (úprava cílové druhové skladby) diferencovaná podle *funkčního zaměření a zonace* jsou uvedena v podrobných rámcových směrnici hospodaření.
- Uvedený *maximální podíl geograficky nepůvodních druhů* lesních dřevin zastoupených v cílové skladbě je platný pouze mimo CHKO. Ve všech zasahujících CHKO se připouští pouze použití modřínu, douglaska a jedle obrovská se nepřipouští. V CHKO Jizerské hory ve výše uvedených HS se připouští použití modřínu do 5 % ve 3.zóně, ve 2.zóně v uvedených HS pouze z přirozeného zmlazení. V 1.zóně, maloplošných chráněných územích a biocentrech se použití geograficky nepůvodních druhů lesních dřevin nepřipouští. V CHKO Labské pískovce se připouští použití modřínu v rozsahu uvedeném v tabulce, ale pouze ve III. a IV.zóně a jen z přirozeného zmlazení. V CHKO Lužické hory se připouští použití modřínu do 5 % v HS 43, 45, 51, 53, 55 - to se podle týká pouze 3.zóny. Ve 2.zóně se v těchto HS připouští MD pouze z přirozeného zmlazení a v 1.zóně se použití MD nepřipouští. (Toto upřesnění stanovisko dala SCHKO Lužické hory na závěrečném šetření 27.6.2000)
- Bukové porosty se doporučuje obnovovat na BK s příměsí dalších dřevin přirozené druhové skladby.
- Ve smrkových porostech s vysokým podílem cenných listnáčů (buku), nesnižovat při obnově podíl těchto dřevin (BK) pod současné zastoupení.

PLO 21 - JIZERSKÉ HORY A JEŠTĚD

Přehled základních hospodářských doporučení zastoupených HS

HS	POROSTNÍ TYP (současné porosty)	ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ					CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA - alternativy /desítky %/	zákl. dřeviny (Přil. č.4 k vyhl. č.83/96)	meliorač. a zpevňující % MZD	sníž. regionálně nepůvodní dřeviny %	
		1	2	3	4	5					
13	Přirozená borová stanoviště : 0M, 0K (pískovce v okrajích oblasti → LO 18)							23 ha			
133	borové	H	120	20	111	2+5	BO8-9.5,(BK,DB)+-2,BŘ+0.5	BO	0M- 5 % : DB,BŘ,(BK) 0K-10 % : BK,DB,BŘ	5% 10%	
29	Olšová stanoviště na podmačených půdách : 1T, 1G, 3L • 3U (potočiny, prameniště)							163 ha			
296	javoro-jasanové a tvrdé listnáče	pN	90	20	81	2+5	3U : SM5,JS3,JV2,BK alt.: JS5,BK3,JV2,OL,DB,LP,JL	JS+DB	3U - 15 % : BK,DB, LP,JV,OL,JL,JD	15%	
297	olšové (s jasanem)	pN	90	20	81	2+5	1T : OL5-6,BŘ2,SM2-3 • 1G : OL10, keř.vrby 3L : OL7JS3,JV,SM	OL OL,JS	1T - 70 % : OL,BŘ 1G - 70 % : OL 3L - 70 % : OL,JV	70%	
41	Exponovaná stanoviště středních poloh : a) 3M9 *, 3K9 *, 3N *, 3S9 • 4M9 *, 4K9 *, 4N, 4S9 • 4F b) 3A • 4B9, 4A c) 3C • 4W1, 4W4 (Příkré až srázné svahy • kambizemě ± rankerové, oligotrofní až mesotrofní, 4W - vápence)							948 ha			
411	smrkové (modřínové)	pN	110	30	91	2+6	a) SM(BO*)5-7,BK2-3,/LP,DB,JD/-1,MD-1	SM,BO	30 % : BK,JD,LP,DB	15%	MD 10%
413	borové	N	120	30	101	2+5	BK porosty obnovovat opět → BK	BK			
416	bukové (DB, tvrdé listnáče)	P,pN	150	40	131	2+6	b) 3A,4A,4B9 : BK 5-7,DB+-2,JV+-2,LP+-1,JD	BK (SM)	30 % : BK,JD,JV,JS, JL,LP		
417	březové (SMX)	N	70	20	61	2+6	c) 3C, 4W : BK7-9,DB+-2,LP+-1,JV+-1,JD+-1	BK	30 % : DB,BK,LP,JV, JS,JL,JD		
43	Kyselá stanoviště středních poloh : 3M1, 3K (mimo 3K9), 3I, 3S8 • 4M1, 4K (mimo 4K9), 4I,4S5 • 5M (plošiny, mírné až střední svahy • oligotrofní kambizemě)							4044 ha			
431	smrkové (modřínové)	N,nH	110	30	91	2+5	SM(BO)5-7,BK2-3,/LP,DB,JD/-1,MD-1(-1.5)	SM	25 % : BK,JD,LP,DB	10%	MD 15%
433	borové	nH	110	20	101	2+5	BK porosty obnovovat opět → BK	BO			VJ 2 %
436	bukové (DB)	P,N	150	40	131	2+6		BK			DG +
437	březové (SMX)	N,nH	70	20	61	2+5					
45	Živná stanoviště středních poloh : 3S2, 3B, 3H, 3D • 4S1, 4B1, 4B3, 4W2, 4W3, 4D (plošiny, mírné až střední svahy • mesotrofní až eutrické kambizemě, 4W - vápence)							416 ha			
451	smrkové (modřínové)	N,nH	100	30	81	2+5	SM5-7,BK2-3,/LP,DB,JD,JV/-1, /JDO,DG/-1,	SM	25 % : BK,JD,LP,JV, JS,JL,DB,JDO	10%	MD 20%
456	bukové (DB, tvrdé listnáče)	P,N	150	40	131	2+6	MD-1(-2) • BK porosty obnovovat opět → BK	BK			DG 5%
457	březové (SMX)	N,nH	70	20	61	2+5	4W : BK7-9, /LP,DB,JD,JV,JS/1-3,JL				JDO 5 %
47	Oglejená stanoviště středních poloh : a) 3V, 4V • 3O b) 4O (plošiny, velmi mírné svahy, poklesliny • oglejené až pseudoglejové kambizemě)							377 ha			
471	smrkové	pN,P	110	30	91	2+5	SM5-7,BK2,/LP,DB,JD/-2,MD-1	SM	a)25 %: BK,JD,LP,DB JV,JS,JL	10%	MD 10%
476	bukové (DB, tvrdé listnáče)	P,N	150	40	131	2+6	BK porosty obnovovat opět → BK + cenné list.	BK			
477	březové (SMX)	N	70	20	61	2+5		(DB)	b)25 %:BK,JD,LP,DB		
51	Exponovaná stanoviště vyšších poloh : a) 5K9, 5N, 5S9 • 6K9, 6N, 6S9 b) 5F, 5B9, 5W1, 5W4, 5A • 6F, 6A c) 5U (kamenité svahy, oligotrofní až mezotrofní kambizemě rankerové, 5W - vápence)							4888 ha			
511	smrkové (modřínové)	N	120	30	101	2+6	a):SM6-7,BK2-3,/JD,JV,/+1,MD-1(-1.5) b):SM5-7,BK2-3,JV1-2,/LP,JD,JL,JS/+2,MD-1	SM BK	30 % : BK,JD,JV,LP 30 % : dtto + JS,JL	15%	MD 15%
516	bukové	nP	150	40	131	2+6	c) 5U : SM+5,BK1-4,JV1-3,JS1-3,JD,JL,LP,OL	JV,JS	30 % : dtto + JL		
514	náhradní porosty (BŘ, JR, SMX, BOX)	N,P	20-70 40	20 ^{a)} 31	11-61 31	2+6	BK porosty obnovovat opět → BK + cenné list				
53	Kyselá stanoviště vyšších poloh : 5K (mimo 5K9), 5I • 6K (mimo 6K9) (plošiny a mírné až střední svahy • oligotrofní kambizemě a kryptopodzoly)							9840 ha			
531	smrkové (modřínové)	nH	120	30	101	2+5	5.lvs : SM6-7,BK2-3, JD-1,MD1,BO 6.lvs : SM6-7,BK3,MD-1,JD	SM BK	25 % : BK,JD,LP	10%	MD 10%
536	bukové	P,N	150	40	131	2+6	BK porosty obnovovat opět → BK				
534	náhradní porosty (BŘ, JR, SMX, BOX)	P,N	20-70 40	20 ^{a)} 31	11-61 31	2+5					
55	Živná stanoviště vyšších poloh : 5S (mimo 5S9), 5B (mimo 5B9), 5W2, 5W3, 5D • 6S (mimo 6S9) (plošiny a mírné až střední svahy • oligo-mezotrofní až mezotrofní kambizemě a kryptopodzoly)							5731 ha			
551	smrkové (modřínové)	nH	110	30	91	2+5	5.lvs : SM6-7,BK2-3,JD(O)-1,JV-1,MD1	SM	25 % : BK,JD,JV,JL, LP,JS,JDO	10%	MD 10%
556	bukové	P,N	150	40	131	2+6	6.lvs : SM6-7,BK2-3,JV-1,MD-1,JD(O)	BK			DG 5%
554	náhradní porosty (BŘ, JR, SMX, BOX)	N, (P)	20-70 40	20 ^{a)} 31	11-61 31	2+5	BK porosty obnovovat opět → BK + cenné list.				JDO 2%
57	Oglejená stanoviště vyšších poloh : 5V, 6V • 5O,6O (konkávní svahy, úžlabiny, poklesliny)							1135 ha			
571	smrkové (modřínové)	(p)N	110	30	91	2+6	5V,6V : SM5-7,BK2-3,JD(O)+-1,JV+-1,MD--1	SM	25 % 5V,6V : BK,JD,JDO, JV,JS,JL	10%	MD 10%
576	bukové	P,N	150	40	131	2+6	5O,6O : SM5-7,BK2-3,JD(O)+-1,MD--1	BK			JDO 2%
574	náhradní porosty (BŘ, JR, SMX, BOX)	P,N	20-70	20 ^{a)}	11-61	2+6	BK porosty obnovovat opět → BK + cenné list.		5O,6O : BK,JD,JDO,		

	BOX)		40	31				BŘ,OS		
59	Podmáčená stanoviště středních a vyšších poloh : 4G,5G, 6G (gleje)							336 ha		
591	smrkové	P	110	30	91	2+6	4G : SM 8-8.5,/BK,JD,DB,LP,OL/1.5-2	SM	4G: 15 % : BK,JD,DB JV,LP,OL	10% --
594	náhradní porosty (BŘ, JR, SMX, BOX)	P	20-70 40	20 ^{a)} 31	11-61 31	2+6	5G,6G : SM8-9,OL1-2,JD,BK		5G, 6G : 10 % : BK, JD,OL	10%
71	Exponovaná stanoviště horských poloh : 7K9, 7N (příkré kamenité svahy, kryptopodzoly a rankerové)							389 ha		
711	smrkové v pásnu B, C	N	120	30	101	2+6	SM6-8.5,BK1-3,JV-1,JŘ,BŘ/+1	SM	15 % : BK,JV,JŘ,(JD)	10%
9711	smrkové v pásnu A	N	100	30	81	2+7				
714	náhradní porosty (BŘ, JR, SMX, BOX, MD)	N,P	30-70 50	30 ^{a)} 31	11-51 31	2+7				
73	Kyselá stanoviště horských poloh : 7K (mimo 7K9), 7S (roviny až střední svahy • kryptopodzoly a humusové podzoly)							2142 ha		
731	smrkové v pásnu B, C	N,H	120	30	101	2+6	SM7-8.5,BK1-3,JŘ+0.5	SM	15 % : BK,JŘ,(JD)	5%
9731	smrkové v pásnu A	N,H	100	30	81	2+7				
734	náhradní porosty (BŘ, JR, SMX, BOX, MD)	P,N	30-70 50	30 ^{a)} 31	11-51 31	2+7				
77	Oglejená stanoviště horských poloh : a) 7V • b) 7O, 7P, 8V (poklesliny a konkávní - periodické /jarní/ zamokření)							564 ha		
771	smrkové v pásnu B, C, D	N	120	30	101	2+7	7O,7P : SM8-9.5,BK0.5-2,JŘ,BŘ/+1,(JD)	SM	a) 10 %	5%
9771	smrkové v pásnu A	N	100	30	81	2+8	7V, 8V : SM8-9.5,(BK,JV)0.5-2,JŘ-1,(JD)		b) 5 % : BK,JŘ,BŘ,JD	5 %
774	náhradní porosty (BŘ, JR, SMX, BOX, MD)	P,N	30-70 50	30 ^{a)} 31	11-51 31	2+8				
79	Podmáčená stanoviště horských poloh : 6T, 7T, 7G • 6R, 7R • 8G • 8T (trvale zamokřená stanoviště - gleje, glejové podzoly, rašelina - plošiny)							2361 ha		
791	smrkové v pásnu B, C, D	P,N	110	30	91	2+7	SM9-9.5,/BŘ,JŘ/0.5-1,OL-0.5	SM	5 % : BŘ,JŘ,(JD)	5%
9791	smrkové v pásnu A	N,P	100	30	81	2+8	(6R : SM8-9.5,(BŘP,JD)0.5,OL+ -1.5)			
794	náhradní porosty (BŘ, JR, SMX, BOX)	P,(N)	30-70 50	30 ^{a)} 31	11-51 31	2+8				
01f	Mimořádně nepříznivá stanoviště - zakrslá dbBK a skeletová dbBK (3Z, 3Y); zakrslá BK a skeletová BK (4Z, 4Y)							1771 ha		
01g	(kamenité a skalnaté svahy, hřbítky)									
4011	smrkové	V,P	150-f	∞	-	2+6	3Z,3Y• 4Z,4Y: BK7-9,DB+2,/JD,BŘ,JŘ,JV/+1	BK	30 % : BK,DB,JD,BŘ	30%
4016	bukové (s dubem aj.)	V	150-f	∞	-	2+6	5Z,5Y : BK9-10,BŘ-1,SM,JD	BK,SM	30 % : BK,JV,JD,BŘ,	30 %
4014	náhradní porosty (BŘ, JR, SMX, BOX)	pN	30-80 50	40 ^{a)} 31	11-61 31	2+6	6Z,6Y : SM4,BK4-5,(BŘ,JŘ)-1,JV-1,(JD) až BK8-10,(BŘ,JŘ)-2,JV-1 BK porosty obnovovat opět → BK	BK,SM	JŘ	
01h	Mimořádně nepříznivá stanoviště - zakrslá bkSM a skeletová bkSM (7Z, 7Y) (kamenité a skalnaté svahy, hřbítky)							176 ha		
5011	smrkové	V,P	150-f	∞	-	2+7	SM7-9,BK1-3,/BŘ,JŘ,JD/+1	SM	10 % : BK,BŘ,JŘ,JD	10 %
5014	náhradní porosty (BŘ, JR, SMX, BOX)	pN	30-80 50	40 ^{a)} 31	11-61 31	2+7				
01j	Mimořádně nepříznivá stanoviště - lipová javořina (3J)							39 ha		
01k	(sutě)									
7011	smrkové	V,P	150-f	∞	-	2+6	3J : BK2-5,DB+1,LP2-3,JV2-3,/HB,JD,JL/+1	BK,JV	90 % : BK,JV,LP,DB, JD,HB,JS,JL	90%
7016	bukové (s dubem aj.)	V	150-f	∞	-	2+6	5J : BK3-5,JV3-5,/JD,JL,LP,JS/+2,SM	BK,JV	60 % : BK,JV,JD,JL, LP,JS	60 %
01o	Mimořádně nepříznivá stanoviště - vrchovištní smrčina (8R)							507 ha		
01p	(vrchoviště)									
9011	smrkové, klečové	V	150-f	∞	-	2+8	8R : SM9-10,/BŘP,kleč/+1		+ - 1 % : kleč,BŘP,JR	+ -
9014	náhradní porosty (BŘ, JR, SMX, BOX)	P	30-80 50	40 ^{a)} 31	11-61 31	2+8	9R : kleč10,BŘP,SM		: BRP,JR	- 1%
02b	Vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace - kyselá smrčina (8K)							3656 ha		
02c	(táhlé hřbety)									
021	smrkové	V	150-f	∞	-	2+8	SM8.5-10,JŘ+1,(BK,JV)—1	SM	+ : BK,JŘ,BŘ,JV	+
024	náhradní porosty (BŘ, JR, SMX, BOX, MD)	P,N	30-80 50	40 ^{a)} 31	11-61 31	2+8				

Vysvětlivky

- základní doporučení
 - 1 - hospodářský způsob
 - 2 - doporučené obmýty
 - 3 - obnovní doba / * / rekonstrukční doba/

4 - počátek obnovy

5 - doba zajištění kultur od vzniku holiny

sníž. % MZD - přiměřeně snížený podíl melioračních a zpevňujících dřevin pro holiny vzniklé v důsledku nahodilých těžeb (vyhl.č.85/1996,§10)

Poznámky :

- Opatření (úprava cílové druhové skladby) diferencovaná podle *funkčního zaměření a zonace* jsou uvedena v podrobných rámcových směrnících hospodaření.
- Uvedený *maximální podíl geograficky nepůvodních druhů* lesních dřevin zastoupených v cílové skladbě je platný pouze mimo CHKO. V CHKO se přípouští ve výše uvedených HS pouze použití modřínu do 5 % ve 3.zóně, ve 2.zóně v uvedených HS pouze v těch porostech, kde zastoupení listnáčů nedosahuje 30 %. V 1.zóně, maloplošných chráněných územích a biocentrech se použití geograficky nepůvodních druhů lesních dřevin nepřipouští.
- Stanovení obmýtí pro smrkové porosty v HS 71, 73, 77, 79 není aktuální, protože porosty v potenciálním mýtném věku neexistují. Uvedené obmýtí je při horní hranici rozpětí, které uvádí *vyhláška č.83/1996 Sb.*, pro smrkové porosty poškozené imisemi. V případě příznivého vývoje zdravotního stavu smrkových porostů se doporučuje při obnově OPRL toto obmýtí zvýšit.
- Bukové porosty se doporučuje obnovovat na BK s příměsí dalších dřevin přirozené druhové skladby.
- Ve smrkových porostech s vysokým podílem cenných listnáčů (buku), nesnižovat při obnově podíl těchto dřevin (BK) pod současné zastoupení.

PLO 22 Krkonoše

Přehled základních hospodářských doporučení zastoupených HS

TAB. 9.3. PŘEHLED ZÁKLADNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH DOPORUČENÍ ZASTOUPENÝCH HS 32 189 ha

HS	POROSTNÍ TYP	Základní doporučení				SLT	Přirozená dřevinná skladba	CÍLOVÁ DŘEVINNÁ SKLADBA		MZD %	
		1	2	3	4			1.-2. zóna KRNAP	3. zóna + OP KRNAP		
LESY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ											
50	Exponovaná stanoviště vyšších poloh: a/ kyselá: 5-6N,K9,6M9; b/ živná: 5-6A,F,S9,B9 /prudké či kamenité svahy, sutě; typická-rankerová kambizem, typický-rankerový kryptopodzol, ranker/							4 814 ha - 15,0 % 14 782 ha - 14,1 %/*			
501a	smrkové	P,N	120	50	91	5N	BK 5, JD 3-4, SM 1-2, KL+1, BŘ	BK 5, JD 2, SM 2,5, KL 0,5, BŘ	SM 5, BK 4, (KL,JD) 1, BŘ, MD	30	
501b	SM /1.g.l./	N,P	100	30	81	5K9	BK 5, JD 3-4, SM 1-2, BŘ				
501c	SM /g.nevh./	N,P	100	30	81	5A	BK 5, JD 2-3, KL 2-3, LP, JL, SM	BK 5, JD 2, KL 2, SM 1, JL, LP	SM 4, BK 3, KL 2, JD 1, JL,LP, JŘ MD		
506	bukové/KL	P,N	160	50	131	5F	BK 6, JD 2-4, KL+1, SM+1				
507	listnaté	N,P	80	20	71	5S9	BK 6, JD 3-4, SM+1, KL				
						5B9	BK 6, JD 3,5, KL 0,5, LP JL SM	BK 4, SM 4, KL 1, JD 1, BŘP, JŘ	SM 6, BK 2, KL 1, JD 1, BŘP, JŘ, MD, BO		
						6N	BK 4, SM 4, JD 2, KL, JŘ				
						6K9	BK 4, SM 4, JD 2, JŘ				
						6M9	BK 4, SM 4, JD 1, BŘP 1, BO,JŘ	BK 5, SM 3, JD 1, KL 1, BŘP, JŘ	SM 5, BK 3, KL 1, JD 1, BŘP, MD		
						6A	BK 5, JD 2-3, KL 1, SM 1-2, JL				
						6F	BK 5, JD 1-3, SM 2-3, KL+1, JŘ				
						6S9	BK 4, JD 3, SM 3, KL				
52	Kyselá stanoviště vyšších poloh: 5-6K,M /svor, rula; oligotrofní kambizem, kryptopodzol, podzol/							6 136 ha - 19,0 % 16 386 ha - 18,8 %/*			
521a	smrkové	P,N	120	50	91	5K	BK 5, JD 3-4, SM 1-2	BK 5, SM 3, JD 2, KL, BŘ, JŘ	SM 6, BK 3, JD 1, BO, MD		25
521b	SM /1.g.l./	N,P,H	90	30	71	5M	BK 5, JD 3-4, SM 1-2, (BO,BŘ)+1				
521c	SM /g.nevh./	N,P,H	90	30	71	6K	BK 4, SM 4, JD 2, JŘ	BK 5, SM 4, JD 1, BŘP, JŘ	SM 6, BK 2, JD 1, (MD BO) 1, BŘP, JŘ, KL		
526	bukové/KL	P,N	150	50	121	6M	BK 3-4, SM 4, JD 1-2, BŘ 1, BO,JŘ				
54	Živná stanoviště vyšších poloh: 5-6S,D,B /svor, rula s vložkami fylitu, chloritické břidlice, krystalic. vápence; mezotrofní kambizem, kryptopodzol/							3 288 ha - 10,2 % 13 627 ha - 10,7 %/*			
541a	smrkové	N,P	110	50	81	5S	BK 5, JD 3-5, SM+1, KL+1	BK 6, JD 2, SM 1, KL 1, JL, LP, OS	SM 4, BK 3, KL 1, JD 1, MD 1, LP,OS	25	
541b	SM /1.g.l./	N,P,H	90	30	71	5B	BK 7, JD 3, KL, LP, JL, SM				
541c	SM /g.nevh./	N,P,H	90	30	71	5D	BK 5, JD 3, KL 1, (LP,JS)1, SM,JL				
546	bukové	P,N	150	40	131	6S	BK 4, SM 4, JD 2, KL	BK 5, SM 2, JD 2-3, KL+1, JL	SM 5, BK 3, JD 1, MD 1, KL, OS		
547	listnaté	N,H	80	20	71	6B	BK 5, SM 2, JD 2-3, KL+1, JL				
						6D	BK 5, SM 2, JD 2, KL 1, JL, JS				
56	Oglejená stanoviště vyšších poloh: 6P, 5-6V; 5U /plošiny občas zamokřované, úžlabiny; oglejené půdy, pseudoglejový kryptopodzol, (glej)/							16 ha - + % 1607 ha - 1,8 %/*			
561a	smrkové	N,P	110	30	91	5U	JS 2, KL 3, (BK,JL) 2, JD 1, SM 2	JS 2, KL 3, BK 2, JD 1, SM 2	JS 2, KL 3, BK 2, JD 1, SM 2		25
561b	SM /1.g.l./	N,P	90	30	71	5V	BK 4, JD 4, KL 1, (JS,JL,SM,OL) 1	BK 4, JD 3, KL 1, (JS,JL) 1, SM 1 OL, LP	SM 2, BK 4, KL 1, JD 2, (JS,JL) 1 LP, OL, OS		
567	listnaté	N	80	20	71	6V	BK 3, SM 3, JD 3, (KL,JS) 1	BK 4, JD 2, SM 3, KL 1, JS, JL,OL	SM 5, BK 3, KL 1, JD 1, JS, JL,OL		
						6P	JD 5, SM 4, BK 1, BŘP	BK 3, SM 5, JD 2, KL, BŘP,JŘ,OS	SM 6, BK 2, JD 2, KL, OS,BŘP,JŘ		
58	Podmáčená stanoviště vyšších poloh: 5V9, 6V8-9; 6G, 3L, 5L /poklesliny se stagnující vodou; aluvia, prameniště; glej, fluvizem/							79 ha - 0,2 % 1567 ha - 1,7 %/*			
581a	smrkové	N,P	110	30	91	3L2	OL 8, JS 1-2 SM +1, KL, JD	OL 8, JS 1-2 SM+1, KL, JD	OL 8, JS 1-2 SM -1, KL, JD	70	
581b	SM /1.g.l./	N	90	30	71	5L	OL 6-7,SM 1-2,JS 1-2,KL,JL,JD,BK	OL 5, SM 3, JS 2, KL, OS	OL 5, SM 3, JS 2, KL, OS		
587	listnaté	N,P	80	20	71	6G	JD 4, SM 5, OL 1, BK, KL	SM 5, JD 3, OL 2, BK, JD, KL, JS	SM 6, JD 2, OL 2, BK, JD, KL, JS		
						5V9	BK 3, JD 3-4, SM 1-2, (KL,JS,OL) 2				
						6V8/9	BK 2, SM 4, JD 3, (KL,JS,OL) 1				
70	Exponovaná stanoviště horských poloh: 7N,F,M9,K9; 8N,F,A,K9 /prudké či kamenité svahy, sutě; rankerový kryptopodzol, podzol, ranker/							3 745 ha - 11,6 % 13 251 ha - 9,6 %/*			
701a	smrkové	N,P	140	50	111	7N	SM 7, BK 2-3, JD+1, KL,BŘP,JŘ	SM 7, BK 2, JD 1, KL, BŘP, JŘ	SM 8, BK 2, JD, KL, BŘP, JŘ, MD	15	
701c	SM /g.nevh./	N,P	100	30	81	7F	SM 5,5, BK 3,5 (KL,JD) 1				
701b	SM /1.g.l./	N,P	100	30	81	7K9	SM 7, BK 2, JD 1, BŘP,JŘ				
706	bukové/KL	N,P	160	40	141	7M9	SM 7,5, BK 1,5, (BŘP,JD,JŘ) 1	SM 9, (KL,BK,JŘ) 1, BŘP	SM 9, (KL,BK,JŘ) 1, BŘP		
						8N	SM 9-10, (BK,JŘ,KL)+1, BŘP,BŘK				
						8F	SM 9, (BK,JD,KL) 1, JŘ, BŘP				
						8A	SM 8, (BK,KL) 2, JD,JŘ				
						8K9	SM 9-10, (BK,JŘ)+1, BŘP				

TAB. 9.3. PŘEHLED ZÁKLADNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH DOPORUČENÍ ZASTOUPENÝCH HS
(pokračování)

HS	POROSTNÍ TYP	Základní doporučení				SLT	Přirozená dřevinná skladba	CÍLOVÁ DŘEVINNÁ SKLADBA		MZD %
		1	2	3	4			1.-2. zóna KRMAP	3. zóna + OP KRMAP	
72 Kyselá stanoviště horských poloh: 7K,M; 8K,M /svor, rula, žula; oligotrofní kryptopodzol, podzol/								6 612 ha - 20,6 % /5 538 ha - 16,3 %/*		
721a	smrkové	P,N,H	140	50	111	7K	SM 7, BK 2,5, JD 0,5, BŘP,JŘ	SM 7, BK 2, JD 1, KL, BŘP, JŘ	SM 8, BK 2, JD, KL, BŘP, JŘ, MD	15
721c	SM /g.nevh./	H,N	100	30	81	7M	SM 7,5, BK 1,5, (BŘP,JD,JŘ) 1			
721b	SM /1.g.l./	P,N,H	100	30	81	8K	SM 9-10, (BK,JŘ)+-1, BŘP	SM 9, (BK,JŘ) 1, KL, BŘP	SM 9, JŘ 1, BK, KL, BŘP	5
						8M	SM 9, JŘ 1, BŘP			
74 Živná stanoviště horských poloh: 7S; 8S /svor, rula; kryptopodzol, humusový podzol/								187 ha - 0,6 % /234 ha - 0,7 %/*		
741a	smrkové	P,N,H	140	50	111	7S	SM 6, BK 3, JD 1, KL, JŘ	SM 7, BK 2, JD 1, KL, JŘ	SM 7, BK 2, JD 1, KL, JŘ	15
741c	SM /g.nevh./	H,N	100	30	81	8S	SM 9, (BK,KL,JD) 1, JŘ	SM 9, (BK,JD) 1, KL, JŘ	SM 9, (JD,BK) 1, KL, JŘ	
76 Oglejená stanoviště horských poloh: 7P,V; 8P /plošiny občas zamokřované, úžlabiny; pseudoglejový kryptopodzol, glejový podzol/								136 ha - 0,4 % /711 ha - 2,0 %/*		
761a	smrkové	N,P	130	40	111	7P	SM 7, JD 2-3, BK+-1, BŘP, JŘ	SM 8, JD 1, BK 1, BŘP, JŘ, KL	SM 8, JD 1, (BŘP,JŘ) 1, BK, KL	5
761c	SM /g.nevh./	N	100	30	81	7V	SM 6, BK 2, KL 1, JD 1, JS	SM 7, JD 1, BK 1 KL 1, BŘP, JŘ	SM 7, JD 1, BK 1, KL 1, JŘ, JS	
						8P	SM 9, (JD,BŘP,JŘ) 1	SM 9, (JŘ,BŘP) 1, JD	SM 9, (JR,BŘP) 1, JD	
78 Podmáčená stanoviště horských poloh: 7-8G; 7V8-9; 8V, 6R, 7R /poklesliny se stagnující vodou; glej, organozem/								1 055 ha - 3,3 % /1 097 ha - 3,2 %/*		
781a	smrkové	N,P	130	40	111	7G	SM 7, JD 2-3, OLŠ+-1, BŘP, JŘ	SM 8, JD 1, BK 1, BŘP, JŘ, KL	SM 8, JD 1, (BK,KL) 1, BŘP, JŘ	
781c	SM /g.nevh./	N	100	30	81	7V8-9	SM 6, JD 1-2, BK+-1, KL 1, OLŠ 1	SM 7, JD 1, BK 1, KL 1, BŘP, JŘ	SM 7, JD 1, BK 1, KL 1, BŘP,OLŠ	
						8V	SM 9, (KL,JD,BK) 1, JŘ	SM 9, (JD,KL) 1, BK, BŘP, JŘ	SM 9, (BK,KL) 1, BŘP, JŘ, JD	5
						6R	SM 9, (JD,OLŠ) 1	SM 9, OLŠ 1, JD	SM 9, OLŠ 1, JD	
						7R	SM 9-10, BŘP+-1, JŘ	SM 8, BŘP 1, JŘ 1	SM 9, BŘP 1, JŘ, OLŠ	
						8G	SM 9, (OLŠ,BŘP,JD) 1	SM 9, (BŘP,JŘ) 1, KL, JD, BK	SM 9, (BŘP,JŘ) 1, KL, JD, BK	
LESY OCHRANNÉ										
01 Mimořádně nepříznivá stanoviště: 5-8Y, 6-7Z, 5J; 6L /srázy, skalnaté svahy, sutě, hřbety s mělkou půdou; litozem, ranker, regozem; horský luh, fluvizem/								380 ha - 1,2 % /878 ha - 2,6 %/*		
011a	smrkové	P,V,N	140	50	121	5J	BK 3,5,JD 2,KL 3,(JS,LP,JL)1,5,SM	BK 4, JD 2-3, KL 2, (JS,JL)1, SM	BK 4, JD 2, KL 3, (JS,JL,LP)1, SM	70
011c	SM /g.nevh./	N	110	30	91	5Y	BK 7, JD 2, (SM, BŘ) 1, BO, KL			
016	bukové/KL	P-V	160	50	141	6Z	SM 4, BK 5, (BŘ, JD, JŘ) 1	BK 5, SM 3, KL 1, (BŘ,JD,JŘ) 1	SM 7, BK 3, KL, JD, BŘ, JŘ	30
014	klečové	V	200	∞	-	6Y	SM 4, BK 5, (JD, BŘ) 1, KL, JŘ			
						7Z	SM 7, BK 2, (BŘP, JŘ, JD) 1	SM 8, BK 1, (KL,BŘP,JŘ) 1	SM 8, BK 1, (KL,BŘP,JŘ) 1	10
						7Y	SM 7, BK 2, (BŘP, JŘ, JD) 1, KL			
						8Y	SM 8, JR 1, (BŘP,BK) 1, BŘK,KOS	SM 9, (BK,BŘP,KL,JŘ) 1, KOS	SM 9, (BK, BŘP, JŘ) 1, KOS, KL	5
						6L	OLS 8, SM 2, KL	OLS 8, SM 2, KL	OLS 8, SM 2, KL	70
02 Vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace: 8Z, 8R, 8T /vrchol. polohy na krystaliniku, hřbety s mělkou půdou; humus. podzol, litozem, regozem, rač. glej, organozem/								2 677 ha - 8,3 % /2 530 ha - 7,4 %/*		
021a	smrkové	P,N,H	140	50	121	8Z	SM 9, JŘ 1, BŘP, KOS, BŘK	SM 8, JŘ 2, BRK, KOS	SM 9, JŘ 1, BRK, KOS	
021c	SM /g.nevh./	N,H	110	30	91	8T	SM 8-9, BŘP+-1, JŘ+-1, KOS,BŘK	SM 7, BŘP 2, JŘ 1, KOS	SM 9, BŘP 1, JŘ, KOS	+
024	klečové	V	200	∞	-	8R	SM 9-10, (BŘK,BŘP,KOS)+-1, JŘ	SM 7, (BŘP, BŘK) 1, KOS 1, JŘ 1	SM 8, (BŘP,BŘK) 1,KOS 1,JŘ, VR	
03 Klečový vegetační stupeň: 9K,Z,Y, 9R /vrcholové polohy, skaliska a balvaniska, hřbety s mělkou půdou; humus. podzol, litozem, regozem, organozem/								3 064 ha - 9,5 % /3 754 ha - 11,1 %/*		
034a	klečové	-	-	-	-	9K	SM 5, KOS 5, BŘK, JŘO	-	-	
034c	KOS /cizí pop./	-	-	-	-	9Z	KOS, SM, JŘO, BŘK, VR	-	-	
031	smrkové	-	-	-	-	9Y	(KOS, SM, JŘO, BŘK, VR)	-	-	+
						9R	KOS, SM, JŘO, BŘK	-	-	

PLO 23 Podkrkonoší

Přehled základních hospodářských doporučení zastoupených HS

ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ PLO 23 - PODKRKONOŠÍ
ha

54 834

HS	POROSTNÍ TYP (současné porosty)	ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ 12345					CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA - alternativy (desítky %)	MELIORAČNÍ A ZPEVNŮJÍCÍ DŘEVINY (Příl. č.4 k vyhl.č.83/96)	Geografic. nepůvodní dřeviny %
13 Přirozená borová stanoviště: 0 K,M; 0P, (0T)1 520 ha 2,8%									
/kvádrové pískovce; písčité, podzolové půdy/									
133	borové	P,N,H	120	110-150	20	111	BO 9, (DB,BK,BŘ) 1, SM, MD, DBČ, VJ /0K/: DB 2-6, BO 4-8, SM BK 2-6, BO 4-8, DB, SM	5 % - DB,BK,BŘ,JŘ,JD,DBČ 0T - DB,JD,BŘ,OS	md 1-4 vj +-2 dbč 0,1
131	smrkové /nevhod./	H,N	100	80-110	20	91			
135	dubové	P,N	140	110-150	20	131			
136	bukové	P,N	140	120-150	30	121			
137	listnaté ost. /bř,ak/	N,H	70	40-80	20	61			
19 Lužní stanoviště: 1 - 2L, 1U127 ha 0,2%									
/aluvia nížin a pahorkatin, naplavená - glejová půda /									
195	dubové	H,N,P	160	130-200	30	141	DB 7, JS 2, (LP,JV,OLL,TP,HB, JL,BB) 1, SM /1U/: TP 10	15 % - DB,LP,JL,JV,HB,BB,břek - 1U + OL,VR,OS	----
191	smrkové /nevhod./	H	100	80-110	20	91			
197	listnaté /js, ol /	N	90	80-120	20	81			
198	topolové	H	40	20-40	10	31			
21 Exponovaná stanoviště nižších poloh: 2C, 3C, 2A; (3M9)65 ha 0,1%									
/hřbítky, kamenité svahy; mělčí ohrožená půda/									
213	borové /smíšené/	P,N	120	110-140	20	111	BO 6, DB(BK) 3, (LP,HB,JV,JS) 1, MD, SM /3C/: SM 2-3, BO 4-5, (DB,BK,LP,HB,JS,JV) 3 DB 4-10, BO 0-5, (BK,LP,HB,JV,JS) 0-5, SM BK 4-10, BO 0-5, (DB,LP,HB,JV,JS) 0-5, SM	30 % - DB,BK,LP,HB,BŘ,JD	md 1-3
211	smrkové /nevhodné/	N	100	80-110	30	81			
215	dubové	P,N	140	110-150	30	121			
216	bukové	P,N	140	110-150	30	121			
217	listnaté ost. /ak,bř,js/	N	70	50-90	20	61			
23 Kyselá stanoviště nižších poloh: 2 K,I,M,S; 3 - 4M; 3K5, 3I6, 3K31 030 ha 1,9%									
/chudé překryvy, pískovce, křemenec; kambizem, luvizem, podzol /									
233	borové /smíšené/	P,N,H	120	90-130	20	111	BO 7, DB 2, (BK,LP,HB,SM) 1, MD, BŘ /2S,2I/: SM 2-3, BO 4-6, /BK,LP,HB/ 3-4, BŘ DB 4-10, BO 0-6, (BK,LP,HB,SM) 0-5, BŘ BK 4-10, BO 0-6, (DB,LP,HB,SM) 0-5, BŘ	25 % - DB,BK,LP,BŘ,HB,DG,JD	md 1-4 dg +-1
231	smrkové	H,N	100	80-110	30	81			
235	dubové	P,N	140	110-150	30	121			
236	bukové	P,N	140	120-150	40	121			
237	listnaté ostatní /bř/	H,N	70	60-90	20	61			
25 Živná stanoviště nižších poloh: 1 - 2 H,B,D,O,V2 310 ha 4,2%									
/slínovce, sprašové překryvy; pararendzina, luvizem, kambizem, pseudoglej/									
255	dubové /průměr/	H,N,P	150	130-200	30	131	DB 8, (LP,BK,HB,JV,JS,JD) 2, SM,BO,MD,OL /2H/: SM 2-4, DB 4-6, (LP,BK,HB,JV,JS) 2, MD,JD /2H/: BO 2-4, DB 4-6, (LP,BK,HB,JV,JS) 2, MD,JD BK 4-10, (BO,SM) 0-3, (DB,LP,HB) 0-3, MD,JD	20 % - DB,BK,LP,HB,JV,JS, JL,JD JDO,TŘ,břek,BB	md 8-10 jdo 1-2 dg 1-4
251	smrkové /nevhodné/	H,N	90	80-90	20	81			
253	borové	H,N	110	80-120	20	101			
256	bukové	P,N	140	120-160	40	121			
257	listnaté ostatní	H,N	70	50-90	20	61			
258	topolové	H	40	20-40	10	31			
29 Olšová stanoviště podmaččených půd: 1 G,T; 3 - 5L; (3U,5U3)225 ha 0,4%									
/potoční aluvia, prameniště; glejové a naplavené půdy/									
297	olšové /jasanové/	P,N	90	80-100	20	81	OL 6, JS 2, (SM,JV) 2, DB, BŘ, LP, OS, VR OL 7-10, SM 0-3, (BŘ,JV,VR) 0-3; TP 10 /3U,5U3/: JS 3-6, JV 3-6, (OL,DB,BK,JL,LP,SM) 2	70%-1G-OL,VR; 1T-OL,BŘ; 70%-3L,5L -OL,JV 30%-5U3 - BK,LP,JV,JD,JL 15%-3U+BK,JD,LP,JL;	----
298	topolové	H	40	20-40	10	31			
41 Exponovaná stanoviště středních poloh: a/ kyselá: 3 - 4 N,K9; b/ živná: 3 - 4 A,F,S9,B9; (4C,5C)2 340 ha 4,3%									
/prudké či kamenité svahy; oligotrofní - rankerová kambizem/									
411	smrkové	P,N	110	100-130	30	91	a)SM(BO) 6, (BK,DB,LP) 3, (MD,JD,BŘ) 1 b)SM 6, (BK,DB,LP,JV)3, (MD,JS,JD,BO,HB)1 /3-4N4,K9/: BO 6, (BK,LP,DB) 3, (SM,MD) 1, BŘ /4C,3N,K9/: DB 4-10, (SM,BO) 0-6, (BK,HB,LP) 0- 2 BK 4-10, (SM,BO) 0-6, (LP,JD,JS) 0-2, JD, BŘ	30% - BK,LP,JD,DB,DG /3-4A,F,S9,B9 / + JV,JS,JL,HB	md 5-10 dg +-1
413	borové	P,N	120	110-140	30	101			
415	dubové	P,N	140	120-140	30	121			
416	bukové	P,N	140	130-160	40	121			
417	listnaté ostatní /bř/	N	80	70-90	20	71			
43 Kyselá stanoviště středních poloh: 3 - 4 K,I; 5M, 5K3, 5K613 159 ha 24,0%									
/jemnozrnné pískovce, fylit, břidlice; oligotrofní kambizem - podzol, luvizem/									

431	smrkové	P,N,H	110	100-130	40	91	SM(BO) 7, BK(DB) 2, (LP,JD,MD) 1, BŘ, DG /3K,5M,4-5K3,6/: BO 7, DB(BK) 2, (LP,SM,BŘ) 1 /3-4K,1/: DB 4-10, BO 0-6, (BK,LP,SM) 0-2, BŘ, JD BK 4-10, (SM,BO) 0-6, (LP,DB) 0-2, JD, BŘ	25 % - DB,BK,LP,JD,HB,DG	md 5-10 dg 3-5
433	borové	P,N,H	120	100-130	30	101			
435	dubové	P,N	140	110-140	30	121			
436	bukové	P,N	140	120-150	40	121			
437	listnaté ostatní /bř/	N,H	70	60-80	20	61			
45 Živná stanoviště středních poloh: 3 - 4 S,H,B,D /jemnozrné pískovce, melafýr, fylit, svor, čedič; kambizem, luvizem/								8 980 ha 16,4%	
451	smrkové	P,N,H	100	100-120	40	81	SM 7, BK(DB) 2, (LP,JV,JS,JD,MD) 1, BO,DG /3S8,4S6/: BO 1-5, SM 1-5, (BK,DB,LP) 3, JD DB 4-10, BO 0-5, (BK,JV,LP,SM) 0-2, JD BK 4-10, SM 0-5, (DB,LP,BO) 0-2, JD	25 % - BK,DB,LP,JV,JD,JS,JL, HB,TŘ,JDO	md 5-10 dg 3-5 jdo +3
453	borové	P,N,H	110	90-120	20	101			
455	dubové	P,N	140	110-180	30	121			
456	bukové	P,N	140	120-150	40	121			
457	listnaté ostatní/bř,ol/	N,H	70	50-90	20	61			
47 Oglejená stanoviště středních poloh: 4 P,O,Q; 3O; 3 - 4V; (1Q, 2P, 2Q) /plošiny občas zamokřované; oglejené půdy, pseudoglej/								680 ha 1,2%	
471	smrkové	P,N,H	110	110-130	30	91	SM 7, (JD,BK,DB,LP) 2, (JS,OL,JV,BŘ,BO,MD) 1 /2P,2Q,4Q,4P/: BO 2-5, SM 2-5, (DB,JD) 2-4 DB 3-10, (BO,SM) 0-6, (JD,LP,BK) 0-2 BK 3-10, SM 0-5, (DB,LP,BO,JD) 0-1, BŘ OL 1-6, (BO,SM) 3-5, (DB,LP,OS) 2-4	25 % -/3V,4V,3O/- JD,BK DB,JV,JS,JDO,LP,JL,HB -/4O,4P,4Q/ - JD,BK, DB,JDO,LP,OS,BŘ -/2O,2Q/- DB,BŘ,BK,JD,OS	md 5-10 dg +2
473	borové	P,N,H	110	100-130	30	91			
475	dubové	P,N	140	110-180	30	121			
476	bukové	P,N	140	120-150	40	121			
477	listnaté /olšové +bř/	N,H	70	60-80	20	61			
51 Exponovaná stanoviště vyšších poloh: a/ kyselá: 5 - 6 N,K9; b/ živná: 5 - 6 A,F,S9,B9 /prudké či kamenité svahy, sutě; kambizem - rankerová/								2 020 ha 3,7%	
511	smrkové	P,N	120	110-130	40	101	SM 6, BK 2, (JV,JD,LP,JS) 1, (MD,BO) 1, JL /5N,K9/: BO 3-4/ekotyp/,SM 2-4, (BK,LP,JV) 3, JD BK 4-10, SM 0-6, (JV,LP,JS,JL) 0-6, BO, JD	30 % - BK,JD,JV,LP,DG /5-6 A,F,S9,B9/ + JS,JL	md 4-7 dg +1
513	borové	P,N	120	110-130	30	101			
516	bukové	P,N	140	120-150	40	121			
517	listnaté ostatní /bř/	N	70	60-80	20	61			
53 Kyselá stanoviště vyšších poloh: 5 - 6 K,I /různé pískovce,fylit; oligotrofní kambizem - podzolovaná, ilimerizovaná /								11 452 ha 20,9%	
531	smrkové	P,N,H	110	100-130	40	91	SM 7, BK 2, (BO,MD,LP,JD) 1, JV, DB, DG BO 2-5/ekotyp/, SM 3-7, BK 2, MD 1, BŘ BK 4-10, SM 0-6, (LP,BO) 0-6, JD, MD, BŘ	25 % - BK,JD,LP,DG	md 3-7 dg 1-3
533	borové	H,N,P	120	100-130	30	101			
536	bukové	P,N	140	120-150	40	121			
537	listnaté ostatní /bř/	H	70	60-80	20	61			
55 Živná stanoviště vyšších poloh: 5 - 6 S,H,B,D /různé podloží a deluvia; mezotrofní - eutrofní kambizemě/								8 830 ha 16,1%	
551	smrkové	P,N,H	100	100-130	40	81	SM 7, (BK,JV) 2, (JD,LP,JS,MD) 1, DB, DG /5-6S,H/: BO 2-5/ekotyp/, SM 3-7, (BK,JD) 2, MD 1 BK 4-10, SM 0-6, (JV,JD,LP,JS,JL) 0-6, BŘ	25 % - BK,JD,LP,JS,JV,JL,JDO, TŘ	md 5-10 dg 3-5 jdo +2
553	borové	N,H	110	90-120	30	91			
556	bukové	P,N	140	120-150	40	121			
557	listnaté ostatní /bř/	N,H	70	60-80	20	61			
57 Oglejená stanoviště vyšších poloh: 5 - 6 P,O,Q,V; (7O); (5U1) /plošiny občas zamokřované; oglejené půdy, pseudoglej/								1 640 ha 3,0%	
571	smrkové	P,N,H	110	100-130	40	91	SM 7, (JD,BK,JV,JS) 2, (LP,BŘ,OL,MD) 1, DB /5-6O,P,Q/: BO 3-4/ekotyp/, SM 4, (BK,LP,BŘ)2, MD 1 BK 4-10, SM 0-6, (JV,JD,LP,JS,JL) 0-6 OL 2-5, SM 3-6, (JS,BŘ,OS) 2	25 % - /5V,6V,5U1/ - JD,BK,JV,JS,JDO,LP,JL - /5-6O,P,Q, 7O/ - JD,BK,BŘ,OS,JDO	md 3-7 jdo 3-5
573	borové	P,N,H	110	100-130	30	91			
576	bukové	P,N	140	120-150	40	121			
577	listnaté /olšové +bř/	N,H	70	60-90	20	61			
59 Podmáčená stanoviště středních a vyšších poloh: 4 - 7G; 3 - 6V9; 4R, 6R; (7R, 7T) /poklesliny se stagnující vodou; gleje, rašelinná půda/								165 ha 0,3%	
591	smrkové	P,N	100	90-120	40	81	SM 8, JD1, (DB,LP,OL,JS,JV,OS,BŘ,BK)1,BO 2 /4G,3V9/: BO 1-4/ekotyp/, SM 4-7, (JD,DB,OL,OS) /3-4V9,4G/: DB 3-10, (BO,SM) 0-7, (JD,OL,OS) 0-3 OL 2-10, SM 0-8, (JS,OS,BŘ) 0-2	20%- /4G, 3-6V9/ - JD,OL,JV, OS,BK; 3-4lvs + LP,DB 15%-/5-6G/- JD,BK,JV,OL,OS 5%- /4-7R, 7G,7T/ - BŘ,JD	----
593	borové	N	120	100-130	30	101			
595	dubové	P,N	150	130-200	30	131			
597	listnaté /olšové +bř/	N,(H)	80	60-90	20	71			
01 Mimořádně nepříznivá stanoviště: 0Z, 0Y; 3 - 6Z,Y; 3J, 5J; /srázy, skalnaté svahy, sutě, hřbety s mělkou půdou; litozem, ranker, rendzina, regozem/								290 ha 0,5%	
011	smrkové	P,N	120	120-150	40+	101	podle stanoviště - přeměna	5-90 % - podle SLT	----
013	borové /smíšené/	V,P,N	150	150<	40+	131	/0Z,Y; 3-4Z,Y/: BO 6, DB 2, BK 1, SM 1, BŘ,LP	5-30 %	
015	dubové /smíšené/	V,P,N	150	150<	40+	131	DB 5, (BK,JV,LP,BŘ,HB) 3, (SM,BO) 2	30-90 % - podle SLT	
016	bukové /smíšené/	V,P,N	150	150<	40+	131	BK 5, (JV,LP,JS,JL,DB,HB) 3, (SM,BO) 2	30-90 % - podle SLT	

PLO 24 Sudetské mezihoří

TAB.9.3. PŘEHLED ZÁKLADNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH DOPORUČENÍ HS PLO 24

20 697,30 ha

HS	POROSTNÍ TYP (současné porosty)	ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ 12345					CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA - alternativy (desítky %)	MELIORAČNÍ A ZPEVNŮJÍCÍ DŘEVINY (Příl. č.4 k vyhl.č.83/96)	Geografic. nepůvodní dřeviny %
13 Přirozená borová stanoviště: 0K, 0N /kvádrové pískovce; písčité, podzolové půdy/								263,44 ha - 1,27% (64,07 ha - 0,30%)*	
133	borové	P,N,H	120	110-150	20	111	BO 6, SM 3, (BK,BŘ) 1, MD	5 % - 0K,0M:	MD 2-5
131	smrkové	P,N,H	100	80-110	20	91	Na SLT 0K,0M: BO 9, (DB, BK, BŘ) 1, SM, MD	DB,BK,BŘ,JŘ,JD	
136	bukové	P,N	140	120-150	30	121	Na SLT 0N: BO(SM) 8, BK 2, JD, BŘ, JV	10% - /0N/: BK,BŘ,JD,DB	
137	listnaté ost. /bř/	N,H	70	40-80	20	61		15% - 3U - JV,BK,JD,LP,JL,OL,DB;	
29 Olšová stanoviště podmaččených půd: 1G, 3L, 5L; (3U,5U3) /potoční aluvia, prameniště; gleje a fluvizemě (naplavené půdy)/								124,29 ha - 0,60% (223,58 ha - 1,05 %)*	
297	olšové /jasanové/	P,N	90	80-100	20	81	OL 6, JS 2, (SM,JV) 2, DB, BŘ, LP, OS, VR /1G/: OL 7-10, SM 0-3, (BŘ,JV,VR) 0-3; /3U,5U3/: JS 3-6, JV 3-6, (OL,DB,BK,JL,LP,SM) 2	70%-1G-OL,VR; 70%-3L,5L -OL,JV 30%-5U3 - BK,LP,JV,JD,JL 15%-3U -JV,BK,JD,LP,JL,OL,DB;	-
41 Exponovaná stanoviště středních poloh: a/kyselá: 3 - 4N,K9,M9; b/živná: 3-4A,4F,S9,B9; (3-4C) /prudké či kamenité svahy; oligotrofní - rankerová kambizem/								884,58 ha - 4,27% (910,04 ha - 4,27%)*	
411a	smrkové	P,N	110	100-130	30	91	a)SM(BO) 6 BK 2, (DB,LP) 1, (MD,JD,BŘ) 1	30% - BK,LP,JD,DB	MD 5-10
411b	sm (l.g.l. + pošk. zvěří)	H,N,P	80	-	30	61	b)SM 6, BK 2, (DB,LP,JV)1, (MD,JS,JD,BO,HB)1	/3-4A,F,S9,B9 /	
413	borové	P,N	120	110-140	30	101	/3-4K9,M9/: BO 6, (BK,LP,DB) 3, (SM,MD) 1, BŘ	+ JV,JS,JL,HB	
415	dubové	P,N	140	120-140	30	121	/4C,3N,K9,M9/: DB 4-10, (SM,BO) 0-6, (BK,HB,LP) 0-2	/3-4C +břek,TŘ/	
416	bukové	P,N	140	130-160	40	121	BK 6-10, (SM,BO) 0-4, (LP,JD,JS) 0-2, BŘ, JV		
417	listnaté ostat. /bř/	N	80	70-90	20	71			
43 Kyselá stanoviště středních poloh: 3 - 4 M,K,I; (5M, 5K6, 5K3, 5K5) /křídové a permské pískovce, ryolit, odvápněná opuka; oligotrofní kambizem až podzol, luvizem/								2 190,51 ha - 10,60% (2 298,92 ha - 10,79 %)*	
431a	smrkové	P,N,H	110	100-130	30	91	SM(BO) 7, BK(DB) 2, (LP,JD,MD) 1, BŘ, DG	25 % -	MD 5-10
431b	sm. (l.g.l. + pošk. zvěří)	H,N,P	80	-	30	61		DB,BK,LP,JD,HB,DG	DG 1-4
433	borové	P,N,H	120	100-130	30	101	/3-5M,4-5K3,6/: BO 7, DB(BK) 2, (LP,SM,BŘ) 1		
435	dubové	P,N	140	110-140	30	121	/3K,I/: DB 4-10, BO 0-6, (BK,LP,SM) 0-2, BŘ, JD		
436	bukové	P,N	140	120-150	40	121	BK 4-10, (SM,BO) 0-6, (LP,DB) 0-2, JD, BŘ		
437	listnaté ostat./bř/	N,H	70	60-80	20	61			
45 Živná stanoviště středních poloh: 3 - 4S,H,B,D /břidlice, opuka, fylit, svor, granodiorit, místy rula; kambizem, luvizem/								2 187,07 ha - 10,57% (2 640,24 ha - 12,39 %)*	
451a	smrkové	P,N,H	100	100-120	30	81	SM 7, BK(DB) 2, (JD,LP,JV,JS,MD,BO) 1, DG, HB	25 % -	MD 5-10
451b	sm. (l.g.l. + pošk. zvěří)	H,N,P	80	-	30	61		BK,DB,LP,JV,JD,JS,JL,	DG 1-4
453	borové	N,H	110	90-120	20	101	/3S8,4S6/: BO 1-5, SM 1-5, (BK,DB,LP) 3, JD	HB,TŘ	
455	dubové	P,N,H	140	110-180	30	121	DB 4-10, BO 0-5, (BK,JV,LP,SM) 0-2, JD		
456	bukové	P,N	140	120-150	40	121	BK 4-10, SM 0-5, (DB,LP,BO) 0-2, JD		
457	listnaté ost. /bř,ol/	N,H	70	50-90	20	61			
47 Oglejená stanoviště středních poloh: 4O, 4P, 3V, 4V /plošiny občas zamokřované; oglejené půdy, pseudoglej/								73,17 ha - 0,35% (106,60 ha - 0,50 %)*	
471	smrkové	P,N,H	100	100-130	30	81	SM 7, (JD,BK,DB,LP) 2, (JS,OL,JV,BŘ,BO,MD)1, JDO	25 % -/3V,4V/- JD,BK	MD 5-10
473	borové	P,N,H	110	100-130	30	91	Na SLT 4P: BO 2-5, SM 2-5, (DB, JD) 2-4	DB,JV,JS,JDO,LP,JL,HB	DG 1-4
475	dubové	P,N	140	110-180	30	121	DB 3-10, (BO,SM) 0-6, (JD,LP,BK) 0-2	-/4O,4P/- JD,BK,	JDO+3
476	bukové	P,N	140	120-150	40	121	BK 3-10, SM 0-5, (DB,LP,BO,JD) 0-1	DB,JDO,LP,OS,BŘ	
477	listnaté /ol +bř/	N,H	70	60-80	20	61	U por. olšových: OL 1-6, (BO,SM) 3-5, (DB,LP,OS) 2-4		
51 Exponovaná stanoviště vyšších poloh: a/ kyselá: 5 - 6 N,K9,M9; b/ živná: 5-6A,F,S9,B9; 5C /prudké či kamenité svahy, sutě; rankerová kambizem /								3 457,42 ha - 16,70% (3 473,55 ha - 16,31 %)*	
511a	smrkové	P,N	120	110-130	30	101	SM 6, BK 2, (JV,JD,LP,JS) 1, (MD,BO) 1, JL	30 % - BK,JD,JV,LP	MD 5-10
511b	sm (l.g.l. + pošk. zvěří)	H,N,P	80	-	30	61		/5-6 A,F,S9,B9/ + JS,JL	
513	borové	P,N	120	110-130	30	101	/5N,K9/: BO 3-4/ekotyp/, SM 2-4, (BK,LP,JV) 3, JD		
516	bukové	P,N	140	120-150	40	121	BK 6-10, SM 0-4, (JV,LP,JS,JL) 0-3, BO, JD		
517	listnaté ostat. /bř/	N	70	60+80	20	61			
53 Kyselá stanoviště vyšších poloh: 5-6K,I; 6M /ryolit, permský a kvádrový pískovec; oligotrofní kambizem, podzol, luvizem/								5 314,44 ha - 25,68% (5 043,18 ha - 23,68 %)*	
531a	smrkové	P,N,H	110	100-130	40	91	SM 7, BK 2, (BO,MD,JD) 1, JV, LP, DG	25 % - BK,JD,LP,DG	MD 5-10
531b	sm. (l.g.l. + pošk. zvěří)	N,H,P	80	-	30	61			DG 1-4

533	borové	H,N,P	120	100-130	30	101	BO 2-5/ekotyp/, SM 3-7, BK 2, MD 1 BK 6-10, SM 0-4, (LP,BO,MD,JD) 0-2				
536	bukové	P,N	140	120-150	40	121					
537	listnaté ostat. /bř/	N,H	70	60-80	20	61					
55 Živná stanoviště vyšších poloh: 5-6S,H,D,B; /andezit, opuka, permský prachovec; mezotrofní kambizem, kryptopodzol/							4 262,56 ha - 20,59% (4 104,79 ha - 19,27 %)				
551a	smrkové	P,N,H	100	100-130	30	81	SM 7, BK 2, (JD, JV, LP,JS,MD) 1, DB, DG, JDO /5S,H/: BO 2-5/ekotyp/, SM 3-7, (BK,LP) 3, MD 1 BK 6-10, SM 0-4, (JV,JD,LP,JS,JL) 0-3			25 % - BK,JD,LP,JS,JV,JL,JDO, TR	MD 5-10 DG 1-4 JDO+3
551b	sm. (l.g.l. + pošk. zvěří)	N,H,P	80	-	30	61					
553	borové	N,H	110	90-120	30	91					
556	bukové	P,N	140	120-150	40	121					
557	listnaté ostat. /bř/	N,H	70	60-80	20	61					
57 Oglejená stanoviště vyšších poloh: 5-6P,O,V; 7V, (5U1) /plošiny občas zamokřované; oglejené půdy, pseudoglej/							434,60 ha - 2,10% (901,98 ha - 4,23 %)				
571a	smrkové	P,N,H	100	100-130	30	81	SM 7, JD 1, (BK,JV,JS) 1, (LP,BŘ,OL,MD) 1, JDO /5-6O,P/: BO 3-4/ekotyp/, SM 1-5, (BK,LP)2, MD 1 BK 4-10, SM 0-6, (JV,JD,LP,JS,JL) 0-3 OL 2-5, SM 3-6, (JS,BŘ,OS) 1-2	25 % - /5V,5U1/ - JD,BK,JV,JS,JDO,LP,JL - /5-6O,P/ - JD,BK,BŘ,OS,JDO	MD 5-10 DG 1-4 JDO+3		
571b	sm. (l.g.l. + pošk. zvěří)	P,N,H	80	-	30	61					
573	borové	P,N,H	110	100-130	30	91					
576	bukové	P,N	140	120-150	40	121					
577	listnaté /ol +bř/	N,H	70	60-90	20	61					
59 Podmáčená stanoviště středních a vyšších poloh: 5- 6G; 5 - 6V9; 6R; 7R (7T) /poklesliny se stagnující vodou; glej, organozem (rašelinná půda)/							144,49 ha - 0,70% (171,02 ha - 0,80 %)				
591	smrkové	P,N	100	90-120	40	81	SM 8, JD1, (LP,OL,JS,JV,OS,BŘ,BK)1, BO, DB OL 2-10, SM 0-8, (JS,OS,BŘ) 0-2	20%-/5-6V9/-JD,OL,JV, OS,BK; 15%-/5-6G/-JD,BK,JV,OL,OS 5%- /6-7R,7T/ - BŘ,JD,JŘ	-		
593	borové	N,(P)	120	100-130	30	101					
595	dubové	P,N	150	130-200	30	131					
597	listnaté /ol +bř/	N	80	60-90	20	71					
01 Mimořádně nepříznivá stanoviště: 0Z, 0Y; 5-7Y; 5-6Z; 3J, 5J; (0N1) /srázy, skalnaté svahy, sutě, hřbety s mělkou půdou; litozem, ranker, rendzina, regozem, podzol/							1 360,73ha - 6,57% (1 368,93 ha - 6,43 %)				
011	smrkové	P,N	120	120-150	40+	101	SLT: /0Z/: BO 8, (SM,BŘ) 2 BK /0Y,0N/: BO 4, SM 3, BK 1, BŘ 2, JD /5-6Z,Y/: SM 6, BO 1, BK 2, (JD,BŘ,MD,LP,JV) 1 /3J/: BK 5, JV 3, (LP,JS,JL,DB,HB) 2 SM /5J/: BK 5 JV 3 (JD,SM,JS,JL,LP) 2	SLT: 5% -/0Z,0Y,0N/: BK,BŘ,DB,JD 30% -/5-6Y,Z/: BK,JD,JV,BŘ,JŘ 90% -/3J/:BK,DB,JV,LP,JL,JS, HB,BB,TS,břek,muk 60% -/5J/: BK,JD,JV,JL,LP,JS	-		
013	borové /smíšené/	V,P,N	150	150<	40+	131					
015	dubové /smíšené/	V,P,N	150	150<	40+	131					
016	bukové /smíšené/	V,P,N	150	150<	40+	131					
017	listnaté /březové/	V,P,N	90	150<	20+	81					

PLO 25 Orlické hory

TAB. 9.3. PŘEHLED ZÁKLADNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH DOPORUČENÍ V HS 22 112 ha (lesní pozemky)

HS	POROSTNÍ TYP (současné porosty)	ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ 12345					CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA - alternativy (desítky %)	MELIORAČNÍ A ZPEVNŮJÍCÍ DŘEVINY (Příl. č.4 k vyhl.č.83/96)	Geografic. nepůvodní dřeviny %
LESY HOSPODÁŘSKÉ									
29	Olšová stanoviště podmačených půd: 3L, 5L; 5U /aluvia, prameniště; fluvizem, glej/						181 ha - 0,8 %		
297	olšové+ostatní/bř/	N	90	80-100	20	81	OL 6, JS 2, (SM, JV) 2, OS, JL 5U: OL 3,JV 3,JS 2,SM 2,JD,JL	70%-3L, 5L: OL,JV 30%-5U:BK,JL,LP,JV,JD	----
51	Exponovaná stanoviště vyšších poloh: a/ kyselá: 5 - 6N,K9; b/ živná: 5 - 6A,F,S9,B9 /prudké či kamenité svahy, sutě; rankerová kambizem, rankerový kryptopodzol/						1 060 ha - 4,8 %		
511a	smrkové	P,N	120	110-130	40	101	SM 6, BK 2, (JV,JD,LP,JS) 1, (MD,BO) 1 /5N,K9/: BO 3-4/ekotyp/,SM 2-4, (BK,LP,JV) 3 BK 4-10, SM 0-6, (JV,LP,JS,JL) 0-6, BO, JD	30 %: BK,JD,JV,LP,DG /5-6 A,F,S9,B9/: + JS,JL	MD 5-10 DG +1
511b	smrkové /l.gen.lesa/	N,P	80		40	61			
513	borové	N	120	110-130	30	101			
516	bukové	P,N	150	140-160	40	131			
517	listnaté ostatní/bř/	N	70	60-80	20	61			
53	Kyselá stanoviště vyšších poloh: 5 - 6K,I /svor, rula; oligotrofní kambizem, kryptopodzol, podzol, luvizem/						8 904 ha - 40,3 %		
531a	smrkové	P,N,H	110	100-130	40	91	SM 7, BK 2, (BO,MD,LP,JD) 1, JV,DB,DG BO 2-5/ekotyp/, SM 2-5, BK 2, MD 1, BŘ BK 4-10, SM 0-6, (LP,BO) 0-6, JD, MD, BŘ	25 % : BK,JD,LP,DG	MD 5-10 DG 1- 5
531b	smrkové /l.gen.lesa/	H,N,P	80		40	61			
531c	smrkové /gen.nevh./	H	90		30	71			
533	borové	H,N,P	120	100-130	30	101			
536	bukové	P,N	140	120-150	40	121			
537	listnaté ostatní/bř/	H	70	60-80	20	61			
55	Živná stanoviště vyšších poloh: 5 - 6S,H,D,B /svor, rula s vložkami fylitů, amfibolity; deluvia, mezotrofní a eutrofní kambizem, kryptopodzol/						5 107 ha - 23,1 %		
551a	smrkové	P,N,H	100	100-130	40	81	SM 7, (BK,JV) 2, (JD,LP,JS,MD) 1, DB,DG BK 4-10, SM 0-6, (JV,JD,LP,JS,JL) 0-6, DG	25 %: BK,JD,LP,JV,JL, JS,JDO,TŘ	MD 5-10 DG 1- 5 JDO 1- 5
551b	smrkové /l.gen.lesa/	P,N,H	80	70-110	40	61			
551c	smrkové /gen.nevh./	H	90		30	71			
556	bukové	P,N	140	120-150	40	121			
557	listnaté ostatní/bř/	N,H	70	60-80	20	61			
57	Oglejená stanoviště vyšších poloh: 5 - 6P,V,6O /plošiny občas zamokřované; oglejené půdy, pseudoglej, glejový kryptopodzol/						1 934 ha - 8,7 %		
571a	smrkové	P,N,H	110	100-130	40	91	SM 7, (JD,BK,JV,JS) 2, (LP,BŘ,OL,MD) 1 BK 4-8, SM 2-6, (JV,JD,LP,JS,JL) 0-4 OL 2-5, SM 3-6, (JS,BŘ,OS) 2	25 % - 5V,6V: BK,JD,JV,JS,JL,LP,JDO 5-6P,6O: JD,BK,BŘ,OS,JDO	MD 5-10 JDO 1- 5
571b	smrkové /l.gen.lesa/	P,N,H	80		30	61			
571c	smrkové /gen.nevh./	N,H	80		20	71			
576	bukové	P,N	150	120-150	40	131			
577	listnaté /ol,bř/	N,H	70	60-90	20	61			
59	Podmačená stanoviště vyšších poloh: 5- 6G, 5 - 6V9, 6R /poklesliny se stagnující vodou; glej, organozem/						390 ha - 1,7 %		
591a	smrkové	P,N	100	90-120	40	81	SM 8, JD 1, (OL,JS,JV,OS,BŘ,BK) 1 OL 2-10, SM 0-8, (JS,OS,BŘ) 0-2	15 % - 5G: BK,JD,OL,JV,OS 20 % - 5-6V9;6G: -"- 5% - 6R: BŘ,JŘ,JD	----
591b	smrkové /gen.nevh./	N,H	80		20	71			
597	listnaté /ol,bř/	N,(H)	80	60-90	20	71			
71	Exponovaná stanoviště horských poloh: 7N,F,K9 /prudké či kamenité svahy, sutě; rankerový kryptopodzol/						325 ha - 1,5 %		
711a	smrkové	P,N	140	110-150	40	121	SM 8, BK 1, (JV, JŘ, JD) 1, MD, JL BK 4-9, SM 1-6, JV 0-6, JD	15 %: BK,JD,JV,JŘ	MD +-1
711b	smrkové /gen.nevh./	N,H	90	80-100	30	71			
716	bukové	P,N	160	140-160	40	141			
73	Kyselá stanoviště horských poloh: 7K, 7S /svor; rula; kryptopodzol, podzol/						2 339 ha - 10,6 %		
731a	smrkové	P,N,H	130	110-150	40	111	SM 8, BK 2, JŘ, JV, JD, MD BK 4-9, SM 1-6, (JD,JV) 0-4	15 %: BK,JD,JŘ 7S: +JV	MD +-1
731b	smrkové /gen.nevh./	N,H	90	80-100	30	71			
736	bukové	P,N	160	140-160	40	141			
77	Oglejená stanoviště horských poloh: 7P,7V /plošiny občas zamokřované; pseudoglej, glejový podzol, pseudoglejový kryptopodzol/						703 ha - 3,2 %		
771a	smrkové	P,N,H	120	110-150	40	101	SM 9, (JD, BK, JV, JŘ, BŘP, OLŠ) 1 OL 2-5, SM 5-8, BŘP 0 - 1	10 % : JD,BK,JV,BŘP,JŘ	MD +
771b	smrkové /gen.nevh./	N,H	90	80-100	30	71			
777	listnaté /ol,bř/	N,H	80	60-90	20	71			

79 Podmáčená stanoviště horských poloh: 7R, 7T, 7G, 7V9 <i>/poklesliny se stagnující vodou; glej, organozem /</i>								172 ha - 0,8 %	
791a	smrkové	P,N	120	100-140	40	101	SM 9, (JD, JŘ, BŘP,OL) 1 OL 2-5, SM 4-7, BŘP 1, OS	5 %: BŘP,JD,JŘ	----
791b	smrkové /gen.nevh./	N	90	80-100	30	71			
797	listnaté /ol,bř/	N,(H)	90	60-90	20	81			

LESY OCHRANNÉ

01 Mimořádně nepříznivá stanoviště: 5 - 6Z,Y, 7Y, 5J, 6L								110 ha - 0,5 %	
/srázy, skalnaté svahy, sutě, hřbety s mělkou půdou; litozem, ranker, regozem; horský luh; fluvizem/									
011	smrkové	P,N	150	150 <	40+	131	podle stanoviště	10 %-7Y: BK,JD,BŘ,JŘ	----
016	bukové/smíšené/	V,P,N	160	150 <	40+	141	BK 6, (JV,LP,JS,JL) 2, (SM,JD) 2	30 %-5-6Y: BK,JV,JD,BŘ,JŘ	
017	listnaté ost. /ol,bř/	N	90		20	81	6L: OLŠ 8, (JS,OL) 2, JV	60 %-5J: BK,JV,JD,JL,LP,JS 70 %-6L: OLŠ,BK,JV,JS,OL,JD	
02 Lesy na exponovaných hřebenech: 7 - 8Z; 8R, 8T; 7K0								884 ha - 4,0 %	
/vrcholové polohy na krystaliniku, hřbety s mělkou půdou; humusový podzol, kryptopodzol, litozem, regozem/									
021a	smrkové	N,P	140	150 <	40+	121	SM 9, (JŘ,BK,BŘP,JV) 1, KOS BK 1-6, SM 4-9, JV, JŘ, BŘP /KOS - pouze přípravná dřevina pro SM/	+ % -8Z: BK,JŘ,JV,BŘP	----
021b	smrkové /gen.nevh./	N,H	100	100-130	30	81		1-5 %-8R: KOS,BŘP,JŘ	
024	klečové	--	--	--	--	--		5 %-8T: +JD 10 %-7Z,7K0: +JD	

PLO 26 Předhoří Orlických hor

TAB. 9.3. PŘEHLED ZÁKLADNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH DOPORUČENÍ CHS 22 157 ha (porostní plocha)

HS	POROSTNÍ TYP (současné porosty)	ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ 12345					CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA - alternativy (desítky %)	MELIORAČNÍ A ZPEVNŮJÍCÍ DŘEVINY (Příl. č.4 k vyhl.č.83/96)	Geografic. nepůvodní dřeviny %
19 Lužní stanoviště: 1 - 2L /aluvia nížin a pahorkatin, fluvizemě - glejová půda /								40 ha - 0,2 %	
195	dubové	H,N,P	160	130-200	30	141	DB 7, JS 2, (LP,JV,OL,TP,HB, JL) 1, SM	15 % - DB,LP,JL,JV,HB,BB,břek	-
191	smrkové /nevhod./	H	90	80-110	20	81			
197	listnaté /js, ol /	N,H	90	80-120	20	81			
198	topolové	H	40	20-40	10	31			
21 Exponovaná stanoviště nižších poloh: 2 - 3C, 2A,B9,S9 /hrbítky, kamenité svahy; mělčí ohrožená půda/								54 ha - 0,3 %	
213	borové /smíšené/	P,N	120	110-140	20	111	BO 6, DB(BK) 3, (LP,HB,JV,JS) 1, MD, SM /3C/: SM 2-3, BO 4-5, (DB,BK,LP,HB,JS,JV) 3 DB 4-10, BO 0-5, (BK,LP,HB,JV,JS) 0-3, SM BK 4-10, BO 0-5, (DB,LP,HB,JV,JS) 0-3, SM	30 % - DB,BK,LP,HB,BŘ,JD	MD 3-5
211	smrkové /nevhodné/	N	100	80-110	30	81			
215	dubové	P,N	140	110-150	30	121			
216	bukové	P,N	140	110-150	30	121			
217	listnaté ost. /ak,bř,js/	A	70	50-90	20	61			
23 Kyselá stanoviště nižších poloh: 2I,K,S; 2 - 4M; 3I5, 3K3, 3K5 /chudé překryvy, písčovce, křemenec; kambizem, luvizem, podzol/								467 ha - 2,1 %	
233	borové /smíšené/	P,N,H	120	90-130	20	111	BO 7, DB 2, (BK,LP,HB,SM) 1, MD, BŘ /2S,2I,3I5,3K /: SM 2-3, BO 4-6, /BK,LP,HB/ 2-3, BŘ DB 4-10, BO 0-6, (BK,LP,HB,SM) 0-3, BŘ BK 4-10, BO 0-6, (DB,LP,HB,SM) 0-3, BŘ	25 % - DB,BK,LP,BŘ,HB,DG,JD	MD 5-10 DG +1
231	smrkové	H,N	100	80-110	30	81			
235	dubové	P,N	140	110-150	30	121			
236	bukové	P,N	140	120-150	40	121			
237	listnaté ostatní /bř/	H,N	70	60-90	20	61			
25 Živná stanoviště nižších poloh: 1 - 2D,O,V; 2B, 2H /opuky, slínovce, sprašové překryvy; pararendzina, luvizem, kambizem, pseudoglej/								1 429 ha - 6,5 %	
255	dubové /průměr/	H,P,N	150	130-200	30	131	DB 8, (LP,BK,HB,JV,JS,JD) 2, SM, BO, OL /2H,2O/: SM 2-4, DB 4-6, (LP,BK,HB,JV,JS) 0-2, JD /2H/: BO 2-4, DB 4-6, (LP,BK,HB,JV,JS) 0-2, JD BK 4-10, (BO,SM) 0-3, (DB,LP,HB) 0-2, JD	20 % - DB,BK,LP,HB,JV,JS, JL,JD JDO,TŘ,břek,BB	MD 3-5 DG +1
251	smrkové /nevhodné/	H,N	90	80-90	20	81			
253	borové	H,N	110	80-120	20	101			
256	bukové	P,N	140	120-160	40	121			
257	listnaté ostatní	H,N	70	50-90	20	61			
258	topolové	H	40	20-40	10	31			
27 Oglejená chudá stanoviště nižších a středních poloh: 2P, 2Q, 3P, 4Q, 5Q /šterkopisky, diluviální hlíny; podzolové pseudogleje, glejové podzoly/								178 ha - 0,8 %	
273	borové	P,N,H	110	110-130	30	91	BO 7, (DB,BK) 2, (SM,JD,BŘ) 1, MD, VJ SM 2-4, (DB,JD,BK) 2, BO 4-6, BŘ DB 4-10, BO 0-4, (SM,LP,JD) 0-2, BŘ BK 4-10, (BO,SM) 0-4, (DB,LP) 0-2	20 % - DB,BŘ,JD,OS,BK	MD 5-10 DB +1 JDO +1
271	smrkové	P,N,H	100	80-110	20	91			
275	dubové /kvalitní /	P,N,H	140	110-140	30	121			
276	bukové	P,N	140	120-150	30	121			
277	listnaté /bř,os,ol/	N,H	70	60-90	20	61			
29 Olšová stanoviště podmaččených půd: 1G, 3L, 3U, 5L; 5U3 /potoční aluvia, prameniště; glejové půdy a fluvizemě/								100 ha - 0,5 %	
297	olšové /jasanové/	P,N	90	80-100	20	81	OL 6, JS 2, (SM,JV) 2, DB, BŘ, LP, OS, VR OL 7-10, SM 0-3, (BŘ,JV,VR) 0-3; TP 10 /3U,5U3/: JS 3-6, JV 3-6, (OL,DB,BK,JL,LP,SM) 2	/1G/:70%--OL,VR; /3L,5L/:70%--OL,JV /5U3/:30%-- BK,LP,JV,JD,JL /3U/:15%+BK,JD,LP,JL;	-
298	topolové	H	40	20-40	10	31			
41 Exponovaná stanoviště středních poloh: a/ kyselá: 3 - 4N,K9; b/ živná: 3 - 4A,F,B9,S9; 4C; /prudké či kamenité svahy; oligotrofní - rankerová kambizem/								1 996 ha - 9,0 %	
411	smrkové	P,N	110	100-130	30	91	a)SM(BO) 6, (BK,DB,LP) 3, (MD,JD,BŘ) 1 b)SM 6, (BK,DB,LP,JV)3, (MD,JS,JD,BO,HB)1 /3-4N4,K9/: BO 6, (BK,LP,DB) 3, (SM,MD) 1, BŘ /4C,3N,K9/: DB 4-10, (SM,BO) 0-6, (BK,HB,LP) 0-2 BK 4-10, (SM,BO) 0-6, (LP,JD,JS) 0-2, JD, BŘ	30% - BK,LP,JD,DB,DG /3-4A,F,S9,B9 / + JV,JS,JL,HB /4C/ + TŘ, břek	MD 1-5 DG 1-3
	sm. (I.generace lesa)	N	90	-	30	71			
413	borové	P,N	120	110-140	30	101			
415	dubové	P,N	140	120-140	30	121			
416	bukové	P,N	140	130-160	40	121			
417	listnaté ostatní /bř/	N	80	70-90	20	71			
43 Kyselá stanoviště středních poloh: 3 - 4K,I; 5M; 5K6, 5K3 /jemnozrnné písčovce, odvápněná opuka, rula,fylit,žula; oligotrofní kambizem až podzol, luvizem/								3 516 ha - 15,9 %	
431	smrkové	P,N,H	110	100-130	40	91	SM(BO) 7, BK(DB) 2, (LP,JD,MD) 1, BŘ, DG /3K,5M,4-5K3,6/: BO 7, DB(BK) 2, (LP,SM,BŘ) 1 /3-4K,I /: DB 4-10, BO 0-6, (BK,LP,SM) 0-2, BŘ, JD	25 % - DB,BK,LP,JD,HB,DG	MD 5-10 DG 1-5
	sm. (I.generace lesa)	H,N	90	-	30	71			
433	borové	P,N,H	120	100-130	30	101			
435	dubové	P,N	140	110-140	30	121			

436	bukové	P,N	140	120-150	40	121	BK 4-10, (SM,BO) 0-6, (LP,DB) 0-2, JD, BŘ				
437	listnaté ostatní /bř/	N,H	70	60-80	20	61					
45 Živná stanoviště středních poloh: 3 - 4S,H,B,D /břidlice, opuka, fylit, svor, granodiorit, místy rula; kambizem, luvizem/							5 210 ha - 23,5 %				
451	smrkové	P,N,H	100	100-120	30	81	SM 7, BK(DB) 2, (LP,JV,JS,JD,MD) 1, BO,DG /3S8,4S6/: BO 1-5, SM 1-5, (BK,DB,LP) 3, JD DB 4-10, BO 0-5, (BK,JV,LP,SM) 0-2, JD BK 4-10, SM 0-5, (DB,LP,BO) 0-2, JD			25 % - BK,DB,LP,JV,JD,JS,JL, HB,TR,JDO	MD 5-10 DG 3-5 JDO +1
	sm. (I.generace lesa)	H,N,P	80	-	30	61					
453	borové	P,N,H	110	90-120	20	101					
455	dubové	P,N	140	110-180	30	121					
456	bukové	P,N	140	120-150	40	121					
457	listnaté ostatní/bř,ol/	N,H	70	50-90	20	61					
47 Oglejená stanoviště středních poloh: 4P,3 - 4O, 3 - 4V /plošiny občas zamokřované; oglejené půdy, pseudoglej/							875 ha - 4,0 %				
471	smrkové	P,N,H	100	100-130	30	81	SM 7, (JD,BK,DB,LP) 2, (JS,OL,JV,BŘ,BO,MD) 1 /4P/: BO 2-5, SM 2-5, (DB,JD) 2-4 DB 3-10, (BO,SM) 0-6, (JD,LP,BK) 0-2 BK 3-10, SM 0-5, (DB,LP,BO,JD) 0-1 OL 1-6, (BO,SM) 3-5, (DB,LP,OS) 2-4	25 % -/3V,4V,3O/- JD,BK DB,JV,JS,JDO,LP,JL,HB -/4O,4P/ - JD,BK, DB,JDO,LP,OS,BŘ	MD 5-10 DG +1 JDO 1-2		
473	borové	P,N,H	110	100-130	30	91					
475	dubové	P,N	140	110-180	30	121					
476	bukové	P,N	140	120-150	40	121					
477	listnaté /olšové +bř/	N,H	70	60-80	20	61					
51 Exponovaná stanoviště vyšších poloh: a/ kyselá: 5 - 6 N, 5K9, b/ živná: 5A, 5F, 5S9,5B9 /prudké či kamenité svahy, sutě; kambizem rankerová/							1 626 ha - 7,3 %				
511	smrkové	P,N	120	100-130	30	101	SM 6, BK 2, (JV,JD,LP,JS) 1, (MD,BO) 1, JL /5N,K9/: BO 3-4/ekotyp/, SM 2-4, (BK,LP,JV) 3, JD BK 4-10, SM 0-6, (JV,LP,JS,JL) 0-3, BO, JD	30 % - BK,JD,JV,LP,DG /5A,F,S9,B9/ + JS,JL	MD 5-10 DG +1		
	sm. (I.generace lesa)	N,H,P	90	-	30	71					
513	borové	P,N	120	110-130	30	101					
516	bukové	P,N	140	120-150	40	121					
517	listnaté ostatní /bř/	N	70	60-80	20	61					
53 Kyselá stanoviště vyšších poloh: 5 - 6K, 5I /fylit, svor, rula, oligotrofní kambizem, podzol, luvizem/							2 598 ha - 11,7 %				
531	smrkové	P,N,H	110	100-130	40	91	SM 7, BK 2, (BO,MD,LP,JD) 1, JV, DB, DG BO 2-5/ekotyp/, SM 3-7, BK 2, (LP,MD) 1 BK 4-10, SM 0-6, (LP,BO,MD,JD) 0-2	25 % - BK,JD,LP,DG	MD 5-10 DG 1-4 JDO +1		
	sm. (I.generace lesa)	N,H,P	90	-	30	71					
533	borové	H,N	120	100-130	30	101					
536	bukové	P,N	140	120-150	40	121					
537	listnaté ostatní /bř/	H	70	60-80	20	61					
55 Živná stanoviště vyšších poloh: 5S,H,D,B; 6S /svor, rula s vložkami fylitů, amfibolitu, granodiorit; mezotrofní kambizem, kryptopodzol/							2 866 ha - 12,9 %				
551	smrkové	P,N,H	100	100-130	30	81	SM 7, (BK,JV) 2, (JD,LP,JS,MD) 1, DB, DG /5-6S,H/: BO 2-5/ekotyp/, SM 3-7, (BK,LP) 3, MD 1 BK 4-10, SM 0-6, (JV,JD,LP,JS,JL) 0-3	25 % - BK,JD,LP,JS,JV,JL,JDO, TR	MD 5-10 DG 3-5 JDO +2		
	sm. (I.generace lesa)	N,H,P	80	-	30	61					
553	borové	N,H	110	90-120	30	91					
556	bukové	P,N	140	120-150	40	121					
557	listnaté ostatní /bř/	N,H	70	60-80	20	61					
57 Oglejená stanoviště vyšších poloh: 5P,O,V; 6P,O; 5U1 /plošiny občas zamokřované; oglejené půdy, pseudoglej/							963 ha - 4,3 %				
571	smrkové	P,N,H	100	100-130	30	81	SM 7, (JD,BK,JV,JS) 2, (LP,BŘ,OL,MD) 1, DB /5-6P/: BO 3-4/ekotyp/, SM 1-5, (BK,LP)2, MD 1 BK 4-10, SM 0-6, (JV,JD,LP,JS,JL) 0-3 OL 2-5, SM 3-6, (JS,BŘ,OS) 1-2	25 % - /5V,5U1/ - JD,BK,JV,JS,JDO,LP,JL - /5-6O,P/ - JD,BK,BŘ,OS,JDO	MD 5-10 JDO 1-3		
	sm. (I.generace lesa)	N,H,P	80	-	30	61					
573	borové	N,H	110	100-130	30	91					
576	bukové	P,N	140	120-150	40	121					
577	listnaté /olšové +bř/	N,H	70	60-90	20	61					
59 Podmáčená stanoviště středních a vyšších poloh: 2G, 4 - 6G; 4R, 5T; 3 - 5V9 /poklesliny se stagnující vodou; gleje, organozem (rašelinná půda)/							95 ha - 0,4 %				
591	smrkové	P,N	100	90-120	30	81	SM 8, JD1, (DB,LP,OL,JS,JV,OS,BŘ,BK)1,BO /2-4G,3V9/: BO 1-4/ekotyp/, SM 4-7, (JD,DB,OL,OS) 2 /3-4V9,2-4G/: DB 3-10, (BO,SM) 0-7, (JD,OL,OS) 0-3 OL 2-10, SM 0-8, (JS,OS,BŘ) 0-2	/2-4G,3-5V9/: 20%- JD,OL, JV,OS,BK; 3-4lvs + LP,DB /5-6G/:15%-JD,BK,JV,OL,OS /4R/: 5%- BŘ,JD; /5T/ 10% - JD,DB,BŘ,OS	-		
593	borové	N	120	100-130	30	101					
595	dubové	P,N	140	130-200	30	121					
597	listnaté /olšové +bř/	N,(H)	80	60-90	20	71					
01 Mimořádně nepříznivá stanoviště: 3 - 6Y; 3J, 5J /srázy, skalnaté svahy, sutě, hřbety s mělkou půdou; litozem, ranker, rendzina, regozem/							144 ha - 0,6 %				
011	smrkové	P,N	130	120-150	40+	111	SLT: /3-6 Y/: BK 4, DB 2, (BO,SM) 3, BŘ 1 /3Y/: BO 6, (BK,DB) 3, SM 1 /3J/: BK 5, JV 3, (LP,JS,JL,DB,HB) 2 SM /5J/: BK 5 KL 3 (JD,SM,JS,JL,LP) 2	/3-6Y/: 30%- BK,DB,JD,JV,BŘ,JŘ /3J/: 90%-BK,DB,JV,LP,JL,JS, HB,BB,TS,břek,muk /5J/: 60%-BK,JD,JV,JL,LP,JS	-		
013	borové /smíšené/	V,P,N	150	150<	50+	-					
015	dubové /smíšené/	V,P,N	150	150<	50+	-					
016	bukové /smíšené/	V,P,N	150	150<	50+	-					

PLO 27 Hrubý Jeseník

Přehled základních hospodářských doporučení zastoupených HS

54 619 ha

HS	POROSTNÍ TYP (současné porosty)	ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ 1 2 3 4 5					CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA - alternativy (desítky %)	MELIORAČNÍ A ZPEVNŮJÍCÍ DŘEVINY (Příl. Č.4 k vyhl.č.83/96)	Geografic. Nepůvodní dřeviny %
29 Olšová stanoviště na podmačených půdách: 3L, 5L 485 ha 0,90 % <i>/podmačené úpadliny, potoční aluvia, prameniště;náplavy, rula, fylit; gleje, fluvizemě/</i>									
297	OL	N	70	60 - 90	20	61	OL 7, JS 3, KL, JL, BŘ, OS, VR, DB, SM OL 5, JS 3, KL 2, JL, BŘ, SM, OS, VR OL 5, SM 3, KL2, JS, JL, BŘ, OS, VR, DB	70 % - OL,JV	
290	OL s JS	N	90	80 - 100	20	81			
291	OL se SM	N	90	80 - 100	20	81			
41 Exponovaná stanoviště středních poloh: a) kyselá: 4N 95 ha 0,17 % b) živná: 4 A,S9,B9 <i>/ kamenité hřbety a svahy, příkré až srázné svahy; rula, břidlice, droba, amfibolit; kambizemě/</i>									
411	SM	P, N	110	100 - 130	30	91	a) SM 6, BK 3, (MD,JD) 1, BO, LP, DB, BŘ b) SM 6, BK 2, KL(LP) 1, (MD,JD) 1, JS, JL, HB, BO, DB, DG BK 6, SM 3, (KL,MD,JD) 1, LP, JL, JS, HB, BŘ, BO, DG	30 % - BK,JD,LP,DB,DG ; /4 A, S9, B9/: + JV, JS, JL,HB	MD 5 - 10 DG +5
417	listnaté ost. /BŘ/	N	70	70 - 90	20	61			
416	BK	P, N	130	120 - 150	40	111			
43 Kyselá stanoviště středních poloh: 4K 77 ha 0,14 % <i>/svahy, zvlněné plošiny, hřbety, kupy; rula, droba, fylit, břidlice; kambizemě/</i>									
431	SM	P,N,H	110	100 - 130	30	91	SM 6, BK 3, (MD,JD) 1, DB, BO, LP, BŘ, DG, BK 6, SM 3, MD(JD) 1, BO, LP, DG DB 6, BK 2, LP 1, MD(BO) 1, SM, JD	25% - BK, DB, LP, HB, JD, DG	MD 5 - 10 DG +2
431	SM poškozené	N, H	80	80 - 100	30	61			
436	BK	P, N	130	120 - 150	40	111			
435	DB	P,N,H	130	120 - 150	30	111			
45 Živná stanoviště středních poloh: 4 S,B,H,D 814 ha 1,50 % <i>/svahy, hřbety, plošiny, úpatí svahů; rula, břidlice, droba, fylit, svor, amfibolit, sprašové hlíny; kambizemě, luvizemě/</i>									
451	SM	P,H,N	100	90 - 120	30	81	SM 5, BK 3, MD(JD)1, BO, KL, LP, JS, JL, HB, TR, OS, DG, JDO BK 6, SM 2, MD 1, JD 1, KL, LP, HB, TR, JL, JS, DG, JDO DB 6, BK 2, LP(HB) 1, MD 1, KL, TR, SM, JD, DG	25 % - BK,DB,JD,JV,LP, JS,JL,HB,TR,JDO	MD 5 -10 DG 2 - 5 JDO + -3
451	SM poškozené	N, H	80	70 - 100	30	61			
457	listnaté ost. /BŘ/	N, H	70	50 - 90	20	61			
456	BK	P, (N)	130	120 - 150	40	111			
455	DB	P,N,H	130	120 - 150	30	111			
47 Oglejená stanoviště středních poloh: 4 V,O 79 ha 0,14 % <i>/převážně úžlabiny podél potoků, ojediněle mírně zvlněné plošiny občas zamokřované; rula, břidlice, deluviální hlíny; kambizemě, gleje /</i>									
471	SM	P, N	100	100 - 130	30	81	SM 6, BK 2, JD 1, (KL,JS) 1, MD, JL, OL, DG, JDO, DB, HB	25% - / 4V / - JD,BK,DB,JV,JS,LP,JL, HB, JDO -/4O/ - JD,BK,DB, LP,OS,BŘ,JDO	MD 5 - 8 DG + -1 JDO+3
51 Exponovaná stanoviště vyšších poloh: a) kyselá: 5 - 6 N,K9; 8 561ha 15,57 % b) živná: 5B9, 5U; 5 - 6 F,A,S9 <i>/kamenité svahy a hřebeny, příkré až srázné svahy, SLT - 5U rokliny, úžlabiny; rula, fylit, amfibolit, břidlice, vápenec; kambizemě, rankery, kryptopodzoly, rendziny /</i>									
511	SM	P, N	120	110 - 130	30 - 40	101	a) SM 6, BK 3, (JD,MD) 1, KL, LP, DG, BŘ b) SM 5, BK 3, (MD,KL,JD) 2, JS, JL, LP, DG, BŘ, TR /5U/ - JS 3, KL 3, SM 2, BK 1, JD 1, LP, JL, OL BK 6, SM 2, JD(KL,JS) 1, (MD,LP) 1, JL, BO, TR	30% - BK,JD,JV,LP,DG - / 5B9, 5U; 5 - 6 F,A,S9/: +JS,JL	MD 4 - 7 DG + -1
517	listnaté ost. /BŘ/	N	70	50 - 90	20	61			
510	JS, KL + SM	P, N	110	100 - 130	30	91			
516	BK	P, N	140	120 - 150	40	121			
53 Kyselá stanoviště vyšších poloh: 5 - 6 K 7 054 ha 12,91 % <i>/svahy, zvlněné plošiny, hřbety a kupy; rula, břidlice, křemenec, fylit; kambizemě, kryptopodzoly, podzoly /</i>									
531	SM	P,N,H	110	100 - 130	40	91	SM 6, BK 3, (MD,JD) 1, KL, LP, BŘ, BO, DG	25% - BK,JD,LP,DG	MD

53	SM poškozené	N, H	80	80 - 110	30	61			4 - 7 DG 1 - 4		
536	BK	P, N	130	120 - 150	40	111	BK 6, SM 2, JD1, (MD,LP) 1, BO, KL, DG				
55 Živná stanoviště vyšších poloh: 5 - 6 S,B,D; 5H 15 580 ha 28,52 % / svahy, hřbety, vlněné plošiny, ploché svahové úžlabiny; rula, břidlice, fylit, svor,amfibolit, gabroamfibolit, diabas; kambizemě, kryptopodzoly; SLT 5H - luvizemě na sprašových hlínách /											
551	SM	N,H,P	110	100 - 130	40	91	SM 7, BK 2, (JD,MD,KL) 1, BO, LP, JS, TR, JL, DG, JDO	25% - BK,JD,JV,JL,LP, JS, JDO,TR	MD 5 - 9 DG + - 5 JDO + - 2		
551	SM poškozené	N, H	80	70 - 110	30	61					
557	listnaté (BŘ)	N, H	70	60 - 80	20	61					
551	SM rezonanční	P, N	160	150 - 170	30-40	141	SM 7, BK 2, JD 1				
556	BK	P, N	130	120 - 150	40	111	BK 6, SM(KL) 2,JD1,MD1,LP,JS,JL,BO,TR,DG				
57 Oglejená stanoviště vyšších poloh: 5 - 6 V,O; 6 P,Q 2 065 ha 3,80 % /úžlabiny podél potoků, mírně vlněné plošiny občas zamokřované; rula, břidlice, svor; kambizemě, pseudogleje, gleje, kryptopodzoly /											
571	SM	P, N	110	90 - 130	40	91	SM 7, JD 2, BK 1, KL, MD, BŘ, OS, JS, LP, JL, OL, BO, JDO	25% - /5 -6 V/ - BK,JD,JV,JS,JL,LP,JDO - /5 - 6 O; 6 P,Q/ - BK,JD,BŘ,OS,JDO	MD 3 - 5 JDO + - 5		
571	SM poškozené	N, P	80	70 - 110	30	61					
577	OL	N	70	60 - 90	20	61	OL 4, SM 3, JD 2, (BŘ,JS,OS) 1				
59 Podmáčená stanoviště středních a vyšších poloh: 4 - 6 G,V9 383 ha 0,70 % /poklesliny se stagnující vodou, prameniště; rula, sprašové hlíny; gleje /											
591	SM	P, N	100	90 - 120	40	81	SM 7, JD 2, OL 1, BO, KL, JS, OS, BK, LP, MD, DB, BŘ, JDO			20% - /4G,V9/ - DB,BK,JD,JV,LP,OL,OS 15% - /5 - 6 G,V9/ - BK,JD,JV,OL,OS	MD + - 1 JDO + - 2
591	SM poškozené	P, N	80	70 - 100	30	61					
597	OL	N	80	60 - 90	20	71	OL 8, SM 2, JS, KL, OS, JD, JL, BŘ				
71 Exponovaná stanoviště horských poloh: 7 N,K9, 7 F,S9 3 208 ha 5,87 % /kamenité hřbety a hřebeny, příkré až srázné svahy; rula, křemenec; kryptopodzoly, podzoly /											
711	SM	P, N	130	120 - 150	40	111	SM 8, BK 2, KL, JD, BŘ, JŘ, VR slezská	15% - BK,JD,JV,JŘ			
711	SM genet. nevhod.	N	100	90 - 100	30	81					
716	BK	P, N	140	120 - 150	30	121	BK 5, SM 3, KL, 2, JD,JŘ				
73 Kyselá stanoviště horských poloh: 7 M,K 4 044 ha 7,40 % /svahy, hřbety, kupy, náhorní plošiny;rula; kryptopodzoly, podzoly /											
731	SM	P, N	130	120 - 150	40	111	SM 8, BK 2, JD, KL, BŘ, JŘ, VR slezská			15% - BK,JD,JŘ	
731	SM rezonanční	P	160	160 - 170	40	141					
731	SM genet. nevhod.	N, H	90	80 - 100	30	71					
75 Živná stanoviště horských poloh: 7S 3 935 ha 7,20 % /svahy, hřbety, náhorní plošiny, ploché svahové úžlabiny; rula; kryptopodzoly, podzoly /											
751	SM	P, N	130	120 - 150	40	111	SM 8, BK(KL) 2, JD, BŘ, JŘ, VR slezská	15% - BK,JD,JV,JŘ			
751	SM genet. nevhod.	N, H	90	80 - 100	30	71					
756	BK	P, N	140	120 - 150	30	121	BK 5, SM 3, KL, 2, JD,JŘ				
77 Oglejená stanoviště horských poloh: 7 V,O,P,Q 623 ha 1,14 % /úžlabiny podél potoků, plošiny občas zamokřované; rula; kryptopodzoly, gleje, pseudogleje, podzoly/											
771	SM	P, N	130	120 - 150	40	111	SM 8, BK 1, (KL,BŘ,JŘ) 1, JD, VR slezská			5 - 10% - BK,JD,JV,BŘ,JŘ	
79 Podmáčená stanoviště horských poloh: 7 G,V9,R 317 ha 0,58 % /podmáčené terénní poklesliny a náhorní plošiny, prameniště; rula, fylit, křemenec; gleje a organozemě/											
791	SM	P, N	120	110 - 140	40	101	SM 9, BŘ(JŘ) 1, JD	5% - JD,JŘ,BŘ			
01 Mimořádně nepříznivá stanoviště : 0Z; 0R; 6 - 7 Z; 4 - 8Y; 5J; 8 - 9 R 1 155 ha 2,11 % /srázy, skalnaté svahy a ostrohy, sutě, hřbety s mělkou půdou, vrchoviště; rula, břidlice, svor, fylit, droba, křemenec, vápenec; lítozemě, rankery, regozemě, rendziny, organozemě /											
011	SM	V, P	150-f	150-f	∞	-	SM 6, (BK,KL) 4, JD, BŘ, BO, LP, MD, JŘ /SLT 7Z; 7 - 8 Y; 8 - 9 R: SM 10, BŘ, JŘ, VR slezská /SLT 0R/ BL 9, BŘP 1, SM BK 5, (KL,LP,JS,JL) 3, SM 1, JD 1, MD, BŘ,JŘ	+ - 90% - podle SLT	MD +		
013	BO	V, (P)	150-f	150-f	∞	-					
016	BK	V, (P)	150-f	150-f	∞	-					
02 Vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace: 8 Z,M,K,N,S,A,V,Q,K9,S9 5 371 ha 9,83 % /hřbety, horní části svahů, náhorní plošiny, příkré svahy hřebenové oblasti, místy se značným obsahem skeletu; rula, fylit, amfibolit, křemenec; podzoly, rankery /											

021	SM	V, (P)	150-f	150-f	∞	-	SM 10, JR, BK, KL, BŘ, VR slezská	+ % - BK, JŘ, BŘ, JV	
021	SM genet. nevhod.	V	110	110 - 140	40	91			
03 Lesy v klečovém lesním vegetačním stupni: 9 Z, K							773 ha 1,42 %		
/vysokohorské hole na hřebenech – nepůvodní kosodřevina s vtroušeným SM; rula; podzoly/									
031	SM	V	200-f	200-f	∞	-	SM 10, JŘ, VR slezská	+ % - JŘ	
40 Lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou: a) kyselá: 4 N, K9; (4Y)									
b) živná: 4 A, S9, B9 (5J)									
/velmi srázné kamenité až skalnaté svahy s nebezpečím eroze; rula, břidlice, droba, amfibolit; rankery/									
406	BK	V, (P)	150		50	121	a) BK 6, (JD, MD, LP, DG) 3, SM 1, BŘ, HB, BO b) BK 6, (KL, JD, MD, LP, JS) 3, SM 1, JL, HB, BŘ, DG	30% - BK, JD, LP, DB, DG /4 A, S9, B9/: + JV, JS, JL, HB	MD 5 -10, DG + - 5
401	SM	V, (P)	150		50	121			
50 Lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou: a) kyselá: 5 - 6 N, K9; (5- 6 Y, 6Z)									
b) živná: 5B9, 5 - 6 F, A, S9; (5J)									
/velmi srázné kamenité až skalnaté svahy s nebezpečím eroze; rula, fylit, amfibolit, břidlice; rankery /									
506	BK	V, (P)	150		50	121	a) BK 6, SM 2, (JD, MD, LP) 2, BŘ, JŘ, BO, KL b) BK 6, SM 2, (JD, MD, KL, LP, JS) 2, BŘ, JŘ, JL	30% - BK, JD, JV, LP, DG /5B9, 5 - 6 F, A, S9, B9/: + JS, JL	MD 4-7
501	SM	V, (P)	150		50	121			
70 Lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou: 7 A, K9, F, S9; (7 Z, Y)									
/velmi srázné kamenité až skalnaté svahy s nebezpečím eroze; rula, fylit, amfibolit, břidlice, křemenec; rankery/									
711	SM	V, (P)	150		50	121	SM 8, BK(KL) 2, JD, BŘ, JŘ, VR slezská	15% - BK, JD, JV, JŘ	

PLO 28 Předhoří Hrubého Jeseníku

Přehled základních hospodářských doporučení zastoupených HS

83 858 ha

HS	POROSTNÍ TYP (současné porosty)	ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ 12345					CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA - alternativy (desítky %)	MELIORAČNÍ A ZPEVNŮJÍCÍ DŘEVINY (Přil. Č.4 k vyhl.č.83/96)	Geograf. Nepůvodní dřeviny %
19 Lužní stanoviště: 2L, 3U 534 ha 0,6 %									
/aluvia nižších poloh - rovinatá dna údolí; fluvizemě, kambizemě a gleje/									
190	listnaté smíšené	P,N,H	110	80-130	30	91	JS 4, SM 3, JD 1, DB 1, JV 1, JL, BK, LP, OL	15% - BK,JV,JL,LP,JD, OL,DB	
191	SM	H, (P)	100	80-110	20	91			
23 Kyselá stanoviště nižších poloh: 3M, 4M, 3K5 612 ha 0,7 %									
/rula, žula, droba, fylitické břidlice; kambizemě/									
233	BO	P,N,H	110	90-130	30	91	BO 6, DB 3, (BK, LP,JD) 1, MD, BŘ, DG, SM	25% - BK,DB,LP,HB,JD, BŘ,DG	MD 1-4 DG +-1
231	SM nevhodné	N, H	100	80-110	20	91			
27 Oglejená chudá stanoviště nižších a středních poloh: 1 - 2 P, 1Q 146 ha 0,2%									
/ plošiny, terénní poklesliny; deluviální hlíny, terciérní a kvartérní písky; pseudogleje, gleje/									
273	BO	N, P	120	100-130	30	101	BO 6, DB 2, SM 2, JD, BŘ, OS, MD, LP, BK, VJ	20 % - DB,BK,BŘ,JD,OS, MD,SM	MD +-3
271	SM nevhodné	N, H	100	80-110	30	81			
29 Olšová stanoviště na podmáčených půdách: 3L, 5L, 1T 1124 ha 1,3 %									
/podmáčené aluviální naplaveniny; gleje,fluvizemě/									
297	OL	N	70	60-90	20	61	OL 7, JS 3, KL, JL, BŘ, OS, VR, DB, SM	70 % - /3L, 5L/ - OL,KL /1T/ - DB,BŘ,OL	
290	OL s JS	N	90	80-100	20	81	OL 5, JS 3, KL 2, JL, BŘ, SM, OS, VR		
291	OL se SM	N	90	80-100	20	81	OL 5, SM 3, KL2, JS, JL, BŘ, OS, VR		
31 Vysychavá a sušší acerózní a bazická stanoviště středních poloh: (2C), 3 - 5 C 705 ha 0,8 %									
/mělčí ohrožená půda; rula, fylit, droba; kambizemě/									
313	BO	N	120	110-140	30	101	BO 5, BK 2, DB 1, MD 1, LP 1, HB, JV	30 % - BK,DB,LP,HB,JV, JD,TR	MD 3 - 10
316	BK	P, N	130	120-140	30	111	BK 6, DB 1, MD 1, BO 1, LP 1, HB, JV		
315	DB	P, N	130	120-140	30	111	BO 5, DB 3, BK 1, MD 1, LP,HB		
41 Exponovaná stanoviště středních poloh: a) kyselá: 3 - 4 N, K9 ; b) živná: 3 - 4 A,F,S9,B9 5302 ha 6,3%									
/příkré či kamenité svahy; rula, žula, fylitické břidlice, droba, vápenec, svor; kambizemě/									
411	SM	P, N	110	100-130	30	91	a) SM 4, BK 2, BO 1, DB 1, (MD,JD) 1,LP 1,BŘ b) SM 4, BK 2, DB 1, JV 1, BO(MD,JD) 1, LP1, JS, JL, HB, DG	30 % - BK,JD,LP,DB,DG ; /3 - 4 A, F, S9, B9/: + JV, JS,JL,HB	MD 5 - 10 DG +-5
417	listnaté ostatní /BŘ/	N	70	70-90	20	61			
410	listnaté ost.(HB,LP)	N	110	100-130	30	91			
413	BO	N, (P)	120	110-140	30	101	/SLT 3N, (4N), LT 3K9, (4K9), 3S9, (4S9)/: BO 6, BK2, DB1, (MD,JD,LP) 1, SM, BŘ		
415	DB	P,N	130	120-150	30	111	BO 4,DB 3, BK 2, MD(LP) 1, JD		
416	BK	P, N	130	120-150	40	111	BK 6, DB 2, SM 1, (JV,BO,MD,JD) 1, LP, JL, JS, HB, BŘ, DG		
43 Kyselá stanoviště středních poloh: 3 - 4 K,I; 5M 4697 ha 5,6 %									
/sprašové překryvy, žula, rula, fylit; luvizemě, kambizemě/									
433	BO	N,H	120	110-140	30	101	BO 6, DB 2, BK 1, (LP,JD, MD) 1, SM, BŘ, DG, VJ	25 % - BK,DB,LP,HB,JD, DG	MD 5 - 10 DG +-2 VJ +-1
431	SM	P,N,H	110	100-130	30	91	SM 3, BO 3, DB 2, BK 1, (LP,JD,MD) 1, BŘ		
431	SM poškozené	N, H	80	80-100	30	61	/SLT 3K, 3I/: BO 6 ...		
435	DB	P,N,H	130	120-150	30	111	DB 4, BO 3, BK 2, (LP,MD) 1, HB, JD, DG		
436	BK	P, N	130	120-150	40	111	BK 6, DB 2, (BO,MD) 1, (SM,JD) 1, HB, LP, DG		

HS	POROSTNÍ TYP (současné porosty)	ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ 12345					CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA - alternativy (desítky %)	MELIORAČNÍ A ZPEVNŮJÍCÍ DŘEVINY (Přil. Č.4 k vyhl.č.83/96)	Geografic. Nepůvodní dřeviny %
45 Živná stanoviště středních poloh: 3 - 4 S,B,H,D /žula, rula, břidlice, droba, fylit, svor, amfibolit, písky, sprašové překryvy; kambizemě, luvizemě/								27260 ha 32,5 %	
451	SM	P,H,N	100	90 - 120	30	81	SM 5, BK 3, DB (JD)1, MD 1, BO, JV, LP, JL, HB, TR, OS, DG, JDO /SLT 3S, (4S)/: BO 5, SM 2, (DB,BK) 2, JD(MD,LP) 1, TR, DG, JDO DB 6, BK 2, LP(HB) 1,MD(BO) 1, JV, TR, SM, JD, DG BK 6, DB 1, MD(BO) 1, SM 1, JD 1, JV, LP, HB, TR, JL, JS, DG, JDO SM 5, BK 2, LP 1, MD 1, JD 1, BO, JV, HB, TR, DG, JDO, DB SM 5, BK 2, LP 1, MD 1, JD 1, BO, JV, HB, TR, DG, JDO, DB	25 % - BK,DB,JD,JV,LP, JS,JL,HB,TR,JDO	MD 5-10 DG 2- 5 JDO +3
451	SM poškozené	N, H	80	70 - 100	30	61			
454	MD	H	110	90 - 130	30	91			
453	BO	N, H	110	90 - 130	20	101			
455	DB	P,N,H	130	120 - 150	30	111			
456	BK	P, (N)	130	120 - 150	40	111			
457	listnaté (BŘ)	N, H	70	50 - 90	20	61			
450	Listnaté (LP,HB)	N, H	110	90 - 130	30	91			
47 Oglejené stanoviště středních poloh: 3 - 4 V,O, 4P /mírně zvlněné plošiny občas zamokřované, úžlabiny; rula, droba, svor, deluviální hlíny, sprašové hlíny; kambizemě, gleje, luvizemě/								1461 ha 1,8 %	
471	SM	P, N	100	100 - 130	30	81	SM 5, JD 1, DB 1, KL 1, LP(BO,MD) 1, BK(JS,OL) 1, BŘ, OS, JL, HB, JDO, DG OL 4, SM(BO) 3, JD 1, DB 1, LP(KL) 1,	25% - /3O, 3 - 4V / - JD,BK,DB,KL,JS,LP,JL, HB, JDO - /4O, 4P/-JD,BK,DB, LP,OS,BŘ,JDO	MD 5-8 DG +1 JDO+-3
471	SM poškozené	N, P	80	70 - 100	30	61			
477	OL	N	70	60 - 80	20	61			
51 Exponovaná stanoviště vyšších poloh: a) kyselá: 5 - 6 N,K9; b) živná: 5 - 6 A,S9, 5 F,B9,U /příkré či kamenité svahy; rula, žula, fylit, amfibolit, jílovité břidlice;kambizemě, rankery, kryptopodzoly /								5949 ha 7,1 %	
511	SM	P, N	120	110 - 130	30 - 40	101	SM 5, BK 3, (MD,KL) 1, (JD,JS) 1, JL, LP DG, BŘ, TR /5U/ - JS 3, KL 3, SM 2, BK 1, JD 1, LP, JL, OL BK 6, SM 2, JD(KL,JS) 1, (MD,LP) 1, JL, BO, TR	30% - BK,JD,KL,LP,DG - /5 - 6 A,S9, 5 F,B9,U /: +JS,JL	MD4-7 DG+1
517	listnaté (BŘ)	N	70	50 - 90	20	61			
510	JS, KL + SM	P, N	110	100 - 130	30	91			
516	BK	P, N	140	120 - 150	40	121			
53 Kyselá stanoviště vyšších poloh: 5 - 6 K /rula, žula, svor, fylit; kambizemě, kryptopodzoly, podzoly /								6143 ha 7,3%	
531	SM	P,N,H	110	100 - 130	40	91	SM 6, BK 3, MD(JD) 1, KL, BO, LP, BŘ, DG BK 6, SM 2, JD1, MD 1, LP, BO, KL, DG	25% - BK,JD,LP,DG	MD 4-7 DG 1-4
531	SM poškozené	N, H	80	80 - 110	30	61			
536	BK	P, N	130	120 - 150	40	111			
55 Živná stanoviště vyšších poloh: 5 - 6 S,B,D /rula, žula, břidlice, fylit, svor, droba; kambizemě, kryptopodzoly /								25903 ha 30,9 %	
551	SM	N,H,P	110	100 - 130	40	91	SM7, BK 2, (JD,MD,KL) 1, BO, LP, JS, TR, JL, DG, JDO BK 6, SM(KL) 2,JD1,MD1,LP,JS,JL,BO,TR,DG SM 6,BK2,MD1,JD(KL)1,JS,LP,JL,TR,DG,JDO SM 6,BK2,MD1,JD(KL)1,JS,LP,JL,TR,DG,JDO	25% - BK,JD,KL,JL,LP, JS, JDO,TR	MD 5-9 DG +5 JDO+-2
551	SM poškozené	N, H	80	70 - 110	30	61			
556	BK	P, N	130	120 - 150	40	111			
557	listnaté (BŘ)	N, H	70	60 - 80	20	61			
554	MD	H	110	90 - 130	30	91			
57 Oglejená stanoviště vyšších poloh: 5 - 6 V,O,P /mírně zvlněné plošiny, úžlabiny; rula, žula, svor, jílovité a fylitické břidlice; kambizemě, pseudogleje, gleje, kryptopodzoly /								2037 ha 2,4%	
571	SM	P, N	110	90 - 130	40	91	SM 7, JD 2, BK 1, BO, BŘ, OS, MD, JS, LP, JL, OL, KL, JDO /SLT 5 O/: SM 6, JD 2, BK 1, MD1,OL,OS,JDO OL 4, SM 3, JD 2, (BŘ,JS,OS) 1	25% - /5 - 6 V/ - BK,JD,KL,JS,JL,LP,JDO - /5 - 6 O,P/ - BK,JD,BŘ,OS,JDO	MD 3-5 JDO+-5
571	SM poškozené	N, P	80	70 - 110	30	61			
577	OL	N	70	60 - 90	20	61			
59 Podmáčená stanoviště středních a vyšších poloh: 4 - 6 G,V9; 5R /poklesliny se stagnující vodou; rula, břidlice, žula, terciární jíly; gleje, organozemě/								528 ha 0,6%	
591	SM	P, N	100	90 - 120	40	81	SM 7, JD 2, OL 1, BO, KL, JS, OS, BK, LP, MD, DB, BŘ, JDO OL 8, SM 2, JS, KL, OS, JL, BŘ	20% - /4G,V9/ - DB,BK,JD,KL,LP,OL,OS 15% - /5 - 6 G,V9/ - BK,JD,KL,OL,OS 5% - /5R/ - JD,BŘ,JŘ	MD +-1 JDO+-2
591	SM poškozené	P, N	80	70 - 100	30	61			
597	OL	N	80	60 - 90	20	71			

71 Exponovaná stanoviště horských poloh: 7N, 7S9										16 ha + %
<i>/kamenité hřbety a hřebeny, příkré až srázné svahy; rula; kryptopodzoly, podzoly /</i>										
711	SM	P, N	130	120 - 150	40	111	SM 8, BK 2, KL, JD, BŘ, JŘ	15% - BK,JD,KL,JŘ		
716	BK	P, N	140	120 - 150	30	121	BK 5, SM 3, KL, 2, JD,JŘ			
73 Kyselá stanoviště horských poloh: 7K										157 ha 0,2%
<i>/rula; kryptopodzoly, podzoly /</i>										
731	SM	P, N	130	120 - 150	40	111	SM 8, BK 2, JD, KL, BŘ, JŘ	15% - BK,JD,JŘ		
731	SM genet. nevhod.	N, H	90	80 - 100	30	71				
75 Živná stanoviště horských poloh: 7S										21 ha + %
<i>/rula; kryptopodzoly, podzoly /</i>										
751	SM	P, N	130	120 - 150	40	111	SM 8, BK(KL) 2, JD, BŘ, JŘ	15% - BK,JD,KL,JŘ		
751	SM genet. nevhod.	N, H	90	80 - 100	30	71				
756	BK	P, N	140	120 - 150	30	121	BK 5, SM 3, KL, 2, JD,JŘ			
79 Podmáčená stanoviště horských poloh: 7G, 7R										5 ha + %
<i>/podmáčené terénní poklesliny a náhorní plošiny; rula, fylit, křemenec; gleje a organozemě/</i>										
791	SM	P, N	120	110 - 140	40	101	SM 9, BŘ(JŘ) 1, JD	5% - JD,JŘ,BŘ		
01 Mimořádně nepříznivá stanoviště : 0Z; 0C; 3 - 5 Z, 7Z; 3 - 6Y; 3J, 5J										1258 ha 1,5 %
<i>/srázy, skalnaté svahy a ostrohy, sutě, hřbety s mělkou půdou; žula, rula, jílovité břidlice, svor, fylit, droba, vápenec, hadec; litozemě, rankery, regozemě, rendziny /</i>										
011	SM	V, P	150-f	150-f	∞	-	/SLT 5 - 7 Y, 7Z/: SM 6, (BK,JV) 4, JD, BŘ, BO, LP, MD	5 - 90% - podle SLT		
013	BO	V, (P)	150-f	150-f	∞	-	/SLT 0Z, 0C, 3Z/ BO 6, DB 2, BK 1, SM 1, LP, BŘ, JD			
016	BK	V, (P)	150-f	150-f	∞	-	BK 5, (KL,LP,JS,JL,DB) 3, SM(JD,BO,MD) 2, HB,BŘ			
40 Lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou: a) kyselá: 3 - 4 N,K9 (3- 4 Z,Y) b) živná: 3 - 4 A,F,C,S9,B9 (3J)										
<i>/velmi srázné kamenité až skalnaté svahy s nebezpečím eroze; žula, rula, fylitické břidlice, svor, droba, vápenec; rankery, rendziny/</i>										
401	SM	V, (P)	150	150/50	50	121	BK 5, DB 2, SM 1, (JV,BO) 1, (MD,JD) 1, LP, JL, JS, HB, BŘ, DG	30% - BK,JD,LP,DB,DG, /3 - 4 A,F,S9,B9/: + JV, JS,JL,HB	MD5-10,DG + - 5	
406	BK	V, (P)	150	150/50	50	121				
50 Lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou: a) kyselá: 5 - 6 N,K9 (5- 6Y) b) živná: 5 - 6 A,F,S9,B9 (5J)										
<i>/velmi srázné kamenité až skalnaté svahy s nebezpečím eroze; žula, rula, fylit, amfibolit, jílovité břidlice; rankery /</i>										
501	SM	V, (P)	150	150/50	50	121	BK 6, SM 2, JD(KL,JS) 1, (LP,MD) 1, BO, JL	30% - BK,JD,LP, DG, /5 - 6 A,F,S9,B9/: + JS,JL	MD 4-7	
506	BK	V, (P)	150	150/50	50	121				

PLO 29 - NÍZKÝ JESENÍK

Přehled základních hospodářských doporučení zastoupených HS ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ

HS	POROSTNÍ TYP (současné porosty)	ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ 12345					CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA - alternativy (desítky %)	MELIORAČNÍ A ZPEVNŮJÍCÍ DŘEVINY (Příl. č.4 k vyhl.č.83/96)	Geografic. nepůvodní dřeviny %
01 Mimořádně nepříznivá stanoviště: 2Z, 3Z, 3Y, 3J, 4Z, 4Y, 5Y, 5J 379 ha 0,39 % /rokliny, srázy, sutě, kamenité meze, skály + litozrmě, rankry/									
011	smrkový	N,P(V)	90	-	30	71	3-5Y, 2-5Z:BO3-7 BK3-1 BR0-1 DB0-3, JD0-1 SM; 3J: BK1-3 JD1 JV2 DB1 JL1 LP2 5J: SM2-4 JD1-2 BK3-2 KL2 JL1;	3-5Z, 3-5Y: 30% - BK, DB, JD, BR; 3J: 90% - BK, JV, LP, DB, HB, JS, JL, 5J: 60% - BK, JV, JD, JL, LP, JS;	-
015	dubový	P,V	150	-	40-∞	-			
017	listnatý	N,V(P)	100	-	40-∞	71			
19 Lužní stanoviště: 1L, 2L, 3U 1567 ha 1,62 % /fluvioglaciálních a fluviálních sedimenty v aluviích řek a říček – fluvizemě/									
191	smrkový	H	80	-	20	61	1L, 2L: DB6 JS3-2 LP1-2 JV1-0 JL1-0 HB OL 3U: DB4 BK1 JS2-3 JD2-0 KL(JV)1-2 LP0-1 JL1-0 HB	15% - LP, JV, JL, HB, BB, DB (1L, 2L); BK, JV, JL, LP, JD, OLL, DB (3U)	-
195	dubový	H,N	150	-	20-30	131			
197	listnatý	H,N	80-100	80-100	30	61-91			
198	topolový	H	30(40)	-	20	11(21)			
21 Exponovaná stanoviště nižších poloh: 2S9, 2C, 2A 34 ha 0,04 % /hřbítky, kamenité svahy - kambizemě rankrové/									
211	smrkový	N	100	-	30	81	DB6 LP2 HB1 (BO,MD)1 BK JV BR JS	30% - DB BK LP HB BR JV JS JD (2A: +JV, JS, BB)	-
213	borový	N	120	-	30	101			
215	dubový	N(P)	130	-	30	111			
216	bukový	P-N	140	-	30	121			
23 Kyselá stanoviště nižších poloh: 2I, 2K, 2S, 4M 281 ha 0,29 % /vysychavé svahy, kupy, zvlněné plošiny - kambizemě dystrické, rankrové/									
231	smrkový	N,H	100	-	20	81	DB6 BO3 (BK,LP,MD)1 BR HB	25% - DB, BK, LP, HB, BR, JD	-
233	borový	P,N(H)	120	-	20	101			
235	dubový	P,pN(H)	130	-	30	111			
25 Živná stanoviště nižších poloh: 2S3, 2B, 2H, 2D, 2O, 2V (mimo exponované typy) 709 ha 0,73 % /plošiny až mírné svahy, sprašové překryvy - hnědozemě, luvizemě, pseudogleje, kambizemě typické mezotrofní až eutrické/									
251	smrkový	N,H	100	-	20	81	DB7 LP2 (HB,JV)1 MD BK BR JL BO TR JS OL JD BB OS	20 % - BK, LP, HB, JV, JS, JL, JD, JDO, TR, BB, DB	-
253	borový	pN,pH	120	-	20	91			
255	dubový	nP,pN	150	120-140	30	131			
257	listnatý	pN,pHnN,nH	110(70)	-	30	91(61)			
29 Olšová stanoviště podmáčených půd: 1G, 1T, 3L, 5L 1486 ha 1,54 % /podmáčených stanovišť na plošinách, aluvia podél potoků a prameniště- gleje, stagnogleje, fluvizemě/									
291	smrkový	N,H	80-100	-	20	61(81)	SM1-3 JS2-3 OLL7-2 OLS1 KL HB TR OS VR JL	70% - JV, OLL (1T: BR, OL)	-
297	listnatý	N,H	70-90	-	20	51-71			
31 Vysychavá sušší, acérózní a bazická stanoviště středních poloh: 3C, 4C 339 ha 0,35 % /hřbítky, kamenité svahy - kambizemě rankrové a typické/									
311	smrkový	N	80	-	30	61	BO5 BK2 DB1 MD2 LP HB JV	30% - BK, DB, LP, HB, JV, JD, TR	-
313	borový	pN,nN	120	110-120	30	101			
316	bukový	P,N	130	-	30	111			
35 Živná bazická stanoviště středních poloh: 4W 8 ha 0,01 % /hřbítky, kamenité svahy - kambizemě rankrové a typické/									
351	smrkový	N, P	90	80-90	30	71	BK8 MD1 KL1 JS JD	70% - BK, DB, JV, JS, LP, JD, JL, HB, TR	-
356	bukový	N, P	120	-	30	101			
357	listnatý	H	90	80-100	30	71			
41 Exponovaná stanoviště středních poloh: 3K9, 3N, 3S9, 3F, 3B9, 3A, 4K9, 4N, 4F, 4S9, 4B9, 4D9, 4A 9245 ha 9,55 % /kamenité svahy, hřbety, srázné svahy - kambizemě typické, dystrické, rankrové/									
411	smrkový	N,P	110	100-110	30	91	3-4N,K9,S9: BO4-6 BK3-1 MD2-1 JD1-0 KL0-1 DB LP BR HB 3-4F,A,B9,4S9: SM5-3 JD0-2 MD1-0 BK1-4 KL(JV)1-0 LP0 DB JL1-0 JS0-1 BO	30% - BK, JD, LP, DB, JS, JV, JL, HB	-
415	dubový	N	130	-	30	111			
416	bukový	P,N	130	-	30	111			
417	listnatý (LP,JS,HB)	N	100	100-110	30	81(91)			
417	listnatý (BR)	N	70	70-80	30	51			
43 Kyselá stanoviště středních poloh: 3K, 3I, 4K, 4I, 5M (bez exponovaných typů) 1101 ha 1,14 % /kyselá stanoviště slunných svazích, hřbety - kambizemě typické oligotrofní, dystrické, podzoly/									
431	smrkový	N,P	110	80-110	30	91	BO6-7 BK1-3 JD1-0 MD1-2 DB1-0 KL HB (4I:SM6-7 BK1-3 JD1-0 MD1-2 DB1-0 KL HB)	25% - BK, JD, LP, DB, HB	-
433	borový	P,N(H)	120	-	30	101			
435	dubový	P,H,N	130	-	30	111			
437	listnatý (OL, BR)	N,H	80	-	30(20)	61			

Pokračování tabulky

45	Živná stanoviště středních poloh: 3S, 3B, 3H, 3D, 4S, 4B, 4H, 4D (bez exponovaných typů) <i>/normální stanoviště-kambizemě eutrické až oligotrofní, oglejené, luvizemě/</i>						51404 ha 53,11 %
451	smrkový	H,N,P	90	70-100	30	51-81	SM6-2 JD2-0 BK1-5 MD1-2 KL1-0 LP0-1 TR JS BO DG JDO HB 3S: BO6 BK2 MD1 DB1 3B: SM(DB)6-4 JD JD1-0 BK2-3 MD1 KL1-0 LP0-1 TR JS BO DG JDO 3H: DB6-4 JD0-1 BK1-3 MD1-2 LP0-1 SM0-2 DG 25% - BK, JD, LP, DB, JV, JS, JL, HB, TR, JDO DG 6-10 JDO +-3 VJ+
453	borový	H(N)	110	100-110	30	91	
454	modřínový	H	110	-	30	91	
455	dubový	H,N,P	130	130-160	30	111-141	
456	bukový	N,P	130	130-120	40	101	
457	listnatý (HB,LP)	H(N)	110	100-110	30	91	
457	listnatý (OL, BR)	H(N)	70	70-90-	20-30	51-71	
47	Oglejená stanoviště středních poloh: 3V, 3O, 4V, 4O, 4P <i>/zamokřená stanoviště na plošinách a úžlabinách - kambizemě oglejené a pseudoglejové, pseudogleje, gleje/</i>						3206 ha 3,31 %
471	smrkový	N,P(H)	100	80-100	30	61-81	SM(DB)7-4 JD2-3 MD1-0 BK0-1 KL DG JS JDO 25% - BK, JD, DB, LP, JV, JL, JDO, HB DG +-1 JDO +-3 VJ+
473	borový	N(H)	110	110-120	30	91	
475	dubový	N,P(H)	130	-	30	111	
477	listnatý (JS, OL)	H	70	-	20	51	
51	Exponovaná stanoviště vyšších poloh: 5K9, 5N, 5S9, 5B9, 5F, 5A, (5U) <i>/zářezy potoků, prosluněné svahy, prudké stinné svahy, suťová stanoviště na svazích a hřbetech, chudé mírné až prudké svahy - kambizemě typické eutrické až oligotrofní, kambizemě rankrové a dystrické, podzoly/</i>						1174 ha 1,21 %
511	smrkový	N(P)	120	110-120	30-40	91	SM7-5 JD0-2 BK3-1 MD1-0 KL0-1 JL BO LP TR 5U: SM2-4 JD2-1 BK3-2 JS2-3 KL1-2 30% - BK, JD, JV, LP, DG, JS, JL DG+-1
516	bukový	P,N	130	-	40	101	
517	listnaté (BR,JS,LP)	N	100	80-100	30	81-(61)	
53	Kyselá stanoviště vyšších poloh: 5K, 5I (mimo exponované typy) <i>/kyselá stanoviště na prosluněných mírných svazích- kambizemě oligotrofní až podzolované, podzoly/</i>						387 ha 0,40 %
531	smrkový	P(N,H)	120	-	40	91	SM6-7 JD1-0 MD1-0 BK2-3 BR BO 25% - BK, JD -
536	bukový	N,P	130	-	40	101	
55	Živná stanoviště vyšších poloh: 5S, 5B, 5D, 5H (bez exponovaných typů) <i>/normální stanoviště - kambizemě eutrické až oligotrofní, oglejené, luvizemě/</i>						18925 ha 19,55 %
551	smrkový	P,N,H	110	90-110	30	91	SM6-7 JD2-0 BK1-2 MD0-1 KL0-1 DG JDO JL BO LP JS TR 25% - BK, JD, KL, JL, JS, JDO, TR DG 3-6 JDO +-2 VJ+
556	bukový	P,N	130	120-130	40	101	
57	Oglejená stanoviště středních a vyšších poloh: 5O, 5V <i>/poklesliny, mírné svahy, místy stagnující voda - kambizemě pseudoglejové, luvizemě, gleje/</i>						5875 ha 6,07 %
571	smrkový	P,N(H)	110	100-110	40(30)	91	SM5-7 JD2-3 BK1 OL1-0 JS OS BO 25% - BK, JD, KL, JS, JL, LP, JDO (OS) JDO 3-5
577	listnatý (OL,BR)	N(H)	80	-	20	61	
59	Podmáčená stanoviště středních a vyšších poloh: 3V9, 4V9, 5V9, 4G, 5G (mimo exponované typy) <i>/poklesliny se stagnující vodou - gleje, organozemě/</i>						669 ha 0,69%
591	smrkový	P(N)	100	-	40	71	SM7 JD2-3 BK0-1 KL OL0-2 JS 5-20% - BK, JD, JV, OLL, OS -
597	listnatý (BR)	N	80	-	20	61	

VYSVĚTLIVKY:

- porostní typ: zařazení dle současných porostních skupin podle převládající dřeviny; porosty s převahou **MD,JD,JDO,DG** se zařazují do sm; porosty s převahou **VJ, BOČ** do borových; porosty **JV,KL,JL** do bukových; **DBČ** a **ostatní listnáče** do porostního typu listnaté ostatní;

- základní doporučení: 1 - hospodářský způsob: **H - holosečný, P- podrovní, N - násečný, V - výběrný**
2 - doporučené obmýty /details, odchylky a další doporučení jsou uvedeny v jednotlivých HS/
3 - rozsah přípustného obmýty (je uveden u těch porostních typů, kde je více CHS s různým obmýty)
4 - obnovní doba
5 - počátek obnovy

-cílová druhová skladba + alternativy: ekonomicky, biologicky i funkčně optimalizované zastoupení dřevin v mýtném věku, které odpovídá přírodním podmínkám souboru. Neodpovídá současnému stavu lesů. **Je uvedena v desítkách procent.** Jsou uvedeny všechny skladby podle základních dřevin cílového souboru. a zároveň poukazují na možnost čistých porostů v případě bk a db. Porosty db a bk by se měly z celospolečenského hlediska obnovovat opět na db a bk. Alternativy pak ukazují další přípustné možnosti volby skladby dřevin v jednotlivých hospodářských souborech v návaznosti na porostní typy.

-meliorační a zpevňující dřeviny: uvedeny **minimální podíly** dle přílohy vyhlášky MZe č.83/1996 Sb. pro jednotlivé cílové HS

-geograficky nepůvodní dřeviny: **uvedeny v % maximální přípustné podíly** introdukovaných dřevin dle požadavku odboru ekologie krajiny MŽP (č.j.548/OEK/98 ze dne 15.7.1998) pro PLO 23 (spodní hranice platí pro prvkyÚSES)

Poznámka: Jedná se o souhrnný modelový přehled celé oblasti. Odchylky a další detailní doporučení včetně funkcí jsou rozvedeny ve vlastních rámcových směrnících hospodaření dle jednotlivých hospodářských souborů. Uvedené výměry cílových HS jsou podle současné výměry SLT v PLO 41.

PLO 30 - DRAHANSKÁ VRCHOVINA

Přehled základních hospodářských doporučení zastoupených HS

HS	POROSTNÍ TYP (současné porosty)	ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ 12345					CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA - alternativy (desítky %)	MELIORAČNÍ A ZPEVNŮJÍCÍ DŘEVINY (Přil. č.4 k vyhl.č.83/96)	geograficky nepůvodní dřeviny %
13 Přírozená borová stanoviště: 0K + % -- <i>suché písčité půdy křemitých kvádrových pískovců, mělce výrazný podzol</i>									
131	smrkové /nevhod./	N,H /HH/	100	80-110	10 /20/	91	bo8-9, (db,bkbř)0-2, sm	0K: 5%-db,bk,bř,jř,jd	
133	borové /smíšené/	P,N,H /HH/	120	110-140	20-	111	alt.: db 2-6, bo 4-8, sm		
137	listnaté ost. /bř,ak/	H	70	40-80	20	61	bk 2-6, bo 4-8, db, sm		
19 Lužní stanoviště: 2L, 3U 1,2 % -- <i>lužní stanoviště na úžlabních aluviích a v pahorkatinném luhu, naplaven půda(+ -oglej.)</i>									
191	smrkové /nevhod./	pH	100	80-110	20	91	db7,js2,(lp,jv,oll,tp,hb/1, bb, os,jl,vr,břk	15%:2L:db,lp,jl,jv,hb,bb, břk 3U: bk,jv,jl,lp,jd,oll,db	
195	dubové	P,pH	150	130-200	30-	131			
197	listnaté (js)	H,nH	90	80-120	20	81			
21 Exponovaná stanoviště nižších poloh: 1A,1-2 C,K9,2A,N,S9,B9 4.0% MD 1-5, BOČ + <i>příkré svahy, kamenité hřebeny, vysychavá půda, mělká,(rendzina)</i>									
211	smrkové (nevhodné)	nN	100	80-110	30	81	bo 6, db 2,lp 1,(hb,bk,jv,bř) 1, md,(boč)	30 % -(N,C,K) db,bk,lp,hb,bř,jd -(A,S,B) bk,db,lp,jv,hb,jl js,jd,břk,bb,ts	
213	borové /smíšené/	nN,P	120	110-140	20.	111			
215	dubové/běžné kvality/	P,nN	130	110-150	30-	111	db 8, lp 2,bo,bk,hb,jv, bř(boč)		
217	listnaté ost. /ak,b,hb)	N	70	50-90	20	61			
23 Kyselá stanoviště nižších poloh: 1K, 2 K,I,S, 3-4M 6,0 % MD 1-5, DBČ +, VJ +- 1 <i>minerálně slabě zásobené, prosychavé, převážně mělké, písčité, šterkovité půdy</i>									
231	smrkové	nH,N, P	100	80-110	20	91	bo 7, db 2, (bk,lp) 1,hb,(sm),md, bř(dbč,vj) db 7, lp 2,bk 1,bo,md,hb,(sm),bř(dbč,vj)	25 %-(BO)db,bk,lp,bř,hb,jd (DB)bk,lp,hb,jd,db	
233	borové /smíšené/	pP, p/n/N, p/n/H	110	90-130	30-	91			
235	dubové	P, p/n/N	130	110-150	30	111			
237	listnaté ostatní /br/	H,pH	70	60-90	20	61			
25 Živná stanoviště nižších poloh: 1-2 H,B,2D 3,3% MD 5-10, DG +-4, JDO +-2 <i>mírné a střední svahy, plošiny, hlinité a slabě šterkovité půdy</i>									
251	smrkové (nevhodné)	nH,nN	100	80-110	20.	91	db 7, bk 1,lp 1,md 1,hb,jv,js,jd,bo(jdo,dg)	20 % - db,bk,lp,hb,jv,js, jl,jd jdo,tř,břek,bb	
253	borové /smíšené/	pN,pH	110	80-120	20.	101			
255	dubové	nP,pN, /pH/	150	130-200	30-	131			
257	listnaté(ostatní nekval).	pH,	70	50-90	20	61			
27 Oglejená chudá stanoviště nižších poloh: 4Q, 2P + % -- <i>plošiny, poklesliny, chudé hlíny, pseudogleje</i>									
271	smrkové	/n/N, /n/H	100	80-110	20.	91	alt.: sm 1-2, db/jd,bk,bř/ 2, bo 6-7	20 % DB- db,bř,jd,os,bk,sm BO - bk,db,bř,jd,os	
273	borové (+ smíšené)	nN, /nH/, /P/	120	100-130	30-	101	bo 7, db2,(jd,bk) 1, md,sm , bř, vj, os,ol		
275	dubové	/P/,pN /pH/	140	110-140	30-	121	db 7, bo 2,(sm,lp,jd) 0-1, os, bř		
29 Olšová stanoviště podmačených půd: 1T, 3L 0,5 % -- <i>trvale zamokřená (zabahnělá) půdy - gleje, mokřady, prameniště, aluvia, (břehové porosty)</i>									
297	olšové /smíšené/	pN	70	60-90	20	61	ol 8, js 1,sm 1,os	70% -1T: ol,bř,db 3L:ol,jv	
297	jasanové	pN	90	80-100	20	81	ol 5, js 4, sm 1,vr,bř, os,db,jv		
31 Vysychavá a sušší acerozní bazická stanoviště středních poloh: 3 - 4C , 3 A9 ,3W4,4W4 1,7% MD 15-20 <i>svahy, hřbítky, kamenité svahy, mělčí ohrožená půda,vápenec</i>									
311	smrkové	pN	100	80-110	30-	81	bo 6, db/bk/ 3, (lp,jv, md) 1,sm,hb,bř	30 % -BK: db,bk,lp,hb,jd,jv, břk,tř BO:bk,db,lp,jd,hb	
313	borové	pN	120	110-140	30	111	db6,bo 2,md 1(bk,jv,lp)1,sm,bř		
315	dubové	pN	130	120-140	30	111			
316	bukové	P,/pN/	130	120-140	40-	111	bk 6,db1,lp 1,jv 1,md 1,sm, bř,jd,hb		
317	listnaté ost. /ak,bř,js)	pH	70	50-90	20	61			

35	Živná bazická stanoviště středních poloh: 3-4 W <i>minerálně středně zásobené, vlhkostně příznivé půdy ,karbonátové</i>							1,7%	MD 9-15, JDO 1-3
351	smrkové	nN,nH	100	80-100	30	81		70 % - bk,db,lp,jv,jd,js,	
356	bukové + jv,kl,lp+db	P,pN/ /H/	120	120-140	30-	101	bk 7,db 2,(md,lp ,jv)1,jd,jl,js,břk,sm,(jdo)	jl,hb břk,tř	
41	Exponovaná stanoviště středních poloh: a/ kyselá: 3 - 4N,K9 b/ živná: 3 - 4A,F,S9,B9,3D7,4D4 <i>prudké či kamenité svahy, zářezy; ranker až kambizem</i>							12,4 %	MD 5-10
411	smrkové	pP,pN, nP,nN	110	100-130	30	91	sm 6, bk2,kl 1,(jd,md,lp) 1,bo,js,jl, bř	30% -kys.:/sm:/bk,lp,jd,db /bo:/bk,db,lp,jd /bk/: bk,lp,jd,db	
413	borové	/pP/p, /p/n/ N	120	110-150	30	101	bo 7, bk2,(md,db,lp)1, sm,jd,jv,bř	živ.:/sm:/bk,jd,jv,js,jl,lp,hb /bk:/bk,jd,jv,js,jl,hb,lp,hb	
415	dubové	P,/pN/	130	120-140	30	111	<i>alt.: db 4-10, sm/bo/ 0-6, /bk,lp,jd/ 0-2, bř</i>		
416	bukové /smiš./+jv,kl,lp	P,/pN/	130	120-150	40-	111	bk 7, sm 1,md 1, kl 1, lp,jd,js		
417	listnaté ostatní /bř/	N,pN	80	70-90	20.	71			
43	Kyselá stanoviště středních poloh: 3 - 4K,I <i>minerálně slabé, propustné, převážně šterkovité, příznivé vlhké půdy, kat..I hlinité uléhavé</i>							10,5 %	MD 5-10, DG 4-8, VJ +-1
431	smrkové	n/p/P, n/p/N, n/p/H	110	100-130	40-	91	sm 7, bk 2, (db,lp,jd,bo,md) 1,bř,(dg,vj)	25% -/bo:/bk,lp,db,jd,hb / sm:/bk,jd,lp,db,hb,dg /bk:/bk,lp,db,hb,jd	
433	borové	nP,nN,	110	100-130	30-	91	bo 7, bk 2, (lp,sm,jd,md,db)1,hb,bř,(dg,vj)		
435	dubové	p/n/N P	130	110-150	30	111	<i>alt.: db 4-10, bo 0-6, /bk,lp,jd/ 0-2, bř, sm</i>		
436	bukové +jv,kl,lp	P,/pN/	130	120-150	40-	111	bk 7, kl 1,(sm,jd,bo,md,db)1, lp 1, bř, (dg,vj)		
437	listnaté ostatní /bř/	/p/H, /pN/	70	60-80	20	61			
45	Živná stanoviště středních poloh: 3 - 4S,H,B,D <i>minerálně středně zásobené, vlhkostně příznivé půdy, silně zabuřené, kat. S méně</i>							44,2 %	MD 10-15, DG 5-10, JDO+-3, VJ+
451	smrkové	n/p/N, n/p/P, n/p/H	100	100-120	30.	81	sm 6, bk 2, md 1,jd 1, jv,js,db,lp,jl,(dg, jdo)	25 % - bk,db,lp,jv,jd,js,	
4514	smrkové,loupané	N,H	90	70-100	20	71			
453	borové	nH,nN nP	110	90-120	30-	91	<i>alt.: bo 1-5, sm 1-5, bk/db,lp/ 3, bř</i>	jl,hb,tř,jdo	
455	dubové	pP,pN, pH,nP N	140	110-180	30	121	<i>db 4-10, bo 0-5, /bk,jv,lp,sm/ 0-2, bř</i>		
456	bukové + jv,kl,lp	pH /P,/pN /	130	120-150	40-	111	bk 7,kl 1,md 1, sm 1, jd,db,lp,js,jl,tř(dg,vj,jdo)		
457	listnaté ostatní	/p/N, /p/H	70	50-90	20.	61			
47	Oglejená stanoviště středních poloh: 3 - 4O, V, 4P <i>plošiny občas zamokřované; oglejené půdy, pseudogleje</i>							0,8 %	MD 5-10, DG +-2
471	smrkové	/pN/ pP	110	100-140	30.	91	sm 7, jd 1, bo 1,bk,(db,lp)1,js,bř ,md(dg)	25 % - /3-4V,3O/ -	
473	borové	pN,pP,	110	100-140	30	91	<i>alt.:bo 5,sm 2./db,bk,jd/3 bř,md,lp,ol,os</i>	/sm/: jd,bk,db,jv,js,lp,jl,hb /db:/bk,lp,hb,jv,js,jl,jd /bk:/bk,db,jd,lp,jv,js,jl,hb	
475	dubové	pP,pH N	140	100-180	30-	121	db 7,bk 1,lp 1,(bo,sm,jd,md)1,bř,ol,os,jv,js,jl	4OP:/sm:/jd,bk,db,lp,os /bo:/jd,bk,db,lp,os,bř /db:/bk,lp,jd	
476	bukové	pP,pN	130	120-150	40-	111	bk 7,jd 1,sm 1,(db,lp,bo)1,bř,jv,js,jl,ol,od,jdo		
477	listnaté /olšové/ + bř	/p/N	70	60-80	20	61	<i>alt.: ol 7,js 3,sm,bo,db,bk,jd,kl</i>		

51		Exponovaná stanoviště vyšších poloh: a/ kyselá: 5 N,K9; b/ živná: 5 A,S9,B9, 5U						0,9 %		MD 5-8, DG +-1	
		<i>prudké či kamenité svahy,hřebeny,potoční úžlabiny,terasy</i>									
511	smrkové	p/n/P, /n/N	120	110-140	40-	101	sm 6, bk 2, kl 1,(md,jd,lp) 1,bo,js,jl,bř,(dg),jř alt.: bo 3-4, sm 2-4, /bk,jd,lp,kl/ 3	30 % - kys.:bk,jd,jv,lp,dg živ.:/sm/- js,jl,bk,jd,jv,lp,dg /bk/:js,jl,bk,jd,jv,lp, 5U-jv s js:bk,kl,jl,jd,jv,lp			
513	borové	/n/N, /P/	120	110-130	30	101					
516	bukové + jv,kl,lp	nP, /p,n/N	140	120-150	40-	121					
53		Kyselá stanoviště vyšších poloh: 5K,I						3,5 %		MD 5-10, DG 1-4	
		vlhkostně příznivé, minerálně slabě zásobené,šterkovité až kamenité půdy 5									
531	smrkové + jd	nP,nN, nH	110	100-140	40-	91	sm 7, bk 2, /kl,bo,jd,md/ 1, lp,(dg) alt.: bo 2-5, sm 3-7, /bk,jd,/ 2, bř bk 7, sm 2, (md,jd,kl) 1,lp,bo,bř,(dg)	25 % - bk,jd,lp,dg			
533	borové	/nP/,n N,nH	120	100-130	30	101					
536	bukové + kl,lp	P,/p/N	140	120-150	40	121					
537	listnaté ostatní /bř/	pH,pN	70	60-80	20.	61					
55		Živná stanoviště vyšších poloh: 5S,B						4,3 %		MD 8-10, DG 1-5, JDO +-3, VJ+	
		<i>středně bohaté až bohaté hlinité až slabě šterkovité půdy</i>									
551	smrkové + jd	nN,nP, nH	110	100-130	40-	91	sm 7, bk 2,(kl,jd,md)1,lp,js,jl,jř,(dg,jdo,vj) bk 7, sm 2, (kl,jd,md) 1,lp,js,jl(dg,vj,jdo)	25 % - bk,jd,lp,js,kl,jl,jdo,tř			
556	bukové + kl,lp	P,/pN/	140	120-150	40-	121					
557	listnaté ostatní /bř/	/p/H /p/N	70	60-80	20.	61					
57		Oglejená stanoviště vyšších poloh: 5P,O,V,6O, P						2,9 %		MD 5-8, JDO 3-5	
		<i>střídavě zamokřené uléhavé půdy, oglejené - pseudogleje</i>									
571	smrkové + jd	pP,pN	110	90-130	40-	91	sm 7, jd 2, bo 1,bk,jv,lp,js,ol, jl, md ,(jdo) alt.: bo 3-4/, sm 4, /bk,lp,bř/ 2, md 1 bk 7, sm 2, (kl,jd) 1,md,lp,js,jl	25 % - 5V - - jd,bk,jv,js,jdo,lp,jl 5 - 6O,P - - jd,bk,bř,os,jdo			
573	borové	pN/ /pH/	110	100-130	30-	91					
576	bukové + kl,lp,jl	P,pN	140	120-150	40	121					
577	listnaté /olšové/ + bř	/p/N	70	60-90	20	61					
59		Podmáčená stanoviště středních a vyšších poloh: 4 - 6G, 6R						0,3 %		--	
		<i>humózní gleje a semigleje, poklesliny se stagnující vodou;</i>									
591	smrkové + jd	pP,pN	110	100-130	40-	91	sm 8, jd 2, db,lp,ol,js,jv,bk,bo alt.: ol 1, sm7,jd1,(bo,db,js)1,bř,os,jř	20%:4G:bk,jd,db,jv,lp,ol,os 15%-:5-6G:jd,bk,jv,ol,os 5%-6R-bř,jd			
597	listnaté /olšové/ + bř	pN	80	60-90	20	71					
01		Mimořádně nepříznivá stanoviště:Z,1-4X,1-3Z, 3,1J, 3J, 5J						1,8 %			
		<i>/srázy, skalnaté svahy, sutě, hřbety s mělkou půdou; litozem, ranker, rašelina/</i>									
011	smrkové	V,P,N	150	150<	∞	--	podle SLT, bo6,db2,bk1,sm1,bř,lp sm 4-7,bk 2-4,jd 0-1, (bo,jv/kl,bř,jř)0-1 db1-6,dbp1-6,bk0-6,hb 0-2,lp 1, (bo,jv,js,jl,	0Z -5%-bk,bř,db,jd 1X-:90%- db,dbp,hb,lp,bb,břk,mk,bř,jv js,jl 2X-90%-- bk,db,hb,lp,jv,jl,břk,mk,bb, ts 3-4X-80%- bk,db,lp,hb,jv,js,jl,jd,břk,mk bb,ts 1Z-70%-db,hb,lp,bř,břk,mk 2Z-60%-bk,db,lp,bř,hb 3Z,3Y-30%-bk,db,jd,bř 6Y-30%-bk,jd,bř,jř,jv 1J-95%- db,jv,hb,lp,jl,břk,mk,ts,tř,js 3J- 90%bk,jv,lp,db,jd,hb,js, jl,břk,mk,ts 5J-60%-bk,jv,jd,jl,lp,js			
013	borové /smiš./	V,P,N	150	150<	∞	--					
015	dubové/smiš./,bb,hb	V,P,N	150	150<	∞	--					
016	bukové/smiš./,jv,lp,js,jl	V,P,N	150	150<	∞	--	brk)1,jd,mk,bb,ts				
017	listnaté ostatní	V,P,N	150	150<	∞	--	bk3-7,db0-3, sm 1-3, jd 0-1,bř1,jv,js,lp,jl,bř				

VYSVĚTLIVKY:

- **porostní typ:** zařazení dle současných porostních skupin podle převládající dřeviny; porosty s převahou md,jd,jdo,dg se zařazují do sm; porosty s převahou vj, boč do borových; porosty lp, jv, kl, jl do bukových; dbč do dubových; ostatní listnáče do porostního typu listnaté ostatní;

- základní doporučení:

- 1- hospodářský způsob: H - holosečný, P- podrostní, N - násečný, V - výběrný
- 2- doporučené obmýtí /detaily, odchylky a další doporučení jsou uvedeny v jednotlivých HS/
- 3- rozsah přípustného obmýtí
- 4- obnovní doba
- 5- počátek obnovy

-cílová druhová skladba + alternativy: ekonomicky, biologicky i funkčně optimalizované zastoupení dřevin v mýtném věku, které odpovídá přírodním podmínkám souboru. Neodpovídá současnému stavu lesů. Je uvedena v desítkách procent. Jsou uvedeny všechny skladby podle základních dřevin cílového souboru. a zároveň poukazují na možnost čistých porostů v případě bk a db. Porosty db a bk by se měly z celospolečenského hlediska obnovovat opět na db a bk. Alternativy pak ukazují další přípustné možnosti volby skladby dřevin v jednotlivých hospodářských souborech v návaznosti na porostní typy. /detaily, odchylky a další doporučení jsou uvedeny v jednotlivých rámcových směrnících HS

Jedná se o souhrnný modelový přehled celé oblasti. Odchylky a další detailní doporučení včetně funkcí jsou rozvedeny ve vlastních rámcových směrnících hospodaření dle jednotlivých hospodářských souborů..

-meliorační a zpevňující dřeviny: uvedeny minimální podíly dle přílohy vyhlášky č.83/1996 Sb. pro jednotlivé cílové HS

-geograficky nepůvodní dřeviny: jsou v souladu se stanoviskem MŽP ČR (P.Stloukal-MŽP-10.dubna 2000-"potrzuji, že tabulka pro PLO-30 Dražanská vrchovina platí, kromě území CKO Moravský Kras, kde lze připustit modřín maximálně do 5% v zóně II. A do 10% v zóně III.") viz následující tabulka.

PLO 31 - ČESKOMORAVSKÉ MEZIHOŘÍ

Přehled základních hospodářských doporučení zastoupených HS

79 240 ha

13	Přírozená borová stanoviště: 0K, 0M, 0N /ostrůvky pískovce; písčité, podzolové půdy/							437 ha	0,6 %	
133	borové	P,N,H	120	110-150	20	111	BO 9, (DB,BK,BŘ) 1, SM, DBČ, MD,VJ DB 4-6, BO 4-8, SM BK 2-6, BO 4-8, DB, SM	0K,0M : 5%- DB,BK,BŘ,DBČ DB,BŘ,HB,LP,DBČ	MD 1 - 4 VJ +2 DBČ +2 BOČ +	
131	smrkové/nevhd./	N,H	100	80-110	20	91				
135	dubové	P,N	130	110-150	20	121				
136	bukové	P,N	140	120-150	30	121				
137	listnaté ost./bř.ak/	N,H	70	40-80	20	61				
19	Lužní stanoviště: 1 - 2L /aluvia nejnižších poloh /							114 ha	0,2 %	
195	dubové	P,N,H	160	130-200	30	141	DB 7,JS 2, (LP,JV,OLL,TP,HB) 1, SM,OS	15% - DB,LP,JL,JV,HB,BB břek		
191	smrkové /nevhd/	H	100	80-110	20	91				
197	listnaté	N	90	80-120	20	81				
21	Exponovaná stanoviště nižších poloh: 1 - 2 C,A; 1 - 2 N,K9; 2S9, 2B9; 3M9 /hřbítky, kamenité svahy, opukové břehy; mělčí ohrožená půda, pararendziny, podzolové - rankerové kambizemě /							500 ha	0,6 %	
213	borové	P,N	120	110-140	20	111	BO 6, DB,BK) 3, (LP,HB,JV,JS) 1, MD /2.lvs/SM 2-3, BO 4-5, (DB,BK,LP,HB,JV)3 DB 4-10, BO 0-5, (BK,LP,HB,JV,JS) 0-5 BK 4-10, BO 0-5, (DB,LP,HB,JV,JS) 0-5	30 % - DB,BK,LP,HB,BŘ,JD na SLT 1-2A: + JV,JS,BB,břek,tis	MD 2-3 BOČ +1	
211	smrkové /nevhd./	P,N	100	80-110	30	81				
215	dubové	P,N	140	110-150	30	121				
216	bukové	P,N	140	110-150	30	121				
217	listnaté /ak,bř.js/	N	70	50-90	20	61				
23	Kyselá stanoviště nižších poloh: 2 K,I,S; 2 - 4 M; 3K3, 3K překryvy, pískovce, křemenec; kambizem, luvizem, podzol/							6253 ha	/chudé	7,9 %
233	borové	P,N,H	120	90-130	20	111	BO 7, DB 2, (BK,LP,HB,SM) 1, MD, BŘ /2S/SM 2-3, BO 4-6, (BK,LP,HB) 3-4, BŘ DB 4-10, BO 0-6, (BK,LP,HB,SM) 0-5 BK 4-10, BO 0-6, (DB,LP,HB,SM) 0-5	25 % - DB,BK,LP,BŘ,HB,DG,JD	MD 1-4 DG +1 DBČ+1	
231	smrkové	H,N,P	100	80-110	30	81				
235	dubové	P,N	140	110-150	30	121				
236	bukové	P,N	140	120-150	40	121				
237	listnaté ostatní/br/	H	70	60-90	20	61				
25	Živná stanoviště nižších poloh: 1 - 2 B,D; 2 H,O,V /slínovce, sprašové překryvy; pararendzina, luvizem, kambizem, pseudoglej/							1200 ha		1,5 %
255	dubové /průměr/	P,N,H	150	130-200	30	131	DB 8, (LP,BK,HB,JV,JS,JD)2, MD, OL, SM /2H/: SM 2-3, DB 4-6, (LP,BK,JV,JS,JD) 2 /2H/: BO 2-3, DB 4-6, (LP,BK,HB,JV,JS)2 BK 4-10, (BO,SM) 0-3, (DB,LP,HB) 0-3, JD	20 % - DB,BK,LP,HB,JV,JS, JL, JD,JDO,TŘ,břek,BB	MD 1-5 DG 1-4 JDO 1-2	
251	smrkové /nevhd/	N,H	90	80-90	20	81				
253	borové	N,H	110	80-120	20	101				
256	bukové	P,N	140	120-160	40	121				
257	listnaté ostatní	H,N	70	50-90	20	61				
258	topolové	H	40	20-40	10	36				
27	Oglejená chudá stanoviště nižších a středních poloh: 1 - 2 P,Q; 3 - 4 Q; /0G/ /štěrkopísky, diluviální hlíny; podzolové pseudogleje, glejové podzoly/							322 ha		0,4 %
273	borové	P,N,H	120	110-130	30	101	BO 7,(DB,BK,BŘ) 2,(SM,JD)1,MD,JDO,DBČ SM 2-4, (DB,JD,BK,BŘ) 2, BO 4-6 DB 4-10, BO 0-4, (SM,LP,JD) 0-2, BŘ BK 4-10, BO(SM) 0-4, (DB,LP,HB) 0-5	20 % - DB,BŘ,JD,OS,BK 5-10% - /0G/: DB,JD,BŘ, OS,OLL	MD 1-5 DBČ +2 JDO +1	
271	smrkové	P,N,H	100	80-110	20	91				
275	dubové /kvalitní/	P,N,H	140	110-140	30	121				
276	bukové	P,N	140	120-150	30	121				
277	listnaté /bř.os.ol/	N,H	70	60-90	20	61				
29	Olšová stanoviště podmačených půd: 1G,1T; 3L, 5L; (3U, 5U3) /podmačené úpadliny,potoční aluvia, prameniště; glejové a naplavené půdy/							863 ha		1,1 %
297	olšové /smíšené/	N	90	80-100	20	81	OL 5, JS 3, (SM,JV) 2, BŘ, OS, TP, DB OL 7-10, SM 0-3, (BŘ,JV,DB) 0-3; TP 10	70% - 1G-OL,VR; 1T-OL,BŘ; 30% - 5U3 - BK,JL,LP,JD,JV 70%-3L,5L-OL,JV; 15%-3U: +BK,JD,LP,JL;		
298	topolové	H	40	20-40	10	31				
31	Vysýchavá bazická stanoviště středních poloh: 3 - 5C, 3A9; 4A9 kamenité svahy, opukové břehy; mělčí ohrožená půda, pararendziny, kambizemě/							1271 ha	/hřbítky,	1,6 %
313	borové	P,N	120	110-140	30	101	BO 6, DB(BK) 3, (LP,HB,JV,JS) 1, SM, MD SM 2-3, BO 4-5, (DB,BK,LP,JS,JV,HB) 3 DB 4-10, BO 0-5, (BK,LP,HB,JV,JS) 0-5 BK 4-10, BO 0-5, (DB,LP,HB,JV,JS,SM) 0-5	30 % - DB,BK,LP,HB,JV, JD na SLT: 3A: + JS,JL	MD 5-10 BOČ+ -1	
311	smrkové	P,N	100	80-110	30	81				
315	dubové	P,N	140	110-150	30	121				
316	bukové	P,N	140	110-150	30	121				
317	listnaté /ak,bř.js/	N	70	50-90	20	61				
41	Exponovaná stanoviště středních poloh: a/ kyselá: 3 - 4 N,K9; 5M9 b/ živná: 3 - 4 A,F,S9,B9 /prudké či kamenité svahy, opukové břehy; rankerová až oligotrofní kambizem/							6 082 ha		18,3%
411	smrkové	P,N	110	100-130	30	91	a/ SM(BO) 6, (BK,DB,LP) 3, (MD,JD,BŘ) 1 b/ SM 6, (BK,DB,LP,JV) 3, (MD,JS,JD,BO) 1 /3N,K9/ BO 6, (BK,LP,DB) 3, (SM,MD,BŘ) 1 /3N,K9/:DB 4-10,(SM,BO) 0-6, (BK,JD,LP) 0-2 BK 4-10, (SM,BO) 0-6, (LP,JD,JS) 0-2	30% - BK,LP,JD,DB,DG na SLT: /3-4A,F,S9,B9/: + JV,JS,JL,HB	MD 6-10	
413	borové	P,N	120	110-140	30	101				
415	dubové	P,N	140	120-140	30	121				
416	bukové	P,N	140	130-160	40	121				
417	listnaté ostatní/bř/	N	80	70-90	20	71				

43	Kyselá stanoviště středních poloh: 3 - 4 K,I; (5M, 5K3, 5K6, 5K8)							14 721 ha	18,6%
/jemnozrnné pískovce, odvápněná opuka, rula, žula; oligotrofní kambizem až podzol, luvizem/									
431	smrkové	P,N,H	110	100-130	40	91	SM(BO) 7, BK(DB) 2, (LP,JD,MD) 1, DG /3K,5M,4-5K6/: BO 7, DB(BK) 2, (LP,SM,BŘ) 1 /3-4. lvs.: DB 4-10, BO 0-6, (BK,LP,JD,SM) 0-2,JD BK 4-10, (SM,BO) 0-6, (LP,JD,DB) 0-2, BŘ	25 % - DB,BK,LP,JD,HB,DG	MD 5-10 DG 3 - 5 VJ +--1
433	borové	P,N,H	120	100-130	30	101			
435	dubové	P,N,H	140	110-140	30	121			
436	bukové	P,N	140	120-150	40	121			
437	listnaté /bř/	N,H	70	60-80	20	61			
45	Živná stanoviště středních poloh: 3 - 4 S,H,B,D							31 565 ha	39,8%
/břidlice, vápnitá opuka, fylit, svor; kambizem, luvizem/									
451	smrkové	P,N,H	100	100-120	40	81	SM 7, BK(DB) 2, (LP,JV,JS,JD,MD)1,BO,DG /3S8,4S6/: BO 1-5, SM 1-5, (BK,DB,LP) 3, JD DB 4-10, BO 0-5, (BK,JV,LP,SM) 0-2, JD BK 4-10, SM 0-5, (DB,LP,BO) 0-2, JD	25 % - BK,DB,LP,JV,JD, JS, JL, HB,TŘ,JDO	MD 5-10 DG 3 - 5 JDO +3
453	borové	N,H	110	90-120	20	101			
455	dubové	P,N,H	140	110-180	30	121			
456	bukové	P,N	140	120-150	40	121			
457	listnaté /bř,ol/	N,H	70	50-90	20	61			
47	Oglejená stanoviště středních poloh: 3 - 4 P,O; 3 - 4V							3 086 ha	3,9 %
/plošiny občas zamokřované; oglejené půdy, pseudoglej; potočiny /									
471	smrkové	P,N,H	100	110-130	30	81	SM 7, (JD,DB,BK)2, (LP,JS,OL,JV,MD,BO)1 /3-4P/: BO 2-5, SM 2-5, (DB,JD) 2-4, BŘ DB 3-10, (BO,SM) 0-6, (JD,LP,BK) 0-2 BK 3-10, SM 0-5, (DB,LP,BO,JD) 0-1 OL 1-6, (BO,SM) 3-5, (DB,LP,OS) 2-4	25 % - /3-4V,3O/ - JD,BK,DB,JV,JS,JDO,LP JL,HB - /4O,3-4P/ - JD,BK,DB,JDO,LP,OS, BŘ	MD 5-10 DG +2 JDO +3
473	borové	P,N,H	110	100-130	30	91			
475	dubové	P,N,H	140	110-180	30	121			
476	bukové	P,N	140	120-150	40	121			
477	listnaté /olšové/bř	N	70	60-80	20	61			
51	Exponovaná stanoviště vyšších poloh: a/ kyselá: 5 N,K9; b/ živná: 5 A,F,S9,B9,D9							952 ha	1,2 %
/prudké či kamenité svahy, sutě; kambizem - rankerová/									
511	smrkové	P,N	120	110-130	40	101	SM 6, BK 2, (JV,JD,LP,JS) 1, (MD,BO)1 /5N,5M9,K9/:BO 3-4/ekotyp/ SM 2-4,(BK,LP,JD,JV) 3 BK 4-10, SM 0-6, (JD,JV,LP,JS,JL) 0-6	30 % - BK,JD,JV,LP,DG /5-6 A,F,S9,B9/ + JS,JL	MD 5-10 DG +1
513	borové	P,N	120	110-130	30	101			
516	bukové	P,N	140	120-150	40	121			
517	listnaté ostatní/bř/	N	70	60-+80	20	61			
53	Kyselá stanoviště vyšších poloh: 5K,I; 6I							4 333 ha	5,4 %
/různé - pískovec, rula, žula, odvápněná opuka; oligotrofní kambizem - podzolovaná, ilimerizovaná /									
531	smrkové	P,N,H	110	100-130	40	91	SM 7, BK 2, (LP,BO,JD,MD) 1, JV, DG BO 2-5/ekotyp/ SM 3-7, (BK,LP)2, MD 1 BK 4-10, SM 0-6, (LP,JD,BO) 0-6, MD,BŘ	25 % - BK,JD,LP,DG	MD 5-10 DG 2 - 4
533	borové	P,N,H	120	100-130	30	101			
536	bukové	P,N	140	120-150	40	121			
537	listnaté ostatní/bř/	H	70	60-80	20	61			
55	Živná stanoviště vyšších poloh: 5 - 6 S,H,B,D							4 258 ha	5,4 %
/břidlice, fylit, svor, vápnitá opuka; mezotrofní - eutrofní kambizemě /									
551	smrkové	P,N,H	100	100-130	40	81	SM 7, (BK,JV) 2, (JD,LP,JS,MD) 1, DG /5-6S,H /BO 2-5/ekotyp/, SM 3-6, (BK,JD) 2, MD 1 BK 4-10, SM 0-6, (JV,JD,LP,JS,JL) 0-6	25 % - BK,JD,LP,JS,KL,JL,JDO, TŘ	MD 5-10 DG 3 - 5 JDO +3
553	borové	N,H	110	90-120	30	91			
556	bukové	P,N	140	120-150	40	121			
557	listnaté ostatní/bř/	N,H	70	60-80	20	61			
57	Oglejená stanoviště vyšších poloh: 5 - 6 P,O,Q; 5V; (5U1)							2 223 ha	2,8 %
/plošiny občas zamokřované; oglejené půdy, pseudoglej; potočiny /									
571	smrkové	P,N	100	100-130	40	81	SM 7, (JD,BK) 2, (JV,JS,BŘ,OL,MD) 1, BO /5-6O,P,Q/BO 3-4/ekotyp/, SM 4,(BK,LP,BŘ) 2,MD1 BK 4-10, SM 0-6, (JV,JD,LP,JS,JL) 0-6 OL 2-5, SM 3-6, (BŘ,OS,JS) 2	25 % - /5 - 6 V; 5U1/ - JD,BK,JV,JS,JDO,LP,JL - /5-6 O,P,Q/ - JD,BK,BŘ, OS,JDO	MD 5-10 JDO 4- 5 DG +1
573	borové	N,P,H	110	100-130	30	91			
576	bukové	P,N	140	120-150	40	121			
577	listnaté /olšové/bř	N,H	70	60-90	20	61			
59	Podmáčená stanoviště středních a vyšších poloh: 2 - 6G; 3 - 6V9; 6V8; 6R							563 ha	0,7 %
/poklesliny se stagnující vodou; gleje, rašelinná půda/									
591	smrkové	P,N	100	90-120	40	81	SM 8, JD 1,(DB,LP,OL,JS,JV,OS,BŘ,BK)1,BO,JDO /4G,3V9/: BO1-4/ekotyp/, SM 4-7, (DB,OL,JD,OS)2 /3-4V9,4G/: DB 3-10, SM 0-7, (BO,JD,OL,OS) 0-3 OL 2-10, SM 0-8, (OS,JS,BŘ) 0-2	20 % -/4G, 3-6V9/ - JD,OL,JV,OS,BK; 3-4lvs + LP, DB 15% -/5-6G/- JD,BK,JV,OL,OS 5 % -/6R/ - BŘ, JD	JDO +2
593	borové	N,P,H	120	100-130	30	101			
595	dubové	P,N	140	130-200	30	121			
597	listnaté /olšové/bř	N,H	80	60-90	20	71			
01	Mimořádně nepříznivá stanoviště: 0Z, 1 - 4Z, 2 - 5Y, 3J, 5J, /1J/							497 ha	0,6 %
/srázy, skalnaté svahy, sutě, hřbety s mělkou půdou; litozem, ranker, rendzina, regozem /									
011	smrkové	P,N	130	120-150	40	111	podle SLT - přeměna	5-90 % - podle SLT	----
013	borové /smíšené/	V,P,N	150	150<	∞	--	/0-3Z/: BO 6, DB 2, BK 1, SM 1, BŘ, LP	5-30 % - podle SLT	
015	dubové/smíšené/	V,P,N	150	150<	∞	--	DB 5, (JV,LP,BŘ,BK,HB) 3, (SM,BO) 2	30-90 % - podle SLT	
016	bukové/smíšené/	V,P,N	150	150<	∞	--	BK 5, (JV,LP,JS,JL,DB,HB) 3, (SM,BO)2	30-90 % - podle SLT	

VYSVĚTLIVKY:

- porostní typ: zařazení dle současných porostních skupin podle převládající dřeviny; porosty s převahou **MD,JD,JDO,DG** se zařazují do smrkových; porosty s převahou **VJ, BOČ** do borových; porosty **LP,JV,KL,JL** do bukových; **DBC** do dubových; ostatní listnáče do porostního typu listnaté ostatní;
- základní doporučení: 1- hospodářský způsob: **H - holosečný, P- podrostní, N - násečný, V - výběrný**
2- doporučené obmýetí /detaily, odchylky a další doporučení jsou uvedeny v jednotlivých HS/
3- rozsah přípustného obmýetí
4- obnovní doba
5- počátek obnovy
- cílová druhová skladba + alternativy: ekonomicky, biologicky i funkčně optimalizované zastoupení dřevin v mýtném věku, které odpovídá přírodním podmínkám souboru. Neodpovídá současnému stavu lesů. **Je uvedena v desítkách procent.** Jsou uvedeny všechny skladby podle základních dřevin cílového souboru. a zároveň poukazují na možnost čistých porostů v případě BK a DB. Porosty DB a BK by se měly z celospolečenského hlediska obnovovat opět na DB a BK. Alternativy pak ukazují další přípustné možnosti volby skladby dřevin v jednotlivých hospodářských souborech v návaznosti na porostní typy. /detaily, odchylky a další doporučení jsou uvedeny v jednotlivých rámcových směrnících HS/
- meliorační a zpevňující dřeviny: uvedeny **minimální podíly** dle přílohy vyhlášky Mze č.83/1996 Sb. pro jednotlivé cílové HS
- geograficky nepůvodní dřeviny: **uvedeny v % maximální přípustné podíly** introdukovaných dřevin dle požadavku odboru ochrany přírody MŽP ČR (č.j 9417/00-OOP/3199/00) pro PLO 31(spodní hranice platí pro prvky ÚSES)

Poznámka: Jedná se o souhrnný modelový přehled celé oblasti. Odchylky a další detailní doporučení včetně funkcí jsou rozvedeny ve vlastních rámcových směrnících hospodaření dle jednotlivých hospodářských souborů, které budou součástí textové části OPRL. Uvedené výměry cílových HS jsou podle současných platných LHP (k roku 1997) v dané oblasti

PLO 32 - SLEZSKÁ NÍŽINA

Přehled základních hospodářských doporučení zastoupených HS

6 647 HA

HS	POROSTNÍ TYP (současné porosty)	ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ					CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA - alternativy (desítky %)	MELIORAČNÍ A ZPEVNŮJÍCÍ DŘEVINY (Přil. č.4 k vyhl.č.83/96)	Geografic. nepřivodní dřeviny %
		1	2	3	4	5			
01 Mimořádně nepříznivá stanoviště: 3Z, 3Y, 3J 22,5 ha 0,34%									
/skály, vypouklé hřbítky - litozemě, rankry/									
011	smrkové	N,P,V	100	-	30+	81	3J: BK3-5, JV2, LP2, DB1, JD0-1, HB, JL0-1	90 % - BK,JV,LP,DB, HB,JS,JL	---
015	dubové	P,V	150	-	30+	121	3Z, 3Y: BO3-6, DB1-2, BK1-4, BŘ1	30 % - BK,DB,JD,BŘ	
017	listnaté	P,V	150	-	30+	121		30 % - BK,DB,JD,BŘ	
19 Lužní stanoviště: 1L, 2L, 3U 366,25 ha 5,51%									
/fluvioglaciální a fluviální sedimenty v aluviích řek a říček – fluvizem, gleje/									
191	smrkové	H	80	70-80	20	61	DB4-7, JS3-1, JV0-1, LP0-1, JL1-0, JD0-2, BK0-1, HB, TP, VR	15 % - DB,LP,HB,JL, JV,BB,OLL,VR,OS	---
195	dubové	H,N,P	150	130-160	20	141			
197	listnaté	H,N	90	80-90	30	71			
198	topolové	H,N	40	20-40	10	31			
199	pařezina	H,N	50	30-50	20	31			
21 EXPONOVANÁ STANOVIŠTĚ NIŽŠÍCH POLOH: 2C 32,87 ha 0,49%									
/vysýchavé hřbítky a svahy - kambizemě/									
213	borové	H	130	80	30	111	BO5-2, DB2-4, MD1, BK, LP, OS	25% - BK,DB,LP,JD,HB BŘ	MD 10
215	dubové	H,N	110	-	20	91			
217	listnaté	N (P)	80	-	30	61			
29 Olšová stanoviště podmaččených půd: 1G, 3L 188,18 ha 2,83%									
/podmaččených stanovišť na plošinách, aluvia podél potoků a prameniště- gleje, stagnogleje, fluvizemě/									
295	dubové	H,N	160	-	30	141	OL6-8, JS3-1, SM 0-1, KL1-0, HB, TŘ	70 % - OL,VR, JV	---
297	listnaté (OL, JS)	H,N	80	-	20	61			
298	topolové	H	30	-	10	21			
31 Vysýchavá acerózní a bazická stanoviště středních poloh: 3C, 3C₉ 114,73 ha 1,73%									
/soubor vysýchavých exponovanějších bohatých stanovišť drob a břídlíc - kambizemě/									
311	smrkové	H,N	80	80-90	20	61	BO2-5, BK4-2, MD0-2, DB1-3, LP0-1, HB	30 % - BK,DB,LP,JD, HB,JV,TŘ	MD 15 SM 30
313	borové	N	120	110-120	30	101			
315	dubové	N,(P)	120	-	30	101			
316	bukové	N,P	130	120-130	30	111			
317	listnaté	H	90	-	30	71			
41 Exponovaná stanoviště středních poloh: 3S₉, 3F, 3B₉, 3D₉, 3A 197,87 ha 2,98%									
/zářezy potoků ve sprašových překryvech, prosluněné svahy, prudké stinné svahy, suťová stanoviště na svazích a hřebetech, chudé mírné až prudké svahy- kambizemě eutrické až oligotrofní, kambizemě rankrové/									
411	smrkové	N,P	100	80-100	30	-	3D9: BK6, JV2, JS1, JL1, SM0-2, JD0-1 3F, 3A, 3B9: SM2-4, JD1-0, BK2-4, MD1, DB2-0, LP1-0, HB 3S9: BO2-4, JD1-0, BK3, KL1, MD1, DB1-2	30% - BK,JD,LP, JV,JS,JL,HB	MD 15
413	borové	N,P	120	110-140	30	-			
415	dubové	N	130	-	30	111			
416	bukové	N,P	130	120-130	40	111			
417	listnaté	N (P)	90	-	30	71			
43 Kyselá stanoviště středních poloh: 3K, 3I 500,81 ha 7,53%									
/kyselá stanoviště na mírných svazích- kambizemě podzolované, podzoly/									
431	smrkové	H,N	100	80-100	30	81	BO7, BK1-4, DB2, JD, HB	25 % - BK JD,LP,DB, HB	---
433	borové	H,N,P	120	110-120	30	101			
435	dubové	H, N	130	-	30	111			
45 Živná stanoviště středních poloh: 3S, 3B, 3H, 3D (bez exponovaných typů) 4419,48 ha 66,49%									
/normální stanoviště-kambizemě mezotrofní až oligotrofní, oglejené, luvizemě/									
451	smrkové	H,N	90	70-90	30	-	BK3-1, DB2-6, JD1-0, MD1-2, LP1-2, KL1, SM1-0, HB, BO, DG 3S: BO6, BK1-3, MD1, DB1-2, LP0-2, HB 3H,B: SM0-1, DB5-6, BK1-3, MD1-2, LP1-2, HB, JD1-0,DG	25 % - BK,JD,LP,JV, JS,JL,DB,HB,TŘ,JDO	MD 20 DG 5
453	borové	H,N	110	-	20	91			
455	dubové	H,N,P	160	-	30	141			
456	bukové	H,P(N)	130	-	30	111			
457	listnaté	H,N,P	90	80-110	30	-			
459	pařezina	H,N	50	-	20	31			
47 Oglejená stanoviště středních poloh: 2O, 3V, 3O, 3P 803,94 ha 12,1%									
/zamokřená stanoviště na plošinách a úžlabinách- prameniště gleje, kambizemě oglejené a pseudoglejové, pseudogleje/									
471	smrkové	H,N,P	100	80-100	30	-	DB6-4, JD0-3, BK2-0, MD1, JV(KL)0-1, SM0-1, LP, DG (na 3V i JS)	25 % - BK,JD,DB,LP,JV JS, JL, HB, JDO	MD 10 DG 5
473	borové	H,N	110	-	30	91			
475	dubové	H,P	150	-	30	121			
477	listnaté	H,N	80	-	30	61			

Vysvětlivky:

- porostní typ: zařazení dle současných porostních skupin podle převládající dřeviny; porosty s převahou **MD,JD,JDO,DG** se zařazují do **SM**; porosty s převahou **VJ, BOČ** do borových; porosty **JV,KL, JL** do bukových; **DBČ** a **ostatní listnáče** do porostního typu listnaté ostatní;

základní doporučení:

- 1 - hospodářský způsob: **H - holosečný, P- podrovní, N - násečný, V - výběrný**
- 2 - doporučené obmýtí /detaily, odchylky a další doporučení jsou uvedeny v jednotlivých HS/
- 3 - rozsah přípustného obmýtí (je uveden u těch porostních typů, kde je více CHS s různým obmýtím)
- 4 - obnovní doba
- 5 - počátek obnovy

-cílová druhová skladba + alternativy: ekonomicky, biologicky i funkčně optimalizované zastoupení dřevin v mýtném věku, které odpovídá přírodním podmínkám souboru. Neodpovídá současnému stavu lesů. **Je uvedena v desítkách procent.** Jsou uvedeny všechny skladby podle základních dřevin cílového souboru. a zároveň poukazují na možnost čistých porostů v případě bk a db. Porosty db a bk by se měly z celospolečenského hlediska obnovovat opět na db a bk. Alternativy pak ukazují další přípustné možnosti volby skladby dřevin v jednotlivých hospodářských souborech v návaznosti na porostní typy.

-meliorační a zpevňující dřeviny: uvedeny **minimální podíly** dle přílohy vyhlášky MZe č.83/1996 Sb. pro jednotlivé cílové HS

-geograficky nepůvodní dřeviny: **uvedeny v % maximální přípustné podíly** introdukovaných dřevin dle požadavku odboru ekologie krajiny MŽP (č.j.548/OEK/98 ze dne 15.7.1998) pro PLO 23 (spodní hranice platí pro prvkyÚSES)

Poznámka: Jedná se o souhrnný modelový přehled celé oblasti. Odchylky a další detailní doporučení včetně funkcí jsou rozvedeny ve vlastních rámcových směrnících hospodaření dle jednotlivých hospodářských souborů. Uvedené výměry cílových HS jsou podle současné výměry SLT v PLO 32.

PLO 33 Předhůří Českomoravské vrchoviny

Přehled základních hospodářských doporučení zastoupených HS

HS	POROSTNÍ TYP (současné porosty)	ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ 12345					CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA - alternativy (desítky %)	MELIORAČNÍ A ZPEVNŮJÍCÍ DŘEVINY (Přil. č.4 k vyhl.č.83/96)	geograficky nepůvodní dřeviny %
13	Přírozená stanoviště: 0C,1M Suché písčité,podzolované půdy							527 ha	
133	borové(smíšené)	P,N,H	110	110-150	20	101	bo 9, db,bk/bř/ 1, sm, -alter.:db 2-6,bo 4-8,nebo bk 2-6,bo 4-8,db,sm	OC-5%-a1M-15%- db,bř,hb,lp,jd	--
19	Lužní stanoviště: 1L,2L, 3U roviny potočních a říčních aluvií,údolní dna,naplavená půda(vespod olejená)							282ha	--
191	smrkové /nevhod./	PH	100	80-110	20	91	db7,js2,lp/jv,oll,tp,hb/1, bb, os,jl,vr db5,jv1,js1-3,lp1,smO-2,jl,tp,bb,orč	15%-1L-2L- db,lp,jl,jv,hb,bb, břek -3U –15%- bk,jv,jl,lp,jd,oll,db	
195	dubové	P,pH	150	130-200	30	131			
197	jasanové	nH,N	90	80-120	20	81			
197	olšové	H	90	70-100	20	81			
198	topolové	H (HH)	30	20-40	10	21			
197	listnaté,ak a ost.nekval.	pH,H	70	50-90	20	61			
21	Exponovaná stanoviště nižších poloh: 1-2 A, C,N , 1-2K9,S9,2B9 strmé,kamenité svahy,vyhraněné půdy(hadec,eklogit)vysýchavé,neproduktivní,erozí ohrožené							8 145 ha	md +-3
213	borové /smíšené/	(np)N, P	110	110-140	20	101	bo 6, db/bk/ 3, /lp,hb,jv,bř/ 1, md, db6, bo3, /bk,lp,hb,jv/ 1,md, bř (ak-10)lp,jv,hb,bř	30 % - C,KN- db,bk,lp,hb,bř,jd -S,A,B- bk,lp,db,hb,jv,js,jl,bb,ts	
215	dubové	P ,pN	130	110-150	30-	111			
217	akátové	(H)N	70	50-90	20	61			
217	listnaté ost.	(H)N	70	50-90	20	61			
23	Kyselé stanoviště nižších poloh: 1 K,S, 2 K,I,S, 2-4M minerálně slabě zásobené, prosýchavé, převážně mělké, písčité, šterkovité půdy							20 272ha	md 1- 4,dg +-1 ,dbč +-1
231	smrkové	nH,N, P	90	80-110	20	81	bo 7, db 2,lp1, bk,hb, md, bř(dg,dbč,sm) db 7, bo1,lp2, bk,hb, bř,md(dbč) bk 7, bo1, /db, lp, hb/2, bř, md (ak-10)	25 %-db,bk,lp,bř,hb,dg,jd	
233	borové /smíšené/	P, pnN, pnH	110	90-130	20	101			
235	dubové	P, p/n/N	130	110-150	30	111			
235	dubové nekval.(nepr.kmen.)	pnH, (pP)	100	80-120	20	91			
236	bukové + jv,lp	P, (pN)	130	120-140	40-	111			
237	listnaté ostatní a nekval.	H, pH	70	60-90	20	61			
237	akátové	H	70	50-90	20	61			
25	Živná stanoviště nižších poloh: 1-2 B, H,D mírné a střední svahy,plošiny,hlinité,slabě šterkovité								
251	smrkové	nH,nN	90	80-110	20	81	db 7-8, lp2 (bk ,hb ,jv ,js ,jd , md)1-2 , ol, sm, bo(jdo,dg)	20 % - db,bk,lp,hb,jv,js,jl,jd,jdo,tř, břk,bb,	
253	borové,smíš.	npN,n pH	110	80-120	30-	91			
255	dubové	nP, pN (pH)	140	130-200	30-	121			
255	dubové nekval.a ost.l.	pN,pH	100	100-130	30	81			
257	akátové (a výml.nekval.)	pH	70	50-90	20	61			
27	Oglejená chudá stanoviště nižších poloh:1-2O 1 Q, 2 P , 4Q chudé hlíny; podzolové pseudogleje, glejové podzoly								
271	smrkové	(n),N	100	80-110	20	91	alt.: sm 2-4, db/jd,bk,bř/ 2, bo 4-6	20 % - db,bř,jd,os,bk,sm,vj	

273	borové	(n)H (P),nN ,(nH)	120	110-140	30	101	bo 7, db/jd,bk,bř/ 2, sm 1, md, os,(jdo)	md,jv,js,jl	
29 Olšová stanoviště podmáčených půd: 1T, 3L ,5L							184 ha	--	
<i>trvale zamokřené (zbahnělé) půdy - gleje, mokřady, prameniště, aluvia, (břehové porosty)</i>									
297	olšové /smíšené/	/n/N, /n/H	90	80-100	20	81	ol 6, js 3, sm/vr,bř/ 1, os, db, jv,vr	75%-1T-os,bo;sm, 1T9-65%-db,bř,ol	----
298	topolové	H	40	20-40	10	31	alt.: ol 7-10, sm 0-3, /bř,jv,dbl/ 0-3; tp 10	70%-3L a 5L-sm,jv,ol	
3 1 Vysýchavá bazická stanoviště středních poloh: 3 - 4C							658 ha	svahy,	md 15-20
<i>hřbítky, kamenité svahy, mělčí ohrožená půda, pararendzin</i>									
311	smrkové	pN	100	80-110	30-	81	-bo 5 db/bk/ 3, /lp,,md ,jv,bř/ 2, md,sm,bb -db 0-3,bk 5-8,jv 0-2,lp 0-1,sm,jd,bo,hb, m d 0-2, js,jl Alter.:bk 6,db 1,lp 1,jv 1,sm ,bř,jd ,hb	30 % - db,bk,lp,hb,jd,jv,břk,tř	
313	borové	nN	120	110-140	30	101			
315	dubové	pN	130	120-140	30	111			
35 Živná bazická stanoviště středních poloh: -3 4 W							84 ha		md 9-15,jdo 1-3
<i>minerálně středně zásobené, vlhkostně příznivé půdy (karbonátové)</i>									
351	smrkové	nN,nH	100	80-100	30	81	bk 7,db 2,(md,lp,jv,)1,jd,kl,js,břk,sm,(jdo)	70 % - bk,db,lp,jv,jd,js,jd,jl,hb,břk, tř	
356	bukové + jv,kl,lp	(pN), (H)	130	120-140	40-	111			
357	listnaté ostatní	N,H	70	50-90	20	61			
39 Podmáčená stanoviště nižších a vyšších poloh 5T								4 ha	
<i>Sníženiny ,plochá dna úvalin se stagnující vodou(rašel,glej(až semiglej)</i>									
391	smrkové	P,N	110	90-120	30	91	Sm 8,jd 1,ol 1(bř+)		
41 Exponovaná stanoviště středních poloh: a/ kyselá: 3 - 4N,K9; b/ živná: 3 - 4A,F, S9,B9, 3D7,4D4							5 366 ha		md 8-10 ,dg +-2
<i>prudké či kamenité svahy</i>									
411	smrkové	nP,nN pN,nP	110	100-130	30	91	sm 6, bk2,kl1(jd,md,lp) 1, bo,bř,js bř	30% - bk,lp,jd,db,dg	
413	borové	pP,(p n)N,	120	110-140	30	101	bo 6, /bk,lp,db,jd/ 3, sm/md,bř/ 1, jř	/3-4A,F,S9,B9,(3D7,4D4)-	
417	listnaté nekval.	N,pN	80	70-90	20.	71		bk,jd,jv,js,lp,hb,dg	
43 Kyselá stanoviště středních poloh: 3 - 4K,I							11 312 ha		md 6-10 ,dg 3-5 ,jdo +-3
<i>minerálně slabé, propustné, převážně šterkovité, příznivé vlhké půdy, kat..I hlinité uléhavé</i>									
431	smrkové	n(p)P, n(p)N, n(p)H	110	100-130	40-	91	sm 7, bk 2, /lp,jd,bř,bo,md/ 1,hb,jv,bř,(dg,jdo)	25 % - db,bk,lp,jd,hb,dg	
433	borové	nP,nH,	120	110-140	30-	101	bo 7, db/bk/ 2, /lp,sm,bř/ 0-1		
437	listnaté a nekval.	(p)H,(pN)	70	60-80	20.	61	alt.:db 7,/bk,jv,lp,jd,)3,bř,sm,bo alt.:bk7,(db,lp,jv,jd)3,bř,sm,bo		
45 Živná stanoviště středních poloh: 3 - 4S,H,B,D							42 045 ha		md 8-10 ,dg 3-7
<i>minerálně středně zásobené, vlhkostně příznivé půdy, silně zabařenělé, kat. S méně</i>									
451	smrkové(smiš.)	n(p)P, n(p)N n(p)H	100	100-120	40	81	sm 6, bk 2,jd1,md1, jv,js, dg,lp,db,jl,bř	25 % - bk,db,lp,jv,jd,js,	jl,hb,tř,jdo,sm
453	borové(smiš.)	nN,nP, nH	110	90-120	20	101	bo6,db2,(bk,lp,jd,kl)2md		
455	dubové	nPN (pH)	140	110-180	30	121	db 7, kl 1, /bk,jv,lp,md,sm/2, bř		
456	bukové + jv,kl,lp	P,(pN) ,pH	130	120-150	40	111	bk 7, sm 1, /db,lp,jd,kl,bo,md/ 2, bř,dg		
457	listnaté ostatní /bř,ol/	(p)N, (p)H	70	50-90	20	61			
47 Oglejená stanoviště středních poloh: 3 - 4O, V, 4P							2 406 ha		md 10-15 ,dg +-2 ,boč+
<i>plošiny občas zamokřované; oglejené půdy, pseudoglej; potočiny/</i>									
471	smrkové(smiš.)	(pN), pP	110	100-130	30	91	sm 6-7, jd 2, /bk,db,lp,js,bř,bo,md/ 1-2 ,(boč)dg	25%--3 OV,4V- jd,bk,dbl,jv,js,jdo,lp,jl,hb	

									- 4P/ - jd,bk,dbl,jdo,lp,os,bř	
51	Exponovaná stanoviště vyšších poloh: a/ kyselá: 5N,K9, b/ živná: 5 A,5S9,c:5U							219 ha		md 5-8 dg+-1
	<i>prudké či kamenité svahy, sutě; kambizem – rankerová(potoční aluvia-5U)</i>									
511	smrkové	nP,N	120	110-130	40-	101	sm 6, bk 2, kl 1/jd,lp,md/ 1,bo,jl,bř,jř	30 % - bk,jd,jv,lp,dg (5-,S9,B9)+ js,jl		
53	Kyselá stanoviště vyšších poloh: 5 K ,I							458 ha		--
	<i>vlhkostně příznivé, minerálně slabě zásobené,šterkovité až kamenité půdy</i>									
531	smrkové + jd	nP,N,n H	110	100-130	40-	91	sm 7, bk 2, /lp,bo,jd,md/ 1, jv,lp	25 % - bk,jd,lp,dg		-
55	Živná stanoviště vyšších poloh: 5 S,H,B ,D							943 ha		md 8- 10 ,dg 1-5 ,jdo +- 3
	<i>středně bohaté až bohaté hlinité až slabě šterkovité půdy</i>									
551	smrkové + jd	nN,nP, nH	110	100-130	40-	91	sm 7, bk 2, /jd,lp,kl,md/ 1,js (dg, jdo)	25 % - bk,jd,lp,js,kl,jl,jdo,tř		
57	Oglejená stanoviště vyšších poloh: 5 P,O,V							835 ha		md 3-5 ,jdo 3-5
	<i>střídavě zamokřené uléhavé půdy, oglejené, pseudogleje</i>									
571	smrkové	pP ,pN	100	100-130	40	81	sm 7, jd 2(jv,lp,js,bř,os,bo,,ol, jl, md)1 ,jdo	25 % - 5V -bk,jd,js,jl,lp,jdo -5OP-bk,jd,bř,os,jdo		
59	Podmáčená stanoviště středních a vyšších poloh: 2,4 - 5G ,5R							84 ha		--
	<i>humózní gleje a semigleje, , poklesliny se stagnující vodou; gleje, rašelinná půda</i>									
591	smrkové	pP,pN	100	90-120	40-	81	sm 8, jd 1, (db,lp,ol,js,jv,os,bř,bk)1	20% -2,4 G- , db,lp, oll,,os, 15%-5G-jd,bk,jv,ol,os R-5%,bř,jd		----
01	Mimořádně nepříznivá stanoviště:0X, 0Z,1 +4 X,1-4Z,3Y,3J,5J							3 844 ha		
	<i>/srázy, skalnaté svahy, sutě, hřbety s mělkou půdou; litozem, ranker, rašelina/</i>									
011	smrkové	N(VP)	130	120-150	40	111	podle stanoviště - SLT bo 6,db 2,bk 1,sm 1, bř,lp, db 2-8,jv 1-3,lp 0-2,bř0-1,bk 1-4, sm,/jd,bo0- 2 bk 1-6,db 0-3,bo 0-2,bř 0-1, ,jv 0- 3,js,lp,sm,hb	0Z -5%-bk,bř,db,jd 0X-10%- bk,db,hb,lp,dbp,břk,mk,bb	---	
013	borové /smiš./	V,P,N	150	150-∞	∞	--				
015	dubové/smiš./,bb,hb	V,P,N	150	150-∞	∞	--				
016	bukové/smiš./,jv,lp,js,jl	V,P,N	150	150-∞	∞	--		1X-90%- db,dbp,hb,lp,bb,břk,mk,jv,js , jl 4X-80 %- bk,db,lp,hb,jv,jl,břk,mk,bb,t s 1Z-70%,2Z-60%,3-4Z-40%- db,bk,lp,bř,jd,hb,břk,mk 3Y-30%-bk,db,jd,bř 5Y-30%-bk,jd,bř,jř,jv 3J-90%- bk,jv,lp,db,jd,hb,js,jl,břk,mk ,ts 5J-60%-bk,jv,jd,jl,lp,js		

PLO 34 HORNOMORAVSKÝ ÚVAL

Přehled základních hospodářských doporučení zastoupených HS

ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ DOPORUČENÍ PLO 34 – Hornomoravský úval

11 166 ha

HS	POROSTNÍ TYP (současné porosty)	ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ 12345					CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA - alternativy (desítky %)	MELIORAČNÍ A ZPEVNŮJÍCÍ DŘEVINY (Přil. Č.4 k vyhl.č.83/96)	Geografic. Nepůvodní dřeviny %
19 Lužní stanoviště: 1L, 1U, 1G5, 2L, 3U								7535 ha 70,7%	
/aluviální naplaveniny; fluvizemě, kambizemě a gleje/									
195	DB kval. (smíšené)	(n)H, (n)N	150	130 – 200	30	131	DB 7, JS 2, (LP,HB,JV, JL) 1, OL, TP, VR, TR, BB, JB, HR, ORČ, OS, BŘ	15 % - LP,JV,JL,HB,BB, DB	ORČ + - 1
191	SM nevhodné	N, H	80	80 – 110	30	61			
193	BO nevhodné	H	80	80 – 110	30	61			
190	OL, OL smíšené	H,N	80	70 – 100	20	71			
197	JS + listnaté smíšené	(n)N, (n)H	110	80 – 120	30	91			
198	TP	H	40	20 – 40	10	36	/1U/: TP 10, OL, VR, JS, JL, LP, OS	+ % - VR,OL,OS	TPK jen v ligni - kultu – rách
21 Exponovaná stanoviště nižších poloh: 2N, 2A, 2C								29 ha 0,3%	
/droba, vápenec, jílovité břidlice; kambizemě, rendzina/									
215	DB	(p)N, (P)	130	110 – 150	30	111	DB 6, LP 2, HB 1, (BO, MD) 1, BK, JV, BŘ, JS	30 % - BK, DB, LP, HB, BŘ, JV, JS, JD	MD 3-5 BO + -5 BOČ+-1
213	BO	(n)N	120	110 – 140	30	101			
217	listnaté ostatní + AK	N	70	60 – 90	20	61			
23 Kyselá stanoviště nižších poloh: 2K, 2I, 2S								428 ha 4,0%	
/chudší překryvy droby a jílovitých břidelic; kambizemě, luvizemě/									
235	DB	P,pN	130	110 – 150	30	111	DB 6, BO 3, (BK, LP, MD) 1, BR, HB, DG, VJ	25 % - BK, LP, HB, DB, JD, BŘ, DG	MD 3-5 DG +1 VJ +1 BO10-30
231	SM nevhodné	nN,nH	100	80 – 110	20	91			
233	BO	P,nN	110	90 – 130	30	91			
237	listnaté ostatní + AK	H	70	60 – 90	20	61			
25 Živná stanoviště nižších poloh: 2B, 2D, 2H, 2O, 1V								2015 ha 19,0%	
/sprašové překryvy, kulmská droba, jílovité břidlice; kambizemě, luvizemě, hnědozemě, pararendziny/									
255	DB	(p)N, (p)H	150	130 – 200	30	131	DB 7, LP 2, (HB, JV) 1, BK, JS, JL, TR, BŘ, MD, BB, OL, OS, JD, DG, JDO	20 % - BK, LP, HB, JV, JS, JL, JD, TR, BB, DB, JDO	MD +5 DG 1-5 JDO+2 KS +
251	SM	N,H	100	80 – 110	20	91			
253	BO	N,H	110	80 – 120	20	101			
250	HB smíšené	H,N	110	100 – 130	30	91			
257	listnaté ostatní	H,N	70	50 – 90	20	61			
29 Olšová stanoviště na podmačených půdách: 1G, 2V9, 3L									
/aluviální naplaveniny; gleje,fluvizemě/									
290	OL, OL s VR	N	70	60 – 90	20	61	OL 8, TP 1, VR 1, JS, OS, DB, JL, JV	70 % - OL, VR, JV	
297	OL s JS	(p)N	90	80 – 100	20	81	/2V9, 3L/: OL 6, JS 3, JV 1, VR, BŘ, OS, DB, JL		
298	TP s VR,OL	H	40	30 – 50	10	36	/1G mimo 1G5/: TP 6, OL 2, VR 2, JS, OS		
41 Exponovaná stanoviště středních poloh: 3A, 3D9								3 ha +%	
/vápenec; hlíny a deluviální hlíny; pararendziny, kambizemě/									
416	BK	P, nP, (N)	130	120 – 150	40	111	BK 6, KL 2, LP 1, (MD, DB, JS) 1, SM, DG, JDO	30 % - BK, JD, JV, JS, JL, LP, HB, DG	
417	listnaté ostatní /LP/	N	90	70 – 90	20	81			
411	SM smíšené	pP, nP, nN	110	100 – 130	30	91			
45 Živná stanoviště středních poloh: 3H, 3S, 3B, 3D								281 ha 2,6%	
/sprašové překryvy, droba, jílovité břidlice; kambizemě, luvizemě/									
455	DB	N, H	140	120 – 150	30	121	DB 6, BK 2, (LP, HB) 1, MD 1, BO, JS, JV, JD,JL, TR, DG, JDO	25 % - BK, JD, LP, JV, JS, JL, DB, JDO, HB, TR	MD 5-10 DG +1 JDO +
457	listnaté ostatní + AK	N, H	70	60 – 80	20	61			
451	SM (smíšené)	nN, nP nH	100	90 – 120	30	81			

456	BK	P, (pN)	130	120 - 150	40	111	BK 8, DB 1, HB 1, LP, JV, TŘ, MD, BO		
47 Oglejené stanoviště středních poloh: 3O, 3V <i>/hlíny, deluviální a svahové hlíny; kambizemě, gleje/</i>								34 ha 0,3%	
475	DB	n(p)P, nH, nN	150	140 - 180	30	131	DB 6, BK 2, (LP, HB) 1, JD 1, SM, MD, JS, KL, JL	25 % - BK, JD, DB, LP, JV, JS, JL, JDO, HB	MD 5- 10 DG ±1 JDO +
471	SM	pP, pN, (pH)	100	100 - 130	30	81	SM 5, DB 2, JD 1, BK 1, (LP, KL, JS, MD) 1, BO, OL		
477	OL (smíš.)	(p)N	70	60 - 80	20	61	OL 4, SM (BO) 3, DB 2, (JS, KL, JD, LP) 1, JL, OS		
01 Mimořádně nepříznivá stanoviště: 3J <i>/vápenec ; rendziny/</i>								0,2ha +%	
016	JV s BK	V (P)	150	150 - f	∞		JV 5, LP 3, BK 2, JS, JL, DB, HB	25 % - BK, JV, LP, DB, JD, HB, JS, JL	

PLO 35 - JIHOMORAVSKÉ ÚVALY

Přehled základních hospodářských doporučení zastoupených HS

HS	POROSTNÍ TYP (současné porosty)	ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ 12345					CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA - alternativy (desítky %)	MELIORAČNÍ A ZPEVNŮJÍCÍ DŘEVINY (Přil. č.4 k vyhl.č.83/96)	geograficky nepřívodní dřeviny %
13 Přirozená borová stanoviště: 1 M 175 ha+ % suché písčité,specifická stanoviště v oblasti vátých písků									
133	borové /smíšené/	nP, N,(H) (HH)	120	110-140	20	111	bo 8, db,bk/bř/ 2,dbč, md,lp,vj,dbč	1M:15%- DB,BŘ,HBLP,JD,DBČ	MD+-5 DBČ+-2 VJ+-2 BOČ+
137	listnaté ost. /bř,ak/	nH (HH)	70	40-80	20	61			
19 Lužní stanoviště: 1L,2L,1U, 14 037 ha37 % úvaly řek,roviny potočních aluvií,údolní dna,naplavená půda(vespod oglejená)									
195	dubové(+slavonský) kvalitní	nH, H (HH)	140	130-200	30	121	db7,js2,lp/jv,oll,tp,hb/1, bb, os,jl,vr,	15% -1L-db,lp,jl,jv,hb,bb, břek,bk 1U-jl,lp,oll,vr,os,db	ORČ+- 1,TPK+ (ad 1) viz pozn.
195	dubové nekvalitní + ost.list.(nepravé kmen.)	nH (HH)	110	80-130	20	101			
197	jasanové a smíš.s převahou js	nH,H (P,HH)	90	80-120	20	81			
197	akátové,list.nekval.	H,nH (HH)	70	50-90	20	61			
197	olšové	pH (HH)	90	70-100	20	81			
197	vrbové /nekval./	pH (HH)	40	20-40	10	31			
198	topolové	H (HH)	30	20-40	10	21			
21 Exponovaná stanoviště nižších poloh: 1 AC,2 CN,1K9, 1D9,2H9 , 306 ha1 % slunné vysychavé svahy, strmé,kamenité,erozí ohrožené									
213	borové (smíšené)	nN	110	110-140	20	101	bo 6, db/bk/ 3, /lp,hb,jv,bř/ 1, md(ak) db6,bo3,lp1,hb,jv,bk,md(ak) db8,lp2,bo,bk,hb,jv,bř (ak 10)	30 % - 1-2C, K9 2a-db,bk,lp, hb,jd,bř, 1A,2H9- bk,db,lp,jv,hb,jl,jd,bř,ts,bb,dg js,břk,ts	MD+- 3,DG+, BOČ+
215	dubové	P,pnN	130	110-150	30	111			
217	listnaté ost. /bř,js,bb,hb/	pnN,P	70	50-90	20	61			
217	akátové	(n)N	70	50-90	20	61			
23 Kyselá stanoviště nižších poloh: 1 K,S, 2S 14 372ha38 % minerálně slabě zásobené, prosýchavé,neogenní šterkopísky,ždánické odvápněné pískovce,váté písky									
233	borové /smíšené/	npN (n)pH	100	90-130	20	91	bo 7, db 2, /bk,lp,hb/ 1, md, bř db7, bo2, /bk,lp,hb,/1, bř db8,lp2,bobk,hb,jv,bř,md cer 8, bo1, lp1 (ak 10)	25%-bk,db,lp,hb,jd,bř	MD+-5 DBČ+-1 DG+-1, VJ+-1
235	dubové(smiš.)	P,(n) pH, pN	110	110-150	20	101			
235	cerové	P,pN, (n)pH	100	80-120	40	81			
237	listnaté ostatní /br,hb)	nH,pH	70	60-90	20	61			
237	akátové a smíš.s převahou ak	pnH,H , pN	70	50-90	20	61			
25 Živná stanoviště nižších poloh: 1-2 B, H,D,1V 8246 ha22 % mírné a střední svahy, plošiny, bohaté podloží(spraš,sprašová hlína)teplých poloh									
253	borové(smiš.)	nN,nH	110	80-120	30-	91	db 8, lp/bk,hb,jv,js,jd/ 2, md, ol, bo,bb,jdo,(vj) (db 10)	20 % - db,bk,lp,hb,jv,js, jl,jd ,tř,břek,bb	MD+-5 JDO+-5 DG+-5 VJ+-1
255	dubové /průměr/	nP,pN, pH	140	130-200	30	121			
255	dubové nekvalitní + list.ost.(js , jv,lp a j.)	pN,pH	110	100-130	30	91			
257	listnaté ostatní nekval.,hb,bř,jvj)	pH, (pN)	70	50-90	20	61			
257	akátové a smíš. s převahou ak	H,pH, pN	70	50-90	20	61			
27 Oglejená chudá stanoviště nižších poloh: 1 P , 43 ha+ % mírné úpادلiny na plošinách nižších poloh,střídavě zamokřené váté písky									
273	borové	nN,H, P	120	110-130	30	101	bo 7, db/jd,bk,bř/ 3, md, jdo, os,sm	20 % - db,bř,jd,os,bk,vi,os,	SM5-10 MD5-10 JDO+-1 VJ+-3
275	dubové	P,pN, (nH)	130	110-140	30	111	db7, bo2, /bř,jd)1, os,md,sm		

277	listnaté ostat.(bř,os,ol)a jiné	nN,H	70	60-90	20	61			DBČ +
29 Olšová stanoviště podmáčených půd: 1G,1T							457 ha	1 %	
Sníženiny úvalových a údolních plošin, aluviální náplavy, glej, semiglej									
297	Olšové /smíšené js a j.)	pN,N	90	80-100	20	81	ol 6, js1- 3, /vr,bř/ 1 -3, os, db, jv	90%-1G-ol, vr; 75%-1T-ol, bř;	SM+-5 TPK+ (ad1) viz pozn.
298	Topolové	H	30	20-40	10	21	(tp 10)		
297	Vrbové	nN,H	40	20-40	10	31	ol6, vr3, (tp, sm, js, bř.) 1(1G)		
45 Živná stanoviště středních poloh: 3HD							60ha	+ %	
Minerálně středně zásobené, vlhkostně příznivé půdy, silně zabařenělé, kat. S méně									
455	Dubové	nP,N, (pH)	140	110-180	30	121	db 5, lp 2, bk2, jv1, bř	25 % - bk, db, lp, jv, jd, js, jl, hb, tř	JDO+-5
456	bukové + jv, kl, lp	P, (pN)	130	120-150	40	111	bk 4, db2, lp2, jv2, , bř		
457	listnaté ostatní /bř, ol/	(p)N, (p)H	70	50-90	20	61			
01 Mimořádně nepříznivá stanoviště: OX, 1Z, X, J, 3J							532 ha	1 %	
/srázy, skalnaté svahy, sutě, hřbety s mělkou půdou;									
013	borové /smiš./	V, P, N	150	150- ⁻⁻⁻	∞	--	podle stanoviště-SLT bo 6, db 2, bk 1, bř, lp1,	OX-10%- bk, db, hb, lp, dbp, břk, mk, bb	
015	dubové /smiš./, bb, hb	V, P, N	150	150- ⁻⁻⁻	∞	--	db 2-8, jv 1-3, lp 0-2, bř0-1, bk 1-4,		
016	bukové /smiš./, jv, lp, js, jl	V, P, N	150	150<	∞	--	jd, bo0- 2 db 6, dbp3, hb 1, jv, js, jl, lp, mk, bř, bb bk 1-6, db 0-3, bo 0-2, bř 0-1, , jv 0-3, js, lp, hb	1Z-70%- db, hb, lp, br, břk, mk, 1X- 90%- db, dbp, hb, lp, bb, břk, mk, bř jv, js, jl, 1J-95%- db, jv, hb, lp, jl, břk, mk, bb, ts, tř, js, 3J-90%- bk, jv, lp, db, jd, hb, js, jl, bř, m k, ts	

Vysvětlivky:

- porostní typ: zařazení dle současných porostních skupin podle převládající dřeviny; porosty s převahou md, jd, jdo, dg se zařazují do sm; porosty s převahou vj, boč do borových; porosty lp, jv, kl, jl do bukových; dbč do dubových; ostatní listnáče do porostního typu listnaté ostatní
- základní doporučení:
1- hospodářský způsob: H - holosečný, P- podrovní, N - násečný, V - výběrný
2- doporučené obmýty /detaily, odchylky a další doporučení jsou uvedeny v jednotlivých HS/
3- rozsah přípustného obmýty
4- obnovní doba
5- počátek obnovy
- cílová druhová skladba + alternativy:
ekonomicky, biologicky i funkčně optimalizované zastoupení dřevin v mýtném věku, které odpovídá přírodním podmínkám souboru. Neodpovídá současnému stavu lesů. Je uvedena v desítkách procent. Jsou uvedeny všechny skladby podle základních dřevin cílového souboru. a zároveň poukazují na možnost čistých porostů v případě bk a db. Porosty db a bk by se měly z celospolečenského hlediska obnovovat opět na db a bk. Alternativy pak ukazují další přípustné možnosti volby skladby dřevin v jednotlivých hospodářských souborech v návaznosti na porostní typy. Detaily, odchylky a další doporučení jsou uvedeny v jednotlivých rámcových směrnících HS
- meliorační a zpevňující dřeviny:
uvedeny minimální podíly dle přílohy vyhlášky č.83/1996 Sb. pro jednotlivé cílové HS
- geograficky nepůvodní dřeviny:
je doplněno dle stanoviska odboru ochrany přírody MŽP ČR (maximální přípustné podíly v %)
--ad1: poznámka-pokud se nevyskytuje spolu s domácím P. Nigra.
--ad 2: poznámka pro celou tabulku a to sloupec „geograficky nepůvodní dřeviny“: U porostů s výskytem AK je nutno stabilizovat jeho výskyt , zejména omezováním samovolného šíření do okolních dosud nezasazených porostů.
U čistých AK porostů (plantáží) v CHS 21, 23 a 25 udržovat přístupnou hranici pro průběžné tlumení expanze AK do okolních porostů. Hranice čistých AK porostů v sousedství jiných porostů udržovat v zapojeném odrůstajícím stavu za účelem zastínění. AK redukovat na místech s výskytem cenných zbytků původních lesních společenstev. Stanoviště nevhodné AK porosty převádět na cílovou druhovou skladbu odpovídající stanovišti. Stávající výměru akátů nerozšiřovat umělou obnovou. Zvážit ponechání akátových monokultur na pozemcích nevhodných pro jiné lesnické využití v režimu lesního zákona, nebo převedení těchto monokultur na lignikultury.
TPK nevysazovat v LHC, ve kterých je zaznamenán výskyt autochtonního topolu černého (P. nigra). V takovém případě je možné vysazovat pouze pestíkové klony hybridních TPK pro vyloučení křížení. Čistě topoliny a čisté porosty ORČ jsou nežádoucí, zejména ve všech skladebních prvcích územních systémů ekologické stability.
Pro umělou obnovu TPC je vhodné používat geneticky prověřené a uznané jedince, získané generativní cestou v poloprovozních podmínkách VÚOZ Průhonice ve spolupráci s VÚLHM Uherské Hradiště.“
Na území CHKO Pálava není užití geograficky nepůvodních druhů dřevin doporučováno. Porosty s výskytem akátu a pajasanu žlázkatého budou přednostně přeměňovány.

PLO 36 Středomoravské Karpaty

Přehled základních hospodářských doporučení zastoupených HS

38 447,74 ha

HS	POROSTNÍ TYP (současné porosty)	ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ 12345					CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA - alternativy (desítky %)			MELIORAČNÍ A ZPEVNŮJÍCÍ DŘEVINY (Přil. č.4 k vyhl.č.83/96)	Geografic. nepůvodní dřeviny %	
19	Lužní stanoviště: 2L, 3U 2L: DB 6, JS 2, JV 1, LP 1, JL, OLL, TP, HB, VR, OS 3U: JS 4, DB 3, BK 1, JV 1, LP 1, JL, OLL /aluviální naplaveniny,naplavená půda, štěrkopísek, hlína - fluvizem, glej/										212,50 ha 0,55%	
191	smrkové	pH	100	80-120	20	91	---			15 % - 2L: LP, JV, HB, BB, DB, BŘK, JL 3U: BK, JV, JL, LP, JD, OLL, DB	---	
195	dubové	pH, P	160	130-200	30	141	DB 10					
197	listnaté	pH,pN	90	80-130	20	81	Podle základní cílové skladby alt. JV, KL, JS					
198	topolové	H	40	20-40	10	31	Podle základní cílové skladby alt. JV, KL, TP					
21	Exponovaná stanoviště nižších poloh: 1N, 1C, 1X1, 1H6, 1H7, 2N, 2A, 2S9, 2B6, 2B9, 2H9, 2D9, 3C DB 8, BO 1, HB 1, BK, LP, MD, BOČ /jílovce, pískovce, slínovce, spraš, sprašová hlína - ranker, kambizem, hnědozem/										726,35 ha 1,89%	
213	borové	nN,pN	120	110-140	20	111	DB 6, BO 3, HB 1, BK, LP, MD BO 5, DB 3, HB 1, BK 1, LP, MD			30 % - N,C: DB, BK, LP, HB, JD, BŘ ost. SLT: DB, BK, LP, HB, JD, JV, JS, JL, BŘK, BB, TS	MD + -3 BOČ +	
215	dubové	P,pN	130	110-150	30	111	DB 8, BK 1, HB 1, LP, BŘ, BO, MD 1X1, 1H6, 1H7: DBP 1					
215	dubové (nekvalitní)	(p)N	110	80-120	20	101	DB 8, BK 1, HB 1, LP, BŘ, BO, MD 1X1, 1H6, 1H7: DBP 1					
217	listnaté	(p)N	110	80-120	30	91	BO 5, DB 3, HB 1, BK 1, LP, MD					
219	les nízký	(p)N	90	80-120	20	81	BO 5, DB 3, HB 1, BK 1, LP, MD					
23	Kyselá stanoviště nižších poloh: 2I, 2K DB 8, BO 1, BK(HB, LP) 1, MD, BŘ, DG, DBČ /jílovce s pískovci, sprašová hlína – kambizem, hnědozem, luvizem/										396,00 ha 1,03%	
231	smrkové (nevhodné)	nH	100	80-110	20	91	BO 6, DB 3, LP(BK, HB) 1, MD, BŘ, DG, DBČ			25 % - DB, BK, LP, HB, JD, BŘ, DG	MD + -3 DG + -1 DBČ + SM +	
233	borové	p(n)H, N, pP	110	90-130	20	101	BO 6, DB 3, LP(BK, HB) 1, MD, BŘ, DG, DBČ					
235	dubové	P, p(n)N	130	110-150	30	111	DB 8, BK 1, LP 1, HB, BŘ, BO, MD					
235	dubové (nekvalitní)	p(n)H	110	80-120	20	101	DB 8, BK 1, LP 1, HB, BŘ, BO, MD					
237	listnaté	H,pH	100	80-120	30	81	BO 5, DB 3, HB 1, BK 1, LP, MD					
239	les nízký	H,pH	90	80-120	20	81	BO 5, DB 3, HB 1, BK 1, LP, MD					
25	Živná stanoviště nižších poloh: 1H, 1D, 1P, 2S, 2H, 2B, 2D DB 6, BK 2, HB 1, MD 1, LP, JV, JS, JL, TR, BŘK, BB, BŘ, BO, DG, JDO /jílovce s pískovci, spraše, sprašové hlíny, svahové hlíny - kambizem, hnědozem/										12 977,78 ha 33,76%	
251	smrkové (nevhodné)	nN,nH	100	80-110	20	91	BO 6, DB 2, BK 1, LP 1, HB, MD, JV, JL, DG, JDO			20 % - DB, BK, LP, HB, JV, JS, JL, JD, JDO, TR, BŘK, BB	MD 5-10 DG + -4 JDO + -2 SM +	
253	borové	pN,pH	110	80-120	20	101	BO 6, DB 2, BK 1, LP 1, HB, MD, JV, JL, DG, JDO					
255	dubové	nP,pN pH	140	130-200	30	121	DB 7, BK 2, LP 1, HB, MD, JV, JL, TR, BB, BŘK					
255	dubové (nekvalitní)	pN,pH	120	100-130	20	111	DB 7, BK 2, LP 1, HB, MD, JV, JL, TR, BB, BŘK					
257	listnaté	p(n)N, p(n)H	100	100-130	30	81	DB 7, BK(LP) 1, MD 1, HB 1, KL, TR, BŘK, BŘ					
259	les nízký	nN,nH pN,pH	90	80-120	20	81	DB 7, BK(LP) 1, MD 1, HB 1, KL, TR, BŘK, BŘ					
29	Olšová stanoviště na podmáčených půdách: 1T, 3L 1T: OLL 9, BŘ 1 3L: OLL 8, JS 2, JV, KL, VR, OS, BŘ /slatinná rašelina, aluviální naplaveniny - organozem, fluvizem, glej/										207,78 ha 0,54%	
291	smrkové	N	100	80-100	20	91	alt. SM 1 - 3			70% - 1T: OLL, BŘ, DB 3L: OLL, JV	---	
295	dubové	N	160	130-200	30	141	alt. DB					
297	olšové	pN	80	60-80	20	71	---					
297	olšové s JS	pN	90	80-100	20	81	---					
298	topolové	H	40	30-50	10	31	Přeměna druhové skladby					

HS	POROSTNÍ TYP (současné porosty)	ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ 12345					CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA - alternativy (desítky %)	MELIORAČNÍ A ZPEVŇUJÍCÍ DŘEVINY (Přil. č.4 k vyhl.č.83/96)	Geografic. nepůvodní dřeviny %
41	Exponovaná stanoviště středních poloh: 3A, 3N, 3K9, 3S9, 3B9, 3D9, 3H9, 4D9, 3B6, 4B6 3N, 3K9: BK 8, BO 1, DB 1, LP, MD, SM Ost. SLT: BK 7, KL 1, DB 1, LP 1, JS, JV, JL, TŘ, BŘK, MD, SM /pískovce, jílovce, svahové hlíny - kambizem, ranker/							1 916,42 ha 4,98%	
411	smrkové	pN,pP nN,nP	110	100-130	30	91	SLT 3N, 3K9: BK 5, SM 3, BO 1, MD 1, DB, LP, BŘ BO 5, BK 3, MD1, DB 1, LP, BŘ Ost. 3.lvs: BK 5, SM 3, KL 1, MD 1, DB, HB, JS, JL	30% - 3N, 3K9: BK, JD, LP, DB Ost.: BK, JD, JV, JS, JL, LP, HB	MD 5-10 SM 10-30
413	borové	pN, nN, P	120	110-140	30	101	SLT 3N, 3K9: BO 5, BK 3, DB 1, MD 1, LP, BŘ Ost. 3.lvs: BO 5, BK 3, KL 1, MD 1, DB, HB, JS, JL		
416	bukové	pN,pP	130	120-150	30	111	SLT 3N, 3K9: BK 8, DB 1, MD 1, LP, BŘ Alt.: BK 10 Ost.3.lvs: BK 7, KL 1, DB 1, LP 1, JV, JS, JL, MD, BŘK		
417	listnaté	N, (P)	100	90-110	30	71	BK 7, DB 1, LP 1, JS 1, KL, JL, JV, MD, BŘK		
419	les nízký	pH,nN	90	90-110	20	81	---		
43	Kyselá stanoviště středních poloh: 3K, 4K BK 8, DB 1, MD 1, SM, BO, LP, HB, BŘ, DG /jílovce, pískovce - kambizem, podzol/							691,90 ha 1,80%	
431	smrkové	n(p)N, n(p)H, n(p)P	110	100-130	30	91	BO 5, BK 3, DB 1, MD 1, LP, HB, BŘ, DG 4.lvs: SM 5, BK 3, DB, 1, MD 1, LP, HB, BŘ, DG	25 % - DB, BK, LP, JD, HB, DG	MD 5-10 DG 1-4 SM 20-50
433	borové	nP,nH	110	100-130	20	101	BO 5, BK 3, DB 1, MD 1, LP, HB, BŘ, DG 4.lvs: SM 5, BK 3, DB, 1, MD 1, LP, HB, BŘ, DG		
435	dubové	nP,nN	140	110-140	30	121	DB 8, BK 1, BO 1, LP, HB, BŘ, MD BK 7, DB 2, BO 1, LP, HB, BŘ, MD		
436	bukové	P, pN	130	120-150	30	111	BK 8, DB 1, MD 1, LP, HB, BŘ alt. BK 10		
439	les nízký	pH,nN	90	90-110	20	81	---		
45	Živná stanoviště středních poloh: 3S, 3B, 3H, 3D, 4S, 4B, 4H, 4D BK 7, DB 1, KL 1, MD 1, SM, BO, LP, HB, JV, JS, JL, TŘ, JD, BŘK, DG, JDO BK 10 /jílovce, pískovce, sprašová hlíny, svahové hlíny - kambizem, luvizem/							21 279,74 ha 55,35%	
451	smrkové (poškozené)	H	80	70-100	20	71	SM 5, BK 2, KL 1, LP 1, MD 1, JD, JDO, DG, DB, HB, JS, JL, TŘ SLT 3S: alt. BO SLT 3H, 4H: alt. DB	25 % - BK, DB, LP, JV, JD, JS, JL, HB, TŘ, JDO	MD 5-10 DG 3-5 JDO + -3 SM 20-50
451	smrkové	nN,nH pN,pH	100	90-120	30	81	SM 5, BK 2, KL 1, LP 1, MD 1, JD, JDO, DG, DB, HB, JS, JL, TŘ SLT 3S: alt. BO SLT 3H, 4H: alt. DB		
453	borové	nH,nN nP	110	90-120	20	101	BO 5, BK 3, DB 1, KL 1, MD, LP, HB, JD, JDO, DG		
455	dubové	nP,pN pH	160	140-180	30	141	DB 7, BK 2, LP 1, HB, MD, KL, JL, TŘ, JS, BŘK		
456	bukové	pN, P	120	120-150	40	101	3.lvs: BK 6, DB 2, KL(LP) 1, MD 1, HB, BŘK, JV, TŘ, JD, JDO 4.lvs: BK 7, DB 1, KL 1, MD 1, LP, JV, TŘ, JD, JDO alt. BK 10		
457	listnaté (DB, BK,LP,JS,HB)	pH,pN nN,nH	100	110-140	30	81	Podle základní cílové skladby alt. DB, LP, HB, JS		
457	listnaté (BŘ, OL, OS)	pH,pN	80	50-90	30	61	Podle základní cílové skladby alt. BŘ		
459	les nízký	pH,pN	70	50-90	20	61	---		
47	Oglejená stanoviště středních poloh: 3V, 3O, 4V, 4O 3O: BK 6, DB 3, LP 1, HB, JV, JD, OLL, OS 4V: BK 8, LP 2, DB, JV, JD, OLL, JS /deprese, plošiny, mírné svahy - kambizemě, pseudogleje, gleje/							4,42 ha 0,01%	
471	smrkové	H, N, P	100	100-130	30	81	---	25 % - BK, JD, DB, JV, JS, LP, JL, HB, OS, JDO	---
473	borové	H, N, P	110	100-130	30	91	BO 5, SM 2, DB(BK) 3, JD, BŘ, MD, LP, OL, OS		
475	dubové	H, N, P	140	140-180	30	121	DB 8, LP 1, BK 1, BŘ, OL, OS, JV, JS, JL		
01	Mimořádně nepříznivá stanoviště: 0Z,1X5, 3Y, 3J /srázy, skalnaté svahy, sutě, hřbety s mělkou půdou, kamenná žebra - litozem, ranker/							34,85 ha 0,09%	

		V (P) Bez úmysl. těžeb. zásahů	150 -f		Nepře tržitá			5% - 0Z: Bk, BŘ, DB, JD 90% - 1X5: DB, DBP, HB, LP, BB, BŘK, MK, BŘ, JV, JS, JL 30% - 3Y: BK, JD, BŘ, DB 90% - 3J: BK, JV, LP, DB, JS, JL, BŘK, MK, TS, HB	---
--	--	--	--------	--	-----------------	--	--	--	-----

PLO 37 Kelečská pahorkatina

Přehled základních hospodářských doporučení zastoupených HS

7295.46 ha

HS	POROSTNÍ TYP (současné porosty)	ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ 12345					CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA - alternativy (desítky %)	MELIORAČNÍ A ZPEVNŮJÍCÍ DŘEVINY (Příl. č.4 k vyhl.č.83/96)	Geografic. nepůvodní dřeviny %
19 Lužní stanoviště: 1L, 2L, 3U /naplavená půda – šterkopísek hlína/							221.24 ha 3.03%		
195	dubové	H,N,P	160	130-200	30	141	DB 6, JS 2, JV 1, LP 1, JL, HB, TP, VR	15 % -	---
197	listnaté	H,N	90	80-130	30	71	DB 6, JS 2, JV 1, LP 1, JL, HB, TP, VR	LP, JV, HB, BB, DB,	
198	topolové	H	40	20-40	10	31	DB 6, JS 2, JV 1, LP 1, JL, HB, TP, VR	BŘK, BK, JL, JD	
21 Exponovaná stanoviště nižších poloh: 2C /kulmská droba, břidlice – kambizem rankerová/							3.91 ha 0.05%		
213	borové	nN,pN	120	110-140	20	111	BO 7, DB 2, HB 1, BK, LP	30 % -	---
217	listnaté	pH,P	110	80-120	30	91	BO 7, DB 2, HB 1, BK, LP	DB, BK, LP, HB, JD, BŘ	
219	les nízký	(p)N	90	80-120	20	81	BO 7, DB 2, HB 1, BK, LP		
23 Kyselá stanoviště nižších poloh: 2I /jílovce s pískovci, sprašová hlína, šterk – hnědozem, luvizem/							5.63 ha 0.07%		
231	smrkové (nevhodné)	nH	100	80-110	20	91	BO 6, DB 3, LP (BK, HB) 1	25 % -	---
233	borové	p(n)H, N, pP	110	90-130	20	101	BO 6, DB 3, LP (BK, HB) 1	DB, BK, LP, HB, JV, JS, JL, TR, BB, BŘK	
235	dubové	P, p(n)N	130	110-150	30	111	DB 8, BK 1, LP 1, HB, BŘ, BO		
235	dubové (poškozené)	p(n)H, p(n)N	110	110-150	30	101	DB 8, BK 1, LP 1, HB, BŘ		
237	listnaté	H,N,P	100	80-120	30	81	DB 8, BO 1, LP (BK, HB) 1		
25 Živná stanoviště nižších poloh: 2S, 2H, 2B, 2D, 2O /jílovce s pískovci - kambizem/							1080.17 ha 14.81%		
251	smrkové (nevhodné)	N,nH	100	80-110	20	91	DB 6, BK 2, HB 1, MD 1, LP, JV, JL, BO, DG, JDO	20 % -	MD 5 - 10 JDO + DG + - 5 KŠ +
253	borové	pN,pH	110	80-120	20	101	BO 5, DB 3, BK 1, HB 1, MD	DB, BK, LP, HB, JV, JS, JL, JD, JDO, TR, BŘK, BB	
255	dubové	nP,pN	140	130-200	30	121	DB 7, BK 2, LP 1, HB, MD, JV, JL, TR, BB, BŘK		
255	dubové (poškozené)	pN,pH nP	120	100-130	30	101	DB 7, BK 2, LP 1, HB, MD, JV, JL, TR, BB, BŘK		
257	listnaté (DB+HB+MD)	p(n)N, p(n)H	110	100-130	30	91	DB 7, BK 2, LP 1, HB, MD, JV, JL, TR, BB, BŘK		
257	listnaté (LP+HB+JV)	p(n)N, p(n)H	100	100-130	30	81	DB 7, BK 2, LP 1, HB, MD, JV, JL, TR, BB, BŘK		
257	listnaté (kvalitní BŘ)	nN,nH	80	50-90	30	61	BŘ 4-6, DB 2-3, BK 1-2, HB 1, LP		
259	pařezina (nekvalitní)	nN,nH pN,pH	70	50-90	20	61	DB 7, BK 2, LP 1, HB, MD, JV, JL, TR, BB, BŘK		
29 Olšová stanoviště na podmačených půdách: 3L /aluviální naplaveniny, hlína, šterk - fluvizem, glej/							137.20 ha 1.88%		
295	dubové	N	160	130-200	30	141	PŘEMĚNA DRUHOVÉ SKLADBY: OL 4-8, JS 2-4, SM 0-2, KL, HB, TR, BŘ, OS, VR	70% -	SM + - 20
297	olšové (JS)	N,(H)	80	80-100	20	71	OL 4-8, JS 2-4, SM 0-2, KL, HB, TR, BŘ, OS, VR	JV, OLL, JS, BŘ, VR, DB	
298	topolové	H	30	30-50	10	21	PŘEMĚNA DRUHOVÉ SKLADBY: OL 4-8, JS 2-4, SM 0-2, KL, HB, TR, BŘ, OS, VR		
31 Vysychavá acerózní a bazická stanoviště středních poloh: 3C, 3W9, 3A9 /vápenec – vysychavá kambizem, pararendzina, rendzina/							9.91 ha 0.14%		
311	smrkové (nevhodné)	N	90	80-110	20	81	Slt. 3C: BO 2-5, BK 2-4, DB 1-3, LP 0-1	30% -	---
313	borové	N	120	110-140	30	101	Slt. 3C: BO 2-5, BK 2-4, DB 1-3, LP 0-1	3C - BK, DB, LP, JD, JV, HB, BŘK, TR	
315	dubové	N (P)	120	120-140	30	101	BK 2-5, KL 2, LP 1-2, JS 1, JD 0-1, JL 0-1, DB 0-1, JV	3A9 - BK, DB, LP, JV, JS	
316	bukové	N ,P	120	120-140	30	101	BK 6, KL 0-2, JD 0-1, MD 0-1	3W9 - JL, JD, HB, BŘK, TR	
317	listnaté	H	90	80-110	30	71	Slt. 3C: BO 2-5, BK 2-4, DB 1-3, LP 0-1		
35 Živná bazická stanoviště středních poloh: 3W /vápenec – rendzina, pararendzina/							10.14 ha 0.14%		

351	smrkové	N (H)	80	80-100	30	61	přeměna druhové skladby: BK 4-7, KL(JV) 1-2, DB 1-2, LP 1-2, MD 1, JS 0-2, JD 0-1, HB	70% - BK, DB, JV, JS, LP, JD, JL, HB, TR, BRK	MD 5-10
353	borové	N	120	100-130	30	101	přeměna druhové skladby: BK 4-7, KL(JV) 1-2, DB 1-2, LP 1-2, MD 1, JS 0-2, JD 0-1, HB		
355	dubové	N, P	130	120-140	30	111	přeměna druhové skladby: BK 4-7, KL(JV) 1-2, DB 1-2, LP 1-2, MD 1, JS 0-2, JD 0-1, HB		
356	bukové	P, (N)	120	120-140	30	101	BK 4-7, KL(JV) 1-2, DB 1-2, LP 1-2, MD 1, JS 0-2, JD 0-1, HB		
357	listnaté	P, (N)	90	80-100	30	71	přeměna druhové skladby: BK 4-7, KL(JV) 1-2, DB 1-2, LP 1-2, MD 1, JS 0-2, JD 0-1, HB		
41	Exponovaná stanoviště středních poloh: 3A, 4A, 3F, 4F, 3S9, 3B9, 3D9, 4S9, 4B9, 4D9, /prudké svahy a kamenité stanoviště – kambizem, rankerová kambizem/							361.64 ha 4.96%	
411	smrkové	pN,pP nN,nP	100	100-130	30	81	Slt. 3S9: BK 3, BO 2-4, KL 1, MD 1, DB 1, JD 0-1 Ost. 3 LVS: SM 2-4, BK 2-4, MD 1, DB 1, JD 0-1, KL 0-1, LP 0-1	30% - BK, JD, LP, DB, JV, JS, JL, HB	MD 5-10
413	borové	pN, nN, P	120	110-140	30	101	Slt. 3S9: BK 3, BO 2-4, KL 1, MD 1, DB 1, JD 0-1 Ost. 3 LVS: SM 2-4, BK 2-4, MD 1, DB 1, JD 0-1, KL 0-1, LP 0-1		
415	dubové	N,P	130	120-150	30	111	BK 5-7, DB 0-2, KL 0-2, LP 0-2, JD 0-1, MD 0-1, SM 0-1, HB		
416	bukové	pN,pP	120	120-150	40	101	BK 6-8, DB 0-2, KL 0-1, MD 0-1, HB		
417	listnaté	N, (P)	100	70-100	30	81	BK 5-7, JS 0-2, LP 0-2, KL 0-1, MD 0-1, JD 0-1 Slt. 3S9: BK 3, BO 2-4, KL 1, MD 1, DB 1, JD 0-1		
43	Kyselá stanoviště středních poloh: 3K, 4K /jílovce, písky - podzolovaná kambizem, podzol/							0.26 ha 0.00%	
431	smrkové	n(p)N, n(p)H	110	100-130	30	91	přeměna dřevinné skladby: BO 5, BK 2-3, DB 1-2, MD 1, JD 0-1, HB	25 % - DB, BK, LP, JD, HB	MD 5-10 SM + - 10
435	dubové	nH,nN	140	110-140	30	121	BO 5, BK 2-3, DB 1-2, MD 1, JD 0-1, HB		
45	Živná stanoviště středních poloh: 3S, 3B, 3H, 3D, 4S, 4B, 4H, 4D /jílovce, písčovce, sprašová hlíny - kambizem, luvizem/							5081.33 ha 69.66%	
451	smrkové (poškozené)	H	80	70-100	30	61	3S: BO 3-6, BK 1-3, DB 1-2, MD 1, LP 0-2 Ost. 3.LVS: DB 2-6, BK 2-3, MD 1, LP 0-1, HB 0-1, JD 0-1, SM 0-1, BO, DG 4.LVS: SM 4-6, BK 3-5, MD 1, JD 0-1, KL, LP, DB, DG, JDO 4H: DB 4-6, BK 3-5, MD 1, JD 0-1, KL, LP, DG, JDO	25 % - BK, DB, LP, JV, JD, JS, JL, HB, TR, JDO	MD 5 - 10 DG + - 10 JDO + SM + - 10
451	smrkové	H,N,P	100	90-120	30	81	3S: BO 3-6, BK 1-3, DB 1-2, MD 1, LP 0-2 Ost. 3.LVS: DB 2-6, BK 2-3, MD 1, LP 0-1, HB 0-1, JD 0-1, SM 0-1, BO, DG 4.LVS: SM 4-6, BK 3-5, MD 1, JD 0-1, KL, LP, DB, DG, JDO 4H: DB 4-6, BK 3-5, MD 1, JD 0-1, KL, LP, DG, JDO		
453	borové	H, N	110	90-120	20	91	BK 6, SM 1, MD 1, DB 1, KL 0-1, LP 0-1, JD, JV, JL, DG, JDO		
455	dubové	nP,pN pH	160	140-180	30	141	DB 4-6, BK 2-4, MD 1, KL (JV) 1, LP 0-1, HB, JD, JL, TR, BRK		
456	bukové	pN, P, (H)	120	120-150	30	101	BK 6, DB 2, MD 1, JV (KL) 1, LP, HB, JD, JL, TR, BRK		
457	listnaté (DBČ, HB)	H	110	110-140	30	91	BK 2-3, DB 2-3, LP 2, MD 1, HB 1, SM 0-1, JL, TR, DG, JDO		
457	listnaté (LP)	H, P, N	100	90-120	30	81	BK 2-3, DB 2, LP 2-3, MD 1, JV (KL) 1, HB 1, SM 0-1, JL, TR, DG, JDO		
457	listnaté (OI+JS+BR)	H	80	50-90	30	61	3H, 3B, 3D: DB 2-6, BK 2-3, MD 1, LP 0-1, HB 0-1, JD 0-1, SM 0-1, BO, DG 4H: DB 4-6, BK 3-5, MD 1, JD 0-1, KL, LP, DG, JDO Kval.BR: BR 4-6, BK 2-3, DB 1-2, HB 1, LP		
459	pařezina	H, N	70	50-90	20	61	3H, 3B, 3D: DB 2-6, BK 2-3, MD 1, LP 0-1, HB 0-1, JD 0-1, SM 0-1, BO, DG 4H: DB 4-6, BK 3-5, MD 1, JD 0-1, KL, LP, DG, JDO		
47	Oglejená stanoviště středních poloh: 3V, 3O, 4V, 4O /pískovce s jílovci, kulmská droba a břidlice – oglejená půda, pseudoglej/							361.14 ha 4.95%	
471	smrkové	H, N, (P)	100	100-130	30	81	DB 4-6, JD 0-3, BK 0-2, MD 1, JV (KL) 0-1, SM 0-1, LP Alt. SM za DB, Alt. BK za DB na 3V, 4V	25 % - BK, JD, DB, JV, JS, LP, JL, HB, OS	MD + SM + - 10
471	smrkové (nekvalitní)	H	80	70-100	30	61	DB 4-6, JD 0-3, BK 0-2, MD 1, JV (KL) 0-1, SM 0-1, LP Alt. SM za DB, Alt. BK za DB na 3V, 4V		
471	smrkové s BO	H, N	90	100-130	30	71	DB 4-6, JD 0-3, BK 0-2, MD 1, JV (KL) 0-1, SM 0-1, LP Alt. SM za DB, Alt. BK za DB na 3V, 4V		

473	borové	H, N, (P)	110	100-130	30	91	DB 4-6, JD 0-3, BK 0-2, MD 1, JV (KL) 0-1, SM 0-1, LP Alt. SM za DB, Alt. BK za DB na 3V, 4V		
475	dubové	(H), N, P	150	140-180	30	121	DB 4-6, JD 0-3, BK 0-2, MD 1, JV (KL) 0-1, SM 0-1, LP na SLT 3V též JS		
477	listnaté	H, N	80	60-80	30	61	přeměna dřevinné skladby: DB 4-6, JD 0-3, BK 0-2, MD 1, JV (KL) 0-1, SM 0-1, LP na SLT 3V též JS		
01 Mimořádně nepříznivá stanoviště: 0Z, 1X, 3Y, 3J, 5Y, 5J 22.89 ha 0.31% /srázy, skalnaté svahy, sutě, hřbety s mělkou půdou - litozem, ranker, kambizem rankerová/									
011	smrkové	V, P, N	100		30	81	přeměna dřevinné skladby: 3Z: BO 4, BK 4, DB 1, BŘ 1, HB	2Z – 60% BK, DB, LP, BŘ, HB 3Z,3Y – 30% BK, DB, JD, BŘ 3J – 90% BK, JV, LP, DB, HB, JS, JL, BŘK, MK, TS	---
016	bukové	Bez úmysl. těžeb. zásahů	150 -f		Nepře tržitá	131	3Z: BO 4, BK 4, DB 1, BŘ 1, HB, JS Alt. BK 7, DB 2, BO 1, BŘ, HB, JS		
017	listnaté								

PLO 38 Bílé Karpaty a Vizovické vrchy

Přehled základních hospodářských doporučení zastoupených HS

56 332.66 ha

HS	POROSTNÍ TYP (současné porosty)	ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ 12345					CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA - alternativy (desítky %)	MELIORAČNÍ A ZPEVNŮJÍCÍ DŘEVINY (Přil. č.4 k vyhl.č.83/96)	Geografic. nepůvodní dřeviny %
21 Exponovaná stanoviště nižších poloh: 1N, 1C, 2N /pískovce, jílovce, sprašová hlína; ranker, kambizem, hnědozem/							327.74 ha 0.58%		
213	borové	nN,pN	120	110-140	20	111	BO 6, DB 3, HB 1, BK, LP, MD	30 % -	MD +3
215	dubové	pH,N	130	110-150	30	111	DB 8, BO 1, HB 1, BK, LP, MD	DB, BK, LP, HB, JD, BŘ	BO +10
219	les nízký	(p)N	110	80-120	20	101	DB 8, HB 2, BK, LP, MD, TR		
23 Kyselá stanoviště nižších poloh: 2I, 2S /jílovce, pískovce, sprašové hlíny; kambizem, hnědozem, luvizem/							719.11 ha 1.27%		
231	smrkové (nevhodné)	nH	100	80-110	20	91	DB 8, BO 1, HB 1, LP, BK, DG	25 % -	MD 1-4
233	borové	p(n)H, N, pP	110	90-130	20	101	BO 6, DB 3, HB 1, LP, BK, MD, DG	DB, BK, LP, HB, JV, JS, JL, TR, BB, BŘK	DG +1 DBČ +1 BO +
235	dubové	P, p(n)N	130	110-150	30	111	DB 8, BK 1, LP 1, HB, MD, BŘ		
25 Živná stanoviště nižších poloh: 1P, 2H, 2B, 2D /jílovce, (pískovce), sprašová hlína; kambizem, hnědozem/							10 154.86 ha 18.03%		
251	smrkové (nevhodné)	nN, nH	100	80-110	20	91	DB 6, BK 1, LP 1, HB 1, MD 1, JV, JL, BO, SM	20 % -	MD 8-10
253	borové	pN,pH	110	80-120	20	101	BO 6, DB 2, BK 1, LP 1, HB, MD, JV, JL	DB, BK, LP, HB, JV, JS, JL, JD, JDO, TR, BŘK,	JDO +2 DG 1-4 BO +
255	dubové	nP,pN , pH	140	130-200	30	121	DB 7, BK 2, LP 1, HB, MD, JV, JL, TR, BB, BŘK	BB	
257	nízký les (dobrá kvalita)	pN,pH nN,nH	110	100-130	30	91	DB 7, BK(LP) 1, MD 1, HB 1, KL, TR, BŘK 3lvs. BK 6, KL(LP) 1, DB 1, MD 1, HB 1, TR, BŘK		
259	Nízký les (horší kvalita)	pN,pH nN,nH	70	50-90	20	61	DB 7, BK(LP) 1, MD 1, HB 1, KL, TR, BŘK 3lvs. BK 6, KL(LP) 1, DB 1, MD 1, HB 1, TR, BŘK		
29 Podmáčená stanoviště nižších poloh: 2L, 3L, 5L /aluvialní naplaveniny; fluvizem, glej/							420.09 ha 0.74%		
297	Ostatní listnaté	pN	90	80-100	20	81	OLL 8, JS 2, VR, OS, BŘ, SM	70% - JV, OLL, JS, OS, OLŠ, BŘ, VR	SM +
41 Exponovaná stanoviště středních poloh: 3N, 3A, 4A, 4F, 4N, exp. typy 3K, 3B, 3D, 4D, 4K, 4S, 4B, /pískovce, jílovce, sprašové hlíny; ranker, kambizem/							5 000.60 ha 8.88%		
411	smrkové	pN,pP nN,nP	110	100-130	30	91	Slt. 3N, 4N, 3K, 4K: SM 5, BK 3, MD 1, BO 1, DB, LP, KL, BŘ Slt. 3Be, 4Be, 3A, 4A, 4Se, 4F: SM 5, BK 3, KL 1, MD 1, DB, JS, JL	30% - exp.3K, 4K, 3N, 4A: BK,LP,JD,DB ost.: BK, JD, KL, JS, JL, LP, HB	MD 8-10 BO 8-10 SM 30-50
416	bukové	pN,pP	130	120-150	30	111	Slt. 3N, 4N, 3K, 4K: BK 8, BO 1, DB 1, KL, MD, BŘ JŘ Slt. 3Be, 4Be, 3A, 4A, 4Se, 4F: BK 6, KL 2, DB 1, JS 1, JL, JV, MD, BŘK		
43 Kyselá stanoviště středních poloh: 3K, 4K /jílovce, pískovce; kambizem,podzol/							1 810.63 ha 3.21%		
431	smrkové	n(p)P n(p)N n(p)H	110	100-130	30	91	BO 5, BK 3, DB 1, MD 1, LP, HB, BŘ, JŘ 4.lvs. SM 5, BK 3, DB 1, MD 1, LP, HB, BŘ, JŘ	25 % -	MD 6-10
433	borové	nP,nH	110	100-130	20	101	BO 5, BK 3, DB 1, MD 1, LP, HB, BŘ, JŘ 4.lvs. SM 5, BK 3, DB 1, MD 1, LP, HB, BŘ, JŘ	DB, BK, LP, JD, HB, DG, BŘ	DG 3-7 SM +50 BO 10-50
435	dubové	nP,pN	140	110-140	30	121	DB 8, BK 1, BO 1, LP, HB, MD, BŘ Alt. BK 7, DB 2, BO 1, LP, HB, MD, BŘ		
436	bukové	P,pN	130	120-150	30	111	BK 8, DB 1, MD 1, LP, HB, BŘ, JŘ		
45 Živná stanoviště středních poloh: 3S, 3B, 3H, 3D, 3O, 4S, 4H, 4B, 4D, 4V /jílovce, pískovce, sprašové hlíny; kambizem, luvizem, (pseudoglej)/							32 379.86 ha 57.48%		
451	smrkové	pN,pH nN,nH	100	90-120	30	81	SM 5, BK 2, KL 1, LP 1, MD 1, JD, DB, HB, JS, JL, TR	25 % -	MD 8-13
453	borové	nH	100	90-120	20	91	SM 4, BK 3, KL 1, DB 1, MD 1, LP, HB	BK,DB,LP,KL,JD,JS,JL, HB,TR,JDO	DG 6-10 JDO +3

455	dubové	nP,pN pH	160	140-180	30	141	DB 7, BK 2, LP 1, HB, MD, KL, JL, TŘ, JS, BŘ		SM +-50
456	bukové	pN,P	120	120-150	40	101	BK 7, KL(LP) 1, DB 1, MD 1, HB, JS, JL, TŘ, JD, BŘK Alt. BK 10		
457	listnaté ostatní	pN,P, pH	110	120-150	30	91	BK 5, KL(JS, LP) 4, MD 1, DB, HB, TŘ, BŘK		
459	nízký les	pN,pH nN,nH	70	50-90	20	61	BK 6, KL(LP) 1, DB 1, MD 1, HB 1, TŘ, BŘK alt. DB 10		
51 Exponovaná stanoviště vyšších poloh: 5N, 5F, 5A, exp. typy 5K, 5S, 5B, 5D /pískovce, jílovce, sprašová hlína; ranker, kambizem, podzol/ 1 649.36 ha 2.93%									
511	smrkové	nP, nN	120	110-130	30	101	LT 5N1, 5K9: SM 5, BK 3, JD 1, BO 1, LP, DB, KL, MD, BŘ, JŘ LT 5S9, 5B9, 5A1, 5F1: SM 5, BK 3, KL 1, JD 1, JS, JL	30 % - BK, JD, KL, JS, LP, JL	MD 8 -10 SM 10-50 BO 5-10
516	bukový	nP, pN nN	140	120-150	40	121	LT 5N1, 5K9: BK 7, SM 2, JD 1, KL, BO, BŘ, DB, JŘ LT 5S9, 5B9, 5A1, 5F1: BK 6, JD 2, KL 1, SM 1, JS, JL		
53 Kyselá stanoviště vyšších poloh: 5K /jílovce, pískovce; podzol/ 261.14 ha 0.46%									
531	smrkové	nP, nH nN	120	110-140	30	101	SM 5, BK 3, JD 1, MD 1, LP, BŘ, JŘ	25 % - BK, JD, LP	MD 6 - 10 DG 3 – 7 SM + -50 BO 10-50
536	bukové	P, pN	140	120-150	40	121	BK 8, SM 1, MD 1, JD, BŘ, JŘ		
55 Živná stanoviště vyšších poloh: 5S, 5B, 5D, 5V, 5G (pro JD 3S, 3B, 3H, 3D) /jílovce, pískovce, sprašová hlína; kambizem, (glej)/ 3 318.15 ha 5.89%									
551	smrkové	nP, nN nH	110	100-130	30	91	SM 5, BK 2, KL 1, JD 1, MD 1, LP, JS, JL	25 % - BK, JD, KL, JL, LP, JS, JDO, TŘ	MD 5-9 DG 3-6 SM 10-50
552	jedlové (SM+JD+BK)	P, pN, V	120	110-140	40	101	BK 6, JD 3, SM 1, MD, KL, JS alt SM, alt. JD		
556	bukové	P, nN, pN	130	120-150	40	111	BK 6, JD 2, SM 1, KL 1, MD, JS, JL, TŘ		
557	listnaté ostatní	pN,P,p H	110	120-150	30	91	BK 5, KL(JS, LP) 4, MD 1, DB, HB, TŘ, BŘK		
01 Mimořádně nepříznivá stanoviště: 0Z, 1X, 3Y, 3J, 5Y, 5J /srázy, skalnaté svahy, sutě, hřbety s mělkou půdou; litozem, ranker/ 291.12 ha 0.51%									
		Bez úmysl. těžeb. zásahů	150 -f	Nepřetržitá			Blízká přirozené, BK 6, JD 3 KL 1, SM, BO, JŘ, BŘ (JL, JS)	0Z - 5% - BK, BŘ, DB, JD 1X - 90% - DB, DBP, HB, LP, BB, BŘK, MK, BŘ, JV, JS, JL 3Y, 5Y - 30% - BK, JD, BŘ, DB, JŘ, KL 5J - 60% - BK, JV, JD, JL, JS, LP 3J - 90% - BK, JV, LP, DB, JS, JL, BŘK, MK, TS	

PLO 39 Podbeskydská pahorkatina
Přehled základních hospodářských doporučení zastoupených HS
25 197 HA

HS	POROSTNÍ TYP (současné porosty)	ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ 12345					CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA - alternativy (desítky %)	MELIORAČNÍ A ZPEVNŮJÍCÍ DŘEVINY (Přil. č.4 k vyhl.č.83/96)	Geografic. nepůvodní dřeviny %
01 Mimořádně nepříznivá stanoviště: 3Z, 3Y, 3J, 4Y 155 ha 0,6%									
<i>/skály, antropogenní haldy, rankry/</i>									
011	smrkové	N,P,V	100		30+	81	3J: BK3-5, (JV,KL)2, LP2, DB1, JD0-1, JS1, MD1, JLH1-0, HB, JS	90 % - BK,JV,LP,DB, HB,JS,JL,TIS	MD 10
017	listnaté	P,V	150		30+	121	3Y: DB3, BK1, HB1, KL1, LP1, BŘ1, MD1, BO0-1, OS, OL, TPC (3Z): BO4, BK4, DB1, BŘ1	30 % - BK,DB,JD,BŘ	
19 Lužní stanoviště: 1L, 1U, 2L, 3U 3317 ha 12,8%									
<i>/ fluvioglaciálních a fluviálních sedimentů v aluviích řek a říček – fluvizem, gleje/</i>									
191	smrkové	H	80	70-80	20	61	DB6, JS2, JV1, LP1, JL, HB, TPC, VR 1U: TP 10	15 % - DB,LP,JV,HB, JL,BB - 1U + OLL,VR,OS	----
195	dubové	H,N,P	160	130-160	30	141			
197	listnaté	H,N	90	80-90	30	71			
198	topolové	H,N	40	20-40	10	31			
199	pařezina	H,N	50	30-50	20	31			
25 Živná stanoviště nižších poloh: 2O, 2V 304 ha 1,2%									
<i>/oglejená stanoviště na plošinách ve sprašových překryvech- pseudoglejové kambizemě až pseudogleje/</i>									
251	smrkové	H	80	80	20	51	DB6-7, JD1-0, BK2, LP1	20 % - BK,LP,HB,JV, JS,JL,JD,TŘ,BB,DB	----
255	dubové	H,N	160	130-160	30	141			
257	listnaté	H	90	80-90	30	71			
29 Olšová stanoviště podmáčených půd: 1G, 1T, 3L, 5L 617 ha 2,4%									
<i>/podmáčených stanovišť na plošinách, aluvia podél potoků a prameniště- gleje, stagnogleje, fluvizemě/</i>									
295	dubové	H,N	160		30	141	OL 4-8, JS 4-2, SM 0-3, KL, HB, TŘ	70 % - DB,BŘ,OL,VR	-----
297	listnaté (OL, JS)	H,N	80		20	61			
298	topolové	H	30		10	21			
31 Vysýchavá acerózní a bazická stanoviště středních poloh: 3C, 3C₉, 3W₉, 3A₉, 4W₉, 4C, 4A₉ 118 ha 0,5%									
<i>/soubor exponovanějších bohatých stanovišť na vápencích a pískovcích s vápnitým tmelem, na vápencových sutích, také bohatá vysýchavá stanoviště- kambizemě, rankry, rendziny, pararendziny/</i>									
311	smrkové	H,N	90	80-90	20	71	BK 2-5, JD 1-0, JV, KL 2, MD 1-2, JL 1-0, LP 1-2, JS 1, SM 0-3, DB 0-1 3C: BO2-5, BK4-2, MD2-0, DB1-3, LP0-1	30 % - BK,DB,LP,JD, HB,JV,TŘ	MD 10-20
313	borové	N	120	110-120	30	101			
315	dubové	N,(P)	120		30	101			
316	bukové	N,P	130	120-130	20	111			
317	listnaté	H	90		30	71			
35 Živná bazická stanoviště středních poloh: 3W, 4W 344 ha 1,3%									
<i>/bohatých stanovišť na vápencích a pískovcích s vápnitým tmelem - kambizemě, rendziny, pararendziny/</i>									
351	smrkové	N (H)	80		30	61	BK 4-7, KL (JV) 1-2, DB 1-2, LP 1-2, MD 1, HB, JS 2-0, JD 0-1	70 % - BK,DB,JV,JS, LP,JD,JL,HB,TŘ	MD 10
353	borové	N	120	100-120	30	101			
355	dubové	N,P	130	120-130	30	111			
356	bukové	P (N)	130		30	111			
357	listnaté	N (P)	90		30	71			
41 Exponovaná stanoviště středních poloh: 3N, 3S₉, 3F, 3B₉, 3D₉, 3A, 4M₉, 4K₉, 4N, 4F, 4S₉, 4b₉, 4D₉, 4A 1644 ha 6,3%									
<i>/zářezy potoků ve sprašových překryvech, prosluněné svahy, prudké stinné svahy, suťová stanoviště na svazích a hřbetech, chudé mírné až prudké svahy- kambizemě eutrické až oligotrofní, kambizeměrankrové a podzolované, podzoly/</i>									
411	smrkové	N,P	100		30	71	SM4-5, JD1-0, BK4-2, MD1, KL2-0, DB0-2, LP0-2, HB 3-4N,K: BO6-7, BK1-2, MD0-1, DB2-1, LP0-1 3S ₉ : BO2-4, JD1-0, BK3, KL1, MD1, DB1 3B ₉ ,F,A: SM2-4, JD1-0, BK4-2, KL1-0, LP1-0, MD1, DB2-0, HB	30% - BK,JD,LP, DB	MD 15
413	borové	N,P	120	110-140	30	101			
415	dubové	N	130		30	111			
416	bukové	N,P	130	120-130	40	111			
417	listnaté	N (P)	90		30	71			
43 Kyselá stanoviště středních poloh: 3K, 4M, 4K 67 ha 0,3%									
<i>/kyselá stanoviště na mírných svazích- kambizemě podzolované, podzoly/</i>									

431	smrkové	H,N	110	-	30	81	BO 6, BK 1-2, MD1, DB 2-1, JD 1-0, HB	25 % - BK JD,LP,DB, HB	MD 10
433	borové	H,N,P	120	110-120	30	101			
45 Živná stanoviště středních poloh: 3S, 3B, 3H, 3D, 4S, 4B, 4H, 4D /normální stanoviště-kambizemě eutrické až oligotrofní, oglejené, luvizemě/							15455 ha 59,6%		
451	smrkové	H,N	90	70-100	30	-	3VLS: BK 3-2, DB 2-4, JD 1-0, MD 1, LP 1, KL 1, SM 1-0, HB, BO, JL, DG; 4VLS: SM4-6, JD 0-1, MD 1, BK 2-5, LP 1-0, KL, DB, JL, DG 3S: SM0-1, BO6, BK1-3, MD1, DB1-2, LP0-1, HB 3H,B: SM0-1, DB5-6, BK1-2, MD1, LP1, HB1, JD1-0 4H: SM(DB)6-4, JD1-0, BK5-3, MD1, KL	25 % - BK,JD,LP,JV, JS,JL,DB,HB,TŘ	MD 10 DG+
453	borové	H,N	110	-	20	91			
455	dubové	H,N,P	160	-	30	141			
456	bukové	H,P(N)	130	-	30	111			
457	listnaté	H,N,P	90	80-110	30	-			
47 Oglejená stanoviště středních poloh: 3V, 3O, 3P, 3Q, 4V, 4O, 4P /zamokřená stanoviště na plošinách a úžlabinách- prameniště gleje, kambizemě oglejené a pseudoglejové, pseudogleje/							3866 ha 14,9%		
471	smrkové	H,N,P	90	80-100	30	-	DB6-4, JD0-3, BK2-0, MD1, JV(KL)0-1, SM0-1, LP, DG (NA 3V I JS) 4V: SM4-7, JD2-4, BK1-3, DB3-1, KL, MD	25 % - BK,JD,DB,LP,JV JS, JL, HB	MD 10
473	borové	H,N	110	-	30	91			
475	dubové	H,P	150	-	30	121			
477	listnaté	H,N	80	-	30	61			
59 Podmáčená stanoviště středních a vyšších poloh: 3G, 3R, 4G /poklesliny se stagnující vodou - gleje, organozemě/							30 ha 0,1%		
591	smrkové	P,N	100	-	40	81	SM 6-7, JD 2-3, BK 1-0, OL 0-1, DB	3-4G: 20 % - BK,JD, DB, JV,LP,OLL,OS 3R: 10 % - BŘ,JD	-
593	borové	N(P),H	120	-	30	91			
595	dubové	P,N	140	-	30	121			

PLO 40 Moravskoslezské Beskydy

Přehled základních hospodářských doporučení zastupených HS

HS	POROSTNÍ TYP (současné porosty)	ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ					CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA - alternativy (desítky %)	MELIORAČNÍ A ZPEVNŮJÍCÍ DŘEVINY (Přil. č.4 k vyhl.č.83/96)	Geografic. nepůvodní dřeviny %	
		1	2	3	4	5				
01 Mimořádně nepříznivá stanoviště: 3Y, 3J, 4Z, 4Y, 5Y, 5J, 6Y, 6Z, 6L, 7Y, 7Z /skály, sutě - rankry/										828 ha 1,3 %
011	smrkový	N,P,V	100	80-100	30+	81	3-6Y, 3-6Z: BO4-7 BK4-2 BR1 DB0-3; 3J: BK1-3 JD1 JV2 DB1-2 JL1-2 LP2-1 SM0-2 5Y: SM3 BK4-5 JD1 BR1 BO0-1; 5J: SM2-6 JD0-2 BK4-1 KL1-2 JL0-1; 6L: OLS 10 7Y, 7Z: SM8 BK1 JD0-1, BR0-1, JR	OZ: 5% - BK, BR, DB, JD; 3-5Z, 3-5Y: 30% - BK, DB, JD, BR; 3J: 90% - BK, JV, LP, DB, HB, JS, JL, TIS; 3J - BK, KL, JD, JL, LP, JS, HB, DB 5J: 60% - BK, JV, JD, JL, LP, JS; 6L 70% - OLS, BK, JV, JS, OLL, JD 7Y, 7Z 10% - BK, JD, BR, JR	-	
016	bukový	P,V	150	150-200	40-∞	121				
017	listnatý	N,P	110	-	30	91				
02 Vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace: 8Z /mělké půdy vrcholu Lysé hory/										20 ha -
021	smrkový	V	150	-	∞	-	SM10 BR	+ - BK, JR, BR, KL	-	
19 Lužní stanoviště: 2L, 3U /fluvioglaciálních a fluviálních sedimentů v aluviích řek a říček – fluvizem, gleje/										425 ha 0,7 %
195	dubový	H,N	160	-	30	141	DB4-5 JD2-0 JS3-2 JV(KL)1-2 BK1 JLD JLV HB	15% - LP, JV, JL, HB, BB, DB (2L); BK, JV, JL, LP, JD, OLL, DB (3U)	-	
197	listnaté	H,N	80	80-90	30	61				
198	topolové	H	40	-	10	21				
23 Kyselá stanoviště nižších poloh: 4M /podzoly mělké/										14 ha -
231	smrkový	N,nH	100	-	30	81	BO6 BK3 BR1 DB4-10 BO6-0 BK BR	25 % - DB, BK, LP, HB, JD, BR	-	
233	borový	pN,pH	120	-	20	101				
235	dubový	nP,pN	140	120-140	30	121				
29 Olšová stanoviště podmačených půd: 3L, 5L /podmačených stanovišť na plošinách, aluvia podél potoků a prameniště- gleje, stagnogleje, fluvizemě/										377 ha 0,6 %
291	smrkový	N,H	80	-	20	61	3L: SM0-2 JS2-3 OLL6-7 5L: SM2-6 JD0-2 JS1-3 OLL3-2 OLS1 KL HB TR KL	70% - JV, OLL	-	
297	listnatý	N,H	80	-	20	61				
35 Živná bazická stanoviště středních poloh: 4W /pararendziny/										4 ha -
351	smrkový	N(H)	80	-	30	61	BK4-7 KL(JV)1-2 DB1-2 LP1-2 MD1 JS2-0 JD0-1 HB	70 % - BK, DB, JV ,JS, LP JD, JL, HB, TR	MD 10-15	
353	borový	N	120	-	30	101				
355	dubový	N, P	130	-	30	111				
41 Exponovaná stanoviště středních poloh: 3N, 3S9, 3F, 3A, 3D9, 4K9, 4N, 4F, 4S9, 4B9, 4D9, 4A /zářezy potoků, prosluněné svahy, prudké stinné svahy, suťová stanoviště na svazích a hřebtech, chudé až středně bohaté, kambizemě eutrické až oligotrofní, kambizemě rankrové a podzolované, podzoly/										1515 ha 2,4 %
411	smrkový	N,P	110	100-110	30	91	3-4N, S9: BO4-7 BK3-2 MD2-1 KL0-1 DB0-1 LP 3-4F,A, 4S9: SM5-3 JD0-2 MD1 BK2-4 KL(JV)2-0 LP0-2 DB0-1 JS HB BO 3D9: BL6 JV2 JS1 JLH1	30% - BK, JD, LP, DB, JS, JV, JL, HB	MD 5-20	
413	borový	N,P	120	-	30	101				
415	dubový	N	130	130-140	30	111				
416	bukový	P,N	120	120-130	30	101				
417	listnatý (LP,JS)	N(P)	90	90-100	30	71				
417	listnatý (HB)	N	100	100-110	30	81				
43 Kyselá stanoviště středních poloh: 4K, 5M (bez exponovaných typů) /kyselá stanoviště na mírných svazích- kambizemě podzolované, podzoly/										296 ha 0,5 %
431	smrkový	H,N,P	110	110-100	30	91	SM(BO)6-7 BK2 JD1-0 MD1-2	25% - BK, JD, LP, DB, HB	MD 5-10	
433	borový	P,N,H	120	-	30	101				
435	dubový	H,N	130	130-140	30	111				
436	bukový	P,N	130	-	30	111				
45 Živná stanoviště středních poloh: 3S, 3B, 3H, 3D, 4S, 4B, 4H, 4D (bez exponovaných typů) /normální stanoviště-kambizemě eutrické až oligotrofní, oglejené, luvizemě/										7272 ha 11,7 %
451	smrkový	H,N,P	90	80-100	30	71	SM5-4 JD2-0 BK2-3 MD1-2 KL+ LP0-1 TR JS BO DG 3S: BO6 BK2-1 MD1 DB1-2 3B: (SM)DB6-4 JD1-0 BK2-3 MD1 KL1-0 LP0-1 TR JS BO DG JDO 3H: DB6 JD2-3 BK1-2 MD1 LP HB 3D: DB6(SM) BK1-2 JD1-0 MD1-0 KL1	25 % - BK, JD, LP, DB, JV, JS, JL, HB, TR, JDO	MD 10-15 DG +5	
453	borový	H (N)	110	100-110	30	91				
455	dubový	H,N,P	140	-	30	121				
456	bukový	N,P,H	130	130-120	30-40	91-111				
457	listnatý (HB)	H	110	90-110	30	91				
457	listnatý (LP)	H,N(P)	100	90-100	30	81				

457	listnatý (JS s OL)	H	90	-	30	71			
457	listnatý (OL, BR)	H	80	-	20	61			
47 Oglejená stanoviště středních poloh: 3V, 4V, 4O							532 ha 0,8 %		
<i>/zamokřená stanoviště na plošinách a úžlabinách- prameniště gleje, kambizemě oglejené a pseudoglejové, pseudogleje/</i>									
471	smrkový	N,P,H	100	90-100	30	81	3.LVS+4O: DB6 JD2-3 BK2-1 MD1-0 OL 4.LVS: SM7-4 JD2-3 BK0-1 KL0-1 DB0-2 DG	25 % - BK, JD, DB, LP, JV, JL, JDO, HB	MD 5-10 DG +2
475	dubový	H,P(N)	140	130-140	30	121			
477	listnatý (JS, OL)	H	80	-	20	61			
51 Exponovaná stanoviště vyšších poloh: 5K9, 5N, 5S9, 5B9, 5F, 5A, 6N, 6S9, 6B9, 6F, 6A, (5U)							16181 ha 26,1 %		
<i>/zářezy potoků, prosluněné svahy, prudké stinné svahy, suťová stanoviště na svazích a hřebetech, chudé mírné až prudké svahy - kambizemě eutrické až oligotrofní, kambizemě rankrové a podzolované, podzoly/</i>									
511	smrkový	N,P	120	120-110	30	101	SM7-5 JD1-2 BK2-1 KL1 JL JS	30 % - BK, JD, JV, LP, DG, JL, JS	-
516	bukový	P,N	120	120-130	30-40	101	5U: SM2-5 JD2-1 BK4-1 JS2-1 KL1-0		
53 Kyselá stanoviště vyšších poloh: 5K, 6K (bez exponovaných typů)							656 ha 1,1 %		
<i>/kyselá stanoviště na prosluněných mírných svazích- kambizemě oligotrofní až podzolované, podzoly/</i>									
531	smrkový	P(N)	120	-	30	101	SM7 JD1 BK2 MD BO	25 % - BK, JD, LP	MD 5-10
533	borový	N(P)	120	-	30	101			
55 Živná stanoviště vyšších poloh: 5S, 5B, 5D, 5H, 6S, 6B (bez exponovaných typů)							32533 ha 52,5 %		
<i>/normální stanoviště - kambizemě eutrické až oligotrofní, oglejené, luvizemě/</i>									
551	smrkový	P,N,H	110	90-110	30	91	SM6-7 JD2-1 BK1-2 KL0-1	25 % - BK, JD, JV, LP, JL, JS, JDO, TR	-
552	jedlový	P,N,H	120	-	40	91			
831	smrkový rezonanční	N, P	150	-	40	131			
556	bukový	P,N(H)	130	130-120	30-40	111			
57 Oglejená stanoviště středních a vyšších poloh: 5O, 5P, 5V, 6O, 6P, 6V							760 ha 1,2 %		
<i>/poklesliny, mírné svahy, místy stagnující voda - oglejené kambizemě, luvizemě, gleje/</i>									
571	smrkový	P,N(H)	110	-	30(40)	91	SM6-7 JD3 BK1-0 KL JS	25 % - BK, JD, KL, JS, JL	-
576	bukový	P,N(H)	120	-	30(40)	101			
59 Podmáčená stanoviště středních a vyšších poloh: 4G, 5V9, 5G, 6G, 6R							148 ha 0,2 %		
<i>/poklesliny se stagnující vodou - gleje, organozemě/</i>									
591	smrkový	P(N)	110	-	40	81	SM7-8 JD2-3 BK0-1 KL0-1 OL	5-20 % - BK, JD, JV, OLL, OS	-
597	listnatý	N	80	-	20	61			
71 Exponovaná stanoviště horských poloh: 7N, 7K9, 7F, 7S9							177 ha 0,3 %		
<i>/prudké svahy, kamenitá stanoviště – kambizemě, rankrové kambizemě/</i>									
711	smrkový	P,N(H)	150	150 – 110	40-30	91-111	SM8 BK1-2 JD0-1 KL	15 % - BK, JD, KL, JR	-
73 Kyselá stanoviště horských poloh: 7K (bez exponovaných typů)							30 ha -		
<i>/pískovce, podzoly/</i>									
731	smrkový	P	130	-	40	101	SM8 JD0-1 BK1-2 BR	15 % - BK, JD, JR	-
75 Živná stanoviště horských poloh: 7S (bez svahových typů)							235 ha 0,4 %		
<i>/pískovce, kryptopodzoly/</i>									
751	smrkový	P, N	130	-	40	101	SM8 BK1 JD1 KL	15 % - BK, JD, KL, JR	-
77 Oglejená stanoviště horských poloh: 7V							2 ha -		
<i>/poklesliny, prameniště - gleje /</i>									
771	smrkový	P, V	130	-	40	101	SM8 BK1 JD1	5-10 % - BK, JD, KL, BR, JR	-
79 Podmáčená stanoviště horských poloh: 7T, 7G							2 ha -		
<i>/špatně odvodněné plošiny – gleje, zrašelinělé gleje, stagnogleje/</i>									
791	smrkový	P,V(N)	130	-	40	101	SM8-9 JD1-2 BR	5 % - JD, JR	-

PLO 41 Hostýnskovsetínské vrchy a Javorníky

Přehled základních hospodářských doporučení zastoupených HS

HS	POROSTNÍ TYP (současné porosty)	ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ 12345					CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA - alternativy (desítky %)	MELIORAČNÍ A ZPEVNŮJÍCÍ DŘEVINY (Přil. č.4 k vyhl.č.83/96)	Geografic. nepůvodní dřeviny %
01 Mimořádně nepříznivá stanoviště: 0Z, 3Z, 3Y, 3J, 4Z, 4Y, 5Y, 5J, 6L /skály, sutě - rankryl/									240 ha 0,3 %
011	smrkový	N,P,V	100	80-100	30+	81	0Z: BO9 BR1 DB 3-5Y, 3-5Z:BO4-7 BK4-2 BR1 DB0-3; 3J: BK1-3 JD1 JV2 DB1-2 JL1-2 LP2-1 SM0-2 5Y: SM3 BK4-5 JD1 BR1 BO0-1; 5J: SM2-6 JD0-2 BK4-1 KL1-2 JL0-1; 6L: OLS 10	0Z: 5% - BK, BR, DB, JD; 3-5Z, 3-5Y: 30% - BK, DB, JD, BR; 3J: 90% - BK, JV, LP, DB, HB, JS, JL, TIS; 3J - BK, KL, JD, JL, LP, JS, HB, DB 5J: 60% - BK, JV, JD, JL, LP, JS; 6L - OLS, BK, JV, JS, OLL, JD	-
016	bukový	P,V	150	150-200	40-∞	121			
017	listnatý	N,P	110	-	30	91			
19 Lužní stanoviště: 2L, 3U / fluvioglaciálních a fluviálních sedimentů v aluviích řek a říček – fluvizem, gleje/									1057 ha 1,5 %
195	dubový	H,N	160	-	30	141	DB4-5 JD2-0 JS3-2 JV(KL)1-2 BK1 JLD JLV HB	15% - LP, JV, JL, HB, BB, DB (2L); BK, JV, JL, LP, JD, OLL, DB (3U)	-
197	listnaté	H,N	90	80-90	30	71			
198	topolové	H	40	-	10	21			
25 Živná stanoviště nižších poloh: 2S, 2B, 2H, 2D (bez exponovaných typů) /oglejená stanoviště na plošinách ve sprašových překryvech - pseudoglejové kambizemě až pseudogleje/									445 ha 0,6 %
251	smrkový	N,nH	100	-	20	81	DB6 BK2 HB1 MD1 LP JV JL BO TR alternativa 2S: BO5 DB3 BK1 HB1 MD	20 % - BK, LP, HB, JV, JS, JL, JD, JDO, TR, BRK, BB, DB	MD 5-10 DG 1-4 JDO 1-2
253	borový	pN,pH	110	-	20	101			
255	dubový	pN,pN	140	120-140	30	121			
257	listnatý	pN,pH nN,nH	110	-	30	91			
259	pařezina	pN,pH nN,nH	70	-	20	51			
29 Olšová stanoviště podmaččených půd: 3L, 5L /podmaččených stanovišť na plošinách, aluvia podél potoků a prameniště- gleje, stagnogleje, fluvizemě/									284 ha 0,4 %
291	smrkový	N,H	80	-	20	61	3L: SM0-2 JS2-3 OLL6-7 5L: SM2-6 JD0-2 JS1-3 OLL3-2 OLS1 KL HB TR KL	70% - JV, OLL	-
297	listnatý	N,H	80	-	20	61			
41 Exponovaná stanoviště středních poloh: 3K9, 3N, 3S9, 3F, 3B9, 3A, 4K9, 4N, 4F, 4S9, 4B9, 4D9, 4A /zářezy potoků ve sprašových překryvech, prosluněné svahy, prudké stinné svahy, suťová stanoviště na svazích a hřebtech, chudé mírné až prudké svahy- kambizemě eutrické až oligotrofní, kambizemě rankrové a podzolované, podzoly/									4028 ha 5,8 %
411	smrkový	N,P	110	100-110	30	91	3-4N,K9,S9: BO4-7 BK3-2 MD2-1 KL0-1 DB0-1 LP 3-4F,A,B9,4S9: SM5-3 JD0-2 MD1 BK2-4 KL(JV)2-0 LP0-2 DB0-1 JS HB BO	30% - BK, JD, LP, DB, DG, JS, JV, JL, HB	MD 5-10
413	borový	N,P	120	-	30	101			
415	dubový	N	130	130-140	30	111			
416	bukový	P,N	120	120-130	30	101			
417	listnatý (LP,JS)	N(P)	90	90-100	30	71			
417	listnatý (HB)	N	100	100-110	30	81			
43 Kyselá stanoviště středních poloh: 3K, 4M, 4K (bez exponovaných typů) /kyselá stanoviště na mírných svazích- kambizemě podzolované, podzoly/									641 ha 0,9 %
431	smrkový	H,N,P	110	110-100	30	91	SM(BO)6-7 BK2 JD1-0 MD1-2	25% - BK, JD, LP, DB, HB	MD 5-10
433	borový	P,N,H	120	-	30	101			
435	dubový	H,N	130	130-140	30	111			
436	bukový	P,N	130	-	30	111			
45 Živná stanoviště středních poloh: 3S, 3B, 3H, 3D, 4S, 4B, 4H, 4D (bez exponovaných typů) /normální stanoviště-kambizemě eutrické až oligotrofní, oglejené, luvizemě/									30861 ha 44,0 %
451	smrkový	H,N,P	90	80-100	30	71	SM6-4 JD1-0 BK2-3 MD1 KL1-0 LP0-1 TR JS BO DG JDO 3S: BO6 BK2-1 MD1 DB1-2 3B: SM(DB)6-4 JD JD1-0 BK2-3 MD1 KL1-0 LP0-1 TR JS BO DG JDO 3H: DB6 JD2-3 BK1-2 MD1 LP HB 3D: BD6(SM) BK1-2 JD1-0 MD1-0 KL1	25 % - BK, JD, LP, DB, JV, JS, JL, HB, TR, JDO	MD 10-15 DG 5-10 JDO 1-4
453	borový	H (N)	110	100-110	30	91			
455	dubový	H,N,P	140	-	30	121			
456	bukový	N,P,H	130	130-110	30-40	91-101			
457	listnatý (HB)	H	110	90-110	30	91			
457	listnatý (LP)	H,N(P)	100	90-100	30	81			
457	listnatý (JS s OL)	H	90	-	30	71			
457	listnatý (OL, BR)	H	80	-	20	61			
47 Oglejená stanoviště středních poloh: 3V, 3O, 4V, 4O									

/zamokřená stanoviště na plošinách a úžlabinách- prameniště gleje, kambizemě oglejené a pseudoglejové, pseudogleje/									
471	smrkový	N,P,H	100	90-100	30	81	3.LVS: DB6 JD2-3 BK2-1 MD1-0 OL 4.LVS: SM7-4 JD2-3 BK0-1 KL0-1 DB0-2 DG	25 % - BK, JD, DB, LP, JV, JL, JDO, HB	MD 15-20 DG +-2
475	dubový	H,P(N)	140	130-140	30	121			
477	listnatý (JS, OL)	H	80	-	20	61			
51 Exponovaná stanoviště vyšších poloh: 5K9, 5N, 5S9, 5B9, 5F, 5A, 6B9, 6F, 6A, (5U) /zářezy potoků, prosluněné svahy, prudké stinné svahy, suťová stanoviště na svazích a hřebtech, chudé mírné až prudké svahy - kambizemě eutrické až oligotrofní, kambizemě rankrové a podzolované, podzoly/									
511	smrkový	N,P	120	120-110	30	101	SM7-4 JD1-2 BK2-1 KL0-2 JL1-0 JS 5U: SM2-5 JD2-1 BK4-1 JS2-1 KL1-0	30 % - BK, JD, JV, LP, DG, JS, JL	MD 5-10 DG+-1 JDO
516	bukový	P,N	120	120-130	30-40	101			
53 Kyselá stanoviště vyšších poloh: 5M, 5K (bez exponovaných typů) /kyselá stanoviště na prosluněných mírných svazích- kambizemě oligotrofní až podzolované, podzoly/									
531	smrkový	P(N)	120	-	30	101	SM6-7 JD1-0 MD1-0 BO1-0 BK2 JR BR	25 % - BK, JD, LP, DG	MD 5-10
533	borový	N(P)	120	-	30	101			
55 Živná stanoviště vyšších poloh: 5S, 5B, 5D, 5H, 6S, 6B (bez exponovaných typů) /normální stanoviště - kambizemě eutrické až oligotrofní, oglejené, luvizemě/									
551	smrkový	P,N,H	110	90-110	30	91	SM6-7 JD2-1 BK1-2 KL0-1 DG JDO	25 % - BK, JD, JV, LP, JL, JS, JDO, TR	MD 5-10 DG 3-5 JDO 1-2
552	jedlový	P,N,H	120	-	40	91			
553	borový (modřínový)	H,N	110	-	30	91			
556	bukový	P,N(H)	130	130-120	30-40	111			
57 Oglejená stanoviště středních a vyšších poloh: 5O, 5V, 6O, 6V /poklesliny, mírné svahy, místy stagnující voda - oglejené kambizemě, luvizemě, gleje/									
571	smrkový	P,N(H)	110	-	30(40)	91	SM5-7 JD2-3 BK1 KL1-0 JS1-0 JDO	25 % - BK, JD, JV, JS, JL, LP, JDO	MD 5-10 JDO 5-10
576	bukový	P,N(H)	120	-	30(40)	101			
59 Podmáčená stanoviště středních a vyšších poloh: 4V9, 5V9, 5G (bez exponovaných typů) /poklesliny se stagnující vodou - gleje, organozemě/									
591	smrkový	P(N)	110	-	40	81	SM7-8 JD2-3 BK0-1 KL0-1 OL	5-20 % - BK, JD, JV, OLL, DG	-
597	listnatý	N	80	-	20	61			